



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 29 - 2 - 2016
Αριθ. πρωτ: 2224/25618

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150 Προς: ΠΔ
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρήs
Τηλέφωνο: 210 928 7225
e-mail: ptheodoris@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων με δραστική ουσία chlorpyrifos σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/60 της Επιτροπής»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 1.4 και 45 αυτού.
2. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/60 της Επιτροπής, με τον οποίο ορίστηκαν νέα μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs) για τη δραστική ουσία chlorpyrifos μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
3. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
4. Τη με αριθ. Υ 26/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τΒ'/06-10-2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
5. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' 2367/4.11.15) με θέμα την *“Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”*.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α.** Τροποποιούμε το φάσμα δράσης όλων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων με δραστική ουσία chlorpyrifos σε περιεκτικότητα 48% β/ο και μορφή EC, **κατά τρόπο ώστε το υφιστάμενο προ της παρούσης σημείο 5 της ΥΑ διάθεσης στη αγορά του καθενός από αυτά, όσον αφορά τις εφαρμογές φυλλώματος, να περιοριστεί εντός των παρακάτω:**

Πεδίο Εφαρμογής (για κάθε ΥΑ διάθεσης στην αγορά ισχύουν τα υφιστάμενα προ της παρούσης)	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα		
Εσπεριδοειδή Γκρέϊπ-φρουτ, Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά	(για κάθε ΥΑ διάθεσης στην αγορά ισχύουν τα υφιστάμενα προ της παρούσης)	200-500	Με την εμφάνιση των προσβολών	1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)
Μηλοειδή: Μηλιά, Αχλαδιά	(για κάθε ΥΑ διάθεσης στην αγορά ισχύουν τα υφιστάμενα προ της παρούσης)	100 -250	Εφαρμογές πριν την άνθηση (BBCH 10-59)	1-2 (μεσοδιάστημα 10-15 ημέρες)
Κυδωνιά	(για κάθε ΥΑ διάθεσης στην αγορά ισχύουν τα υφιστάμενα προ της παρούσης)	>>	Να μην εφαρμόζεται κατά την άνθηση (BBCH 60-69)	
Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά, Νεκταρινιά,	(για κάθε ΥΑ διάθεσης στην αγορά ισχύουν τα υφιστάμενα προ της παρούσης)	150 -312,5	Εφαρμογές πριν την άνθηση (BBCH 10-59)	1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)
Δαμασκηνιά Κερασιά	>>	>>	Να μην εφαρμόζεται κατά την άνθηση (BBCH 60-69)	1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)
Λαχανικά (υπαίθρου): Καρότο, ραπάνι, κρεμμύδι Μελιτζάνα	(για κάθε ΥΑ διάθεσης στην αγορά ισχύουν τα υφιστάμενα προ της παρούσης)	100-250	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)
Τομάτα Πιπεριά	>>	>>	Εφαρμογές πριν την άνθηση (BBCH 11-59)	1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)
Βαμβάκι	(για κάθε ΥΑ διάθεσης στην αγορά ισχύουν τα υφιστάμενα προ της παρούσης)	100-200	Ψεκασμός με την εμφάνιση των αυγών ή των πρώτων εντόμων.	1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)
Πατάτα	(για κάθε ΥΑ διάθεσης στην αγορά ισχύουν τα υφιστάμενα προ της παρούσης)	100-250	Ψεκασμός με την εμφάνιση των εντόμων και πριν το σχηματισμό των κονδύλων (BBCH 10-39)	1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)

B. Τροποποιούμε το σημείο 5 της με αριθμό 1903 άδειας διάθεσης στην αγορά του Pyrinex 25 CS σύμφωνα με τα παρακάτω:

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψ.υ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	κ.εκ./ στρέμμα (max)		
Ψεκασμός φυλλώματος						
Μηλοειδή: Μηλιά, Αχλαδιά	Καρπόκαψα (Cydia pomonella) Ανθονόμος (Anthonomus pomorum) Υπονομευτής (Hyponomeuta malinellus) Σαν Ζοζέ (Quadraspidiotus perniciosus) Βαμβακάδα (Diaspis pentagona) Ματόψειρα (Eriosoma lanigerum) Φυλλορύκτες (Phyllonorycter blancardella P. corylifoliella, Cemistoma scitella, Lyonetia clerkella) Ζεύζερα (Zeuzera pyrina) Κόσσοσ (Cossus cossus) Ξυλοφάγα έντομα	200-240	100-200	200-480	Εφαρμογές πριν την άνθηση (BBCH 10-59)	1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)
Κυδωνιά	>>	200	100	200	Να μην εφαρμόζεται κατά την άνθηση (BBCH 60-69)	1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)
Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά, Νεκταρινιά,	Ανάρσια (Anarsia lineatella) Βαμβακάδα (Diaspis pentagona) Καρπόκαψα (Cydia molesta) Φυλλοδέτες (Archips rosanus, A. podanus, Adoxophyes orana) Ζεύζερα (Zeuzera pyrina)	200-240	150-250	300-600	Εφαρμογές πριν την άνθηση (BBCH 10-59)	1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)

	Κόσσος (<i>Cossus cossus</i>) Ξυλοφάγα έντομα					
Δαμασκηλιά	>>	200	150	300	Να μην εφαρμόζεται κατά την άνθηση (BBCH 60-69)	>>
Αμπελι Οινοποιήσιμα Επιτραπέζια	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i>) Ψευδόκοκκος (<i>Pseudococcus</i> spp) Τζιτζικάκι (<i>Empoasca</i> spp.)	200	100	200	Ένας ψεκασμός για την καταπολέμηση της ευδεμίδας και για ταυτόχρονη καταπολέμηση του ψευδόκοκκου και για το τζιτζικάκι Εφαρμογή πριν την άνθηση	1
Λαχανικά (υπαίθρου): Καρότο, ραπάνι, κρεμμύδι Μελιτζάνα	Αφίδες (<i>Aphis</i> spp. <i>Myzus</i> spp.) Θρίπες (<i>Thrips</i> spp). Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>) Πιερίδα (<i>Pieris brassicae</i>)	--	50-80	400	Ψεκασμός με την εμφάνιση των εντόμων	1-2 (μεσοδιάστημα 10-15 ημέρες)
Τομάτα Πιπεριά	>>	>>	>>	>>	Εφαρμογές πριν την άνθηση (BBCH 11-59)	1-2 (μεσοδιάστημα 10-15 ημέρες)
Βαμβάκι	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>) Ρόδινο σκουλήκι (<i>Pectinophora gossypiella</i>) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera exigua</i>) Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i>) Θρίπες (<i>Thrips tabaci</i>)	--	50-80	400	Ψεκασμός με την εμφάνιση των αυγών ή των πρώτων εντόμων.	1-2 (μεσοδιάστημα 10-15 ημέρες)
Πατάτα	Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>) Φθοριμαία (<i>Phthorimaea operculella</i>) Αφίδες	--	50-80	400-480	Ψεκασμός με την εμφάνιση των εντόμων Εφαρμογές πριν το σχηματισμό	1-2

	(Aphis spp.)				των κονδύλων (BBCH 10-39)	
Εφαρμογή στο έδαφος						
Λαχανικά, (Καρπούζι, Αγγούρι, Κολοκύθι), Τριφύλλια, Βαμβάκι, Πατάτα, Καπνός, Καλαμπόκι, Σιτάρι.	Σιδεροσκούληκο (Agriotis spp.) Υλέμνια (Hylemia antique) Πρασάγγουρας (Gryllotalpa spp.) Χλώροπας (Carabidae) Ζάμπρος (Zabrus tenebrioides) Κοφτοσκούληκο (Agrotis spp.)			1000 (καθολική εφαρμογή) 380 (σε λωρίδες ή αυλάκια) 380 (καθολική εφαρμογή) 190 (σε λωρίδες ή αυλάκια) 250 (καθολική εφαρμογή) 150 (σε λωρίδες ή αυλάκια)	Πριν τη σπορά ή φύτεμα. Ομοιόμορφο ψεκασμό και ενσωμάτωση στα 5-10 εκ.	1
Σπορεία, Καπνοσπορεία	Σιδεροσκούληκο (Agriotis spp.) Υλέμνια (Hylemia antique) Πρασάγγουρας (Gryllotalpa spp.) Χλώροπας (Carabidae) Ζάμπρος (Zabrus tenebrioides) Κοφτοσκούληκο (Agrotis spp.)	10 κ.εκ./ 10 τ.μ.		10 κ.εκ./ 10 τ.μ.	Μετά τη σπορά. Εφαρμογή με το νερό του ποτίσματος.	1
Καπνός, Τομάτα, λοιπά λαχανικά	Σιδεροσκούληκο (Agriotis spp.) Υλέμνια (Hylemia antique) Πρασάγγουρας (Gryllotalpa spp.) Χλώροπας (Carabidae) Ζάμπρος (Zabrus tenebrioides) Κοφτοσκούληκο (Agrotis spp.)			290	Κατά το φύτεμα. Εφαρμογή με το νερό του ποτίσματος..	1

Πατάτα	Σιδεροσκούληκο (Agriotis spp.) Υλέμνια (Hylemia antiqua) Πρασάγγουρας (Gryllotalpa spp.) Χλώροπας (Carabidae) Ζάμπρος (Zabrus tenebrioides) Κοφτοσκούληκο (Agrotis spp.)			380	Κατά το φύτεμα. Ψεκασμός του εδάφους στις αυλακίες.	1
Δολώματα για τις προαναφερθέντες καλλιέργειες	Κοφτοσκούληκο (Agriotis spp.) Πρασάγγουρας (Gryllotalpa spp.)			190 κ.εκ./στρ. με 3 κιλά πίτουρα σε 1 λίτρο νερό	Με διασκορπισμό	1

Γ. Τροποποιούμε το σημείο 5 της με αριθμό 1888 άδειας διάθεσης στην αγορά του Dursban 750 WG σύμφωνα με τα παρακάτω:

5.1						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ. εκ. σκευάσματος /στρέμμα	κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστ. υγρού	Όγκος ψεκ. Υγρού : λίτρα/στρέμμα		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ : Γκρέιπ-φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά	Έντομα φυλλώματος, καρπών και ξύλου (μασητικά, μυζητικά).	320	64-80	200-400	Εφαρμογές με την εμφάνιση των εντόμων. (BBCH 11-89) Για τα κοκκοειδή οι ψεκασμοί διενεργούνται από Ιούνιο-Σεπτέμβριο, πριν τα νέα άτομα εγκατασταθούν στον καρπό.	2 Μεσοδιάστημα εφαρμογών 15 ημέρες.
ΜΗΛΟΕΙΔΗ : Μηλιά, Αχλαδιά,	Έντομα φυλλώματος, και ξύλου (μασητικά, μυζητικά).	160	64-80	100-200	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη ανά 15 ημέρες. Για τις ψώρες ψεκάσουμε κατά το φούσκωμα των ματιών, στα μέσα Μαΐου και μετά από 10 ημέρες Πριν την άνθηση. (BBCH 10-59)	2 Μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-15 ημέρες.
ΜΗΛΟΕΙΔΗ : Κυδωνιά	Έντομα φυλλώματος, ανθέων, καρπού και ξύλου (μασητικά, μυζητικά)	160	64-80	100-200	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη ανά 15 ημέρες. (BBCH 11-89) Για τις ψώρες ψεκάσουμε κατά το φούσκωμα των	2 Μεσοδιάστημα εφαρμογών 15 ημέρες.

					ματιών, στα μέσα Μαΐου και μετά από 10 ημέρες. Για την καρπόκαψα κάντε τα ραντίσματα που χρειάζονται με δόση 96 γρ./100 λίτρα νερό.	
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Ροδακινιά, Νεκταρινιά,	Έντομα φυλλώματος και ξύλου (μασητικά, μυζητικά).	200	64-80	150-250	Με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη ανά 15 ημέρες. Για τις ψώρες ψεκάζουμε κατά το φούσκωμα των ματιών, στα μέσα Μαΐου και μετά από 10 ημέρες. Πριν την άνθηση. (BBCH 10-59).	2 Μεσοδιάστημα εφαρμογών 15 ημέρες.
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Δαμασκηλιά	Έντομα φυλλώματος, ανθέων, καρπού και ξύλου (μασητικά, μυζητικά)	200	64-80	150-250	Με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη ανά 15 ημέρες. (BBCH 11-89) Για τις ψώρες ψεκάζουμε κατά το φούσκωμα των ματιών, στα μέσα Μαΐου και μετά από 10 ημέρες. Για καρπόκαψα και ανάρσια κάντε τα ραντίσματα που χρειάζονται με δόση 96 γρ./100 λίτρα νερό.	2 Μεσοδιάστημα εφαρμογών 15 ημέρες.
ΛΑΧΑΝΙΚΑ : Καρότα, Ραπάνια, Κρεμμύδια.	Έντομα φυλλώματος, (μασητικά, μυζητικά)	160	250		Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη μετά από 15 ημέρες.	2 Μεσοδιάστημα εφαρμογών 15 ημέρες.
ΛΑΧΑΝΙΚΑ : Τομάτες, Πιπεριές,	Έντομα φυλλώματος, (μασητικά, μυζητικά)	160	250	50-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη μετά από 15 ημέρες. Πριν την άνθηση. (BBCH 10-59).	2 Μεσοδιάστημα εφαρμογών 15 ημέρες.
ΛΑΧΑΝΙΚΑ : Μελιτζάνες	Έντομα φυλλώματος, (μασητικά, μυζητικά)	160	250	50-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη μετά από 15 ημέρες.	2 Μεσοδιάστημα εφαρμογών 15 ημέρες.
BAMBAKI	Έντομα φυλλώματος, (μασητικά, μυζητικά)	128	-	50-80	Ψεκασμός με την εμφάνιση των αυγών ή των πρώτων εντόμων.	2 Μεσοδιάστημα εφαρμογών 15 ημέρες.

					Επόμενος ψεκασμός με την επανεμφάνιση των εντόμων ή μετά από 15 ημέρες.	
ΠΑΤΑΤΑ	Έντομα φυλλώματος, (μασητικά, μυζητικά)	160	-	50-100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των αυγών ή των πρώτων εντόμων. Επόμενος ψεκασμός με την επανεμφάνιση των εντόμων ή μετά από 15 ημέρες. Εφαρμογές μέχρι το σχηματισμό των κονδύλων. (BBCH10-39)	2 Μεσοδιάστημα εφαρμογών 15 ημέρες
Σπαράγγι (χρήση ήσσονος σημασίας)	Αφίδα σπαραγγιού, Θρίπας	128-160	128-160	100	Ψεκασμός καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφόσον χρειαστεί μετά από 15 μέρες	2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Στα εσπεριδοειδή, κυδωνιά, δαμασκηνιά: Να μη χρησιμοποιείται την περίοδο της άνθησης (BBCH-60-69).
2. Βαμβάκι: Το ψεκασμένο φυτικό υλικό να μη χρησιμοποιηθεί για ζωοτροφή.
3. Σπαράγγι: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του σπαραγγιού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια του σπαραγγιού ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

Γ. Τροποποιούμε το σημείο 13.2 όλων εγκρίσεων με δραστική ουσία chlorpyrifos και μορφή EC, CS ή WG σύμφωνα με τα παρακάτω:

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
	Πορτοκαλιά, Γκρέιπ-φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά	
Μηλιά, Αχλαδιά		Δεν ορίζεται βάση του χρόνου εφαρμογής
Κυδωνιά		30
Ροδακινιά, Νεκταρινιά,		Δεν ορίζεται βάση του χρόνου εφαρμογής
Δαμασκηνιά, Κερασιά		20
Καρότα, Ραπανάκια, Κρεμμύδια.		20
Τομάτες, Πιπεριές,		Δεν ορίζεται βάση του χρόνου εφαρμογής
Μελιτζάνες		20
Βαμβάκι		20
Πατάτα		Δεν ορίζεται βάση του χρόνου εφαρμογής
Σπαράγγι		20

Ειδικότερα για τη με αριθμό 1903 άδεια διάθεσης στην αγορά του Pyrinex 25 CS ισχύει επιπλέον:

Αμπέλι Επιτραπέζιο	Δ.Ο λόγω του χρόνου εφαρμογής (πριν την άνθηση)
οινοποιήσιμο	20

- Δ.
1. Από την 15^η Μαρτίου 2016 όλα τα προαναφερόμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που διατίθενται από τον κάθε υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.
 2. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει μέχρι τις 31/3/2016 να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο για να ειδοποιήσει τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω σκευάσματα για την παρούσα.
 3. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους επαγγελματίες χρήστες, και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
 4. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.

**Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής**

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ