ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μην αναπνέετε ατμούς / εκνεφώματα. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
ΠΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Βλαβερό για τα πουλιά. Μη ρυπαίνεται τα νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης να χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μετά την περίοδο της ανθοφορίας και να μην χρησιμοποιείτε το σκεύασμα κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείται το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως ή ριζοποτίσματα.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Δεν χρειάζεται προδιάλυση. Ρίχνουμε το σκεύασμα κατ' ευθείαν στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά και προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Νερό και απορρυπαντικό.
Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.
Συνδυαστικότητα: —
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Εσπεριδοειδή: 21 ημέρες Αχλαδιά, Τομάτα (υπαίθρου, θερμοκηπίου), Αγγούρι (θερμοκηπίου), Καπνός: 7 ημέρες, Βαμβάκι: 20 ημέρες, Ροδακινιά, Πατάτα: 14 ημέρες.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται από πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως οι φιάλες με τρύπημα και τα κουτιά με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνθήκες αποθήκευσης / χρόνος σταθερότητα του σκευάσματος: Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστό, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, χωρίς να εκτίθεται απ' ευθείας στο φως. Ημερομηνία λήξης: Δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Αριθμός Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας
Ημερ. Παρασκευής: Βλέπε επί της συσκευασίας

CONRAZE 200 SL

Imidacloprid (Ιμιντακλοπρίντ) **Υγρό διάλυμα (SL)**

Εγγυημένη σύνθεση: Imidacloprid 20 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 82,34 % β/β

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 250 κ.εκ.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 14273/17.06.08

Κάτοχος της άδειας – Παρασκευαστής: CHEMINOVA AGRO S.A.
Paseo de la Castellana 257, 5^{0} – 28046, Μαδρίτη, Ισπανία CHEMINOVA

Εργοστάσιο συσκευασίας - Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Διανομή:
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΑΓΡΕΤ
ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
Θέση Σροπηγιάδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100
Θεσ/νίκη: 53 Ο.Τ., Γ' Φάση, Βι.ΠΕ.Θ. - Σίνδος
Τηλ.: 2310 795884 • Fax: 2310 796741
www.ellagret.gr

Μέλος του ΕΣΥΦ

CHEMINOVA

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπφρουτ): **Εριώδης αλευρώδης:** Δόση 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασμός φυλλώματος μετά την περίοδο της ανθοφορίας. Με την εμφάνιση των νυμφών του εντόμου (στάδια L1 και L2). **Φυλλοκνίστης:** Δόση 50-75* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής, μετά την περίοδο της ανθοφορίας. **ΑΧΛΑΔΙΑ: Ψύλλα Αχλαδιάς:** Δόση 60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής, μετά την καρπόδεση έως την έναρξη αλλαγής χρώματος (BBCH 71-79). **ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ: Αφίδες:** Δόση 25-30* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής, μετά την καρπόδεση έως την έναρξη αλλαγής χρώματος (BBCH 71-79). **ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: Αφίδες, Αλευρώδης:** Δόση 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. **ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: Αλευρώδης:** Δόση 75-125$^{(5)}$ κ.εκ/στρέμμα. Ριζοπότισμα με το νερό της άρδευσης. **ΑΓΓΟΥΡΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: Αλευρώδης:** Δόση 75-125$^{(5)}$ κ.εκ/στρέμμα. Ριζοπότισμα - προληπτική εφαρμογή. **ΒΑΜΒΑΚΙ: Αφίδες:** Δόση 50 κ.εκ/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής, μετά την περίοδο της ανθοφορίας. **ΠΑΤΑΤΑ: Αφίδες, Δορυφόρος:** Δόση 50 κ.εκ/στρέμμα. Με την έναρξη της προσβολής και μέχρι 4 αφίδες ανά φύλλο. Να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχει μελίτωμα. **ΚΑΠΝΟΣ: Αφίδες:** α) Δόση 25-30κ.εκ./στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται με την επανεμφάνιση της προσβολής. β) Δόση 50-100$^{(5)}$ κ.εκ/στρέμμα για ριζοπότισμα με το νερό της μεταφύτευσης.
*: Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από της ένταση της προσβολής.
Παρατηρήσεις: (1) Στα εσπεριδοειδή σε προγράμματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης συνιστάται να εφαρμόζεται, όταν υπάρχει μικρός πληθυσμός ακμαίων του παρασίτου *Cales noacki* ωρίμων για ωοτοκία. (2) Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής (μικτός πληθυσμός) ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται 20-30 ημέρες από τον προηγούμενο. (3) Στα εσπεριδοειδή για την καταπολέμηση του Φυλλοκνίστη (*Phyllocnistis citrella*) η μικρή δόση συνιστάται για μικρή πίεση προσβολής ενώ η μεγάλη δόση για μεγάλη πίεση προσβολής. (4) Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής εριώδη αλευρώδη (μικτός πληθυσμός) συνιστάται η προσθήκη (TANK - MIX) θερινού λαδιού σε δόση 1 λίτρου. (5) Στις περιπτώσεις εφαρμογής με ριζοπότισμα, το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την πυκνότητα των φυτών. (6) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης νεκταριακότητας. (7) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα κατά την περίοδο της άνθησης. (8) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περίπτωση που εμφανίζεται μελίτωμα (π.χ. περισσότερο από 4 αφίδες ανά φύλλο);
Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): Εσπεριδοειδή: 200-400, Αχλαδιά: 150, Ροδακινιά: 150-250, Τομάτα υπαίθρου: 50-100, Βαμβάκι: 50-80, Πατάτα-Καπνός: 50-100.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: Εσπεριδοειδή: 2/20-30, Αχλαδιά: 1, Ροδακινιά: 2/28, Τομάτα (υπαίθρου-θερμοκηπίου), Αγγούρι (θερμοκηπίου), Βαμβάκι, Πατάτα: 2/14, Καπνός: 2/20-30 (ψεκασμοί φυλλώματος), 1 (ριζοπότισμα).