

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση εισπνοής: Ο παθών να μεταφερθεί σε καθαρό αέρα. Εάν χρειαστεί ζητήστε ιατρική βοήθεια.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Συμπιπνωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος με ψεκαστήρες κοινού όγκου (5-6 atm) ή μηχανοκίνητους (25-30 atm) και μπεκ τύπου σκούπας.

Φυτοτοξικότητα: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συστασμένες χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις χρήσης του. Να χρησιμοποιούνται οι μικρές δόσεις σε ευαίσθητα στο λάδι φυτά (π.χ. σε μερικά καλλωπιστικά). Να γίνεται δοκιμή σε 1 ή 2 φυτά.

Συνδυαστικότητα: Το σκεύασμα συνδυάζεται με όλα τα γνωστά εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα. Δεν συνδυάζεται με ισχυρά αλκαλικά σκευάσματα, θείο, Captan.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Νερό και απορρυπαντικό.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Διατηρείται στην αρχική του παραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

BIO Επιτρέπεται η χρήση του στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008.

Ημερομηνία παρασκευής: Βλέπε επί της συσκευασίας.
Αρ. Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας.



SCORPION 98,5 EC



Παραφινικό ορυκτέλαιο

Υγρό γαλακτωματοποίηση (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: Paraffin oil 98,5% β/β, CAS No 64742-46-7
Βοηθητικές ουσίες 1,5% β/β

Θερινός πολτός κατά κοκκοειδών, ακάρεων, αφίδων και λεπιδοπτέρων.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ : 1 ΛΙΤΡΟ

Αρ. έγκρ. κυκλοφορίας: 1968/04-02-2003

Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας: TOTAL FLUIDES, Γαλλία
Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά -
Παρασκευαστής - Εργοστάσιο παρασκευής / συσκευασίας:



ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ήροπηγάδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100
Θεσ/νίκη: 53 Ο.Τ., Γ' Φάση, ΒΙ.Π.Ε.Θ. - Σίνδος
Τηλ.: 2310 795884 • Fax: 2310 796741
www.ellagret.gr



Καλλιέργειες - Στόχοι - Δόσεις (κ. εκ./100 λίτρα νερό) - Χρόνος Εφαρμογής ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέιπφρουτ, λεμόνι, μανταρινιά, πορτοκάλι, φράπα): **Κόκκινη ψώρα, Ψευδοκόκκος, Λεκάνο, Άσπρη ψώρα, Μαύρη ψώρα, Άλλα κοκκοειδή, Τετράνυχος, Αλευρώδεις.** Δόση 1000-1300 ή 500 σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί: Άνοιξης (με την έναρξη της βλάστησης) Καλοκαιριού - Φθινοπώρου - Χειμώνα. Η καλύτερη εποχή είναι αρχές Ιουλίου με τέλος Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση έντονης προσβολής μπορεί να γίνει ψεκασμός και το χειμώνα (Φεβρουάριο - Μάρτιο). **ΜΗΛΟΕΙΔΗ** (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά): **Ψώρα Σαν Ζοζέ, Παρλατόρια, Βαμβακάδα, Μυτιλόμορφη ψώρα, Σταγιά ψώρα, Φυλλοδέτες, Τετράνυχος, Ψύλλα, Αφίδες.** Δόση 1000-1300 ή 500 σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί: Άνοιξης (με την έναρξη της βλάστησης) - Καλοκαιριού - Φθινοπώρου - Χειμώνα. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Βερικοκιά, κερασιά, ροδακινιά, νεκταρινιά, δαμασκηνιά): **Ψώρα Σαν Ζοζέ, Βαμβακάδα, Σφαιρολεκάνο, Παρλατόρια, Μυτιλόμορφη ψώρα, Αφίδες, Φυλλοδέτες, Ακάρεα, Προνύμφες αφίδων και άλλων εντόμων.** Δόση 1000-1300 ή 500 σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί: Άνοιξης (με την έναρξη της βλάστησης) - Καλοκαιριού - Φθινοπώρου - Χειμώνα. **ΕΛΙΑ: Λεκάνο, Ασπιδιώτς, Παρλατόρια, Πολίνα, Μυτιλόμορφη ψώρα, Βαμβακάδα, Προνύμφες εντόμων.** Δόση 1000-1300 ή 500 σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί: Άνοιξης (με την έναρξη της βλάστησης) - Καλοκαιριού - Φθινοπώρου - Χειμώνα. **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ: Κοκκοειδή, Φυλλορύκτες, Φυλλοδέτες, Αφίδες.** Δόση 1000-1300 ή 500 σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί: Άνοιξης (με την έναρξη της βλάστησης) - Καλοκαιριού - Φθινοπώρου - Χειμώνα. **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:** 1) Κατά τη χρήση του θερινού πολτού τα δέντρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μια εβδομάδα πριν από το ψεκασμό. 2) Αποφεύγεται το ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα και σε περιόδους έντονης ξηρασίας. 3) Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C, γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοξοκίτητας. 4) Να μη γίνονται ψεκασμοί όταν υπάρχει παγετός ή κίνδυνος παγετού καθώς και σε περιόδους ξηρασίας και υπερβολικής υγρασίας. 5) Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου. 6) Στα μηλοειδή και ειδικά στο κρυστάλλι να μην προηγηθεί ή έπεται εφαρμογή captan, folpet, δινιτροενώσεων σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας. **Όγκο ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα:** ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: 200 - 400 λίτρα/στρέμμα, ΜΗΛΟΕΙΔΗ - ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: 150 - 250 λίτρα/στρέμμα. ΕΛΙΑ: 150 - 300 λίτρα /στρέμμα. ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ: 80 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Για όλες τις καλλιέργειες 21 ημέρες. Σε περίπτωση αναμείξεως με άλλο σκεύασμα οφείλουμε να τηρούμε την "τελευταία επέμβαση" του άλλου σκευάσματος (αν αυτή είναι πάνω από 21 ημέρες).

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού ανακατεύοντας μέχρι να γίνει ομοιόμορφο γαλάκτωμα και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Σε περίπτωση που πρέπει να προστεθούν άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αυτό γίνεται αφού πρώτα το γαλάκτωμα του ορυκτελαίου αναδευτεί καλά. Σε περίπτωση που το αναμειγμένο με βρέξιμη σκόνη, ετοιμάζουμε πρώτα το αραιωμένο γαλάκτωμα ορυκτελαίου και μετά προσθέτουμε την ήδη διαλυμένη σε νερό βρέξιμη σκόνη.