

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Εφοδιάστετε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Απορύγετε να αναπνέετε τα εκνεφώματα. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να αποφεύγεται η ελεύθερωση στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα απομάκρυνσης για τα μάτια / πρόσωπο. «Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες ανθεκτικές μπότες κατά τη διάρκεια της ανάμεξης/φόρτωσης και εφαρμογής». «Συστηνεται να γίνεται εφαρμογή του προϊόντος με ελκυστρα με κλειστή καμπίνα». «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια, φόρμα και μπότες εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Γενική συμβουλή: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλεύετε / επισκεψθείτε γιατρό. Σε περίπτωση επαρήξης με τα μάτια: Εξπλύνετε αμέσως με αφθονο νερό και κάπως από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Σε περίπτωση επαρήξης με το δέρμα: Εξπλύνετε με σαπούνι και αφθονο νερό. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθάρο αέρα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΝ ΚΑΤΑΣΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιάβεστα. Εξπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Συμπτώματα: Δυσκολία στην αναπνοή, αταξία, αδυναμία, υπνηλία. Αντιδότο/θεραπεία: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηρίασης: 210 77 93 777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης:

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Για να προστατεύετε τα φυτά μη στόχους να αφήστε αύρισκαστη ζώνη προσδιασής 5 μέτρων από τη γεωργική γη.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτώγειας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκευασματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλείστε: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μεθόδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λπ.) όπου αυτό είναι δυνατόν και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή αναπτυξής ανθεκτικότητας. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:** - σπόρας ή φυτεύσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περιπτώση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκευασματικό, στον ίδιο αρρ., την ίδια περίοδο, μπορεί να σταρεί μόνο βαμβακιά, - σπόρας ή φυτεύσης των καλλιέργειών που ακολουθούν: Μη πρέπετε η μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 6μήνες από την εφαρμογή του και βαθύ όργανα. - της πρόσδιασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμογή το σκευασματικό: Οι εργάτες δεν πρέπει να εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής πριν ο ψεκαστικό άγρο έχει στεγνώσει. **ΣΥΝΑΥΓΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Δε συνδυάστε με θειοκαρβαμικά ζιζανιοκτόνα. Μπορεί να συνδυάστε υπό ανάδευτο με τα ζιζανιοκτόνα Dual Gold 96 EC, Tender Gold, Mercantil 96 EC, Typhoon 96 EC και Pixel 96 EC (δραστική ουσία S-metolachlor) καθώς και τα Stomp 330 EC, Stomp Aqua 455 CS, Energiser 455 CS, Stomp Aqua 455 CS, Prowl 330 EC, Prowl 455 CS, Abilerst 330 EC, Abilest 455 CS, Vinator 330 EC, Vinator 455 CS, Revadis 330 EC, Revadis 455 CS (δραστική ουσία Pendimethalin). **ΦΥΤΟΞΕΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοξεικό όταν εφαρμόζεται συμφόρων με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του, για τις ελληνικές εδαφοκληματικές συνθήκες. Τυχόν συμπτώματα φυτοξεικότητας που μπορεί να εμφανιστούν στα φυτά βαμβακιού σε περίπτωση μεταφωτητικής εφαρμογής, είναι παρόδικα και δεν επηρέαζουν την ανάπτυξη ή παραγωγή των φυτών. **Καθαρισμός ψεκαστή:** Αμέσως μετά τον ψεκασμό καθαρίστε ενδελεχώς τον εξοπλισμό ψεκασμού. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό και ξεπλύνετε το δοχείο ψεκασμού, την αντλία, και τα μπεκ 2 με 3 φορες με καθάρο νερό μέχρι να απομακρύνουν ο αρόδος και τα ίχνη του προϊόντος. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνονται στο ψεκαστικό ύγρο) και στη συνέχεια, αφού καταστρέφουν με τρύπαμα για τη διασφάλιση της μη περιττώ χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση ή καταστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σε υψηλήματος που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευασμάτος:** Αποθηκεύτε το στην αρχική του απαραίτηση συσκευασία σε δροσερό, έρημο και καλά αεριζόμενο μέρος, σε θερμοκρασία >0°C προστατευέμενο από α' ευθείας έκθεση στον ήλιο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ημερομηνία παραγωγής: Αριθμός παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας



Μέρος του Επιλαργετ προϊόντος

COTOLINT

Fluometuron 50 SC (Φλουομετουρόν) 50%

ZİZANİOKTÓVO

Αριθμός Αδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):
70142/30-11-2015

ΠΡΟΣΠΑΡΤΙΚΟ- ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΟ Ή ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ ZİZANİOKTÓNO ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ.

Επιθλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Υπόπτο για πρόκληση καρκίνου. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Κάτοχος της άδειας / Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Greenfarm Χημικά Α.Ε.


Μεσογείων 467 & Γούναρη 40, 153 43 Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210-6990932, fax: 2106990862
e-mail: info@gr.nufarm.com



Μέρος του Επιλαργετ προϊόντος

ΕΠΙΛΑΡΓΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπίγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ: 210 55 55 220, 55 59 001-2
Θεσ/νίκη: 53 Ο.Τ.
Γ' ΦΑΣΗ ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Σίνδος
Τηλ: 2310 79 58 84



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
1 ΛΙΤΡΟ

Φάσμα δράσης:

Πεδίο εφαρμογής	Στοχοί	Δόσεις (κ.κε. στρ.)	Όγκος ψεκ. υγρού (λιτρά στρ.)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών καλλιεργητική περίοδο
Βαμβάκι	Καταπολέμηση πλατανύψωλλών και αγρωστοδών ζιζανίων	240-400	30-60	Πριν τη σπορά, με ενωμάτωση στο έδαφος σε βάθος 5-8 εκ.	1
		300+100 ή 200+200		Προφυτρωτικά. Εφόσον δεν ακολουθήσει βροχή, να ακολουθήσει δράση με 20-50 μ3 νερό / στρέμμα.	1
		200		«Σπαστή» εφαρμογή προσπαρτικά, και προφυτρωτικά με ενωμάτωση	2

Κατάλογος καταπολέμησην ζιζανίων:

Προσπαρτική εφαρμογή: **Καλή αποτελεσματικότητα:** Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), Μουχρίτα (*Echinochloa crus-galli*), Γλιστρίδα (*Portulaca oleracea*), Αγριοτομάτια (*Solanum nigrum*), Βέλιουρας (*Sorghum halepense*), Αγριοελιτζάνα (*Xanthium strumarium*). **Μέτρια αποτελεσματικότητα:** Αγριοβαμβακία (*Abutilon theophrasti*). **Σπαστή εφαρμογή (προσπαρτικά και προφυτρωτικά σε αναλογία):** 300 κ.κε. + 100 κ.κε. ή 200 κ.κε. + 200 κ.κε. **Καλή αποτελεσματικότητα:** Αγριοβαμβακία (*Abutilon theophrasti*), Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), Τάτουλας (*Datura stramonium*), Γλιστρίδα (*Portulaca oleracea*), Αγριοτομάτια (*Solanum nigrum*), Βέλιουρας (*Sorghum halepense*), Αγριοελιτζάνα (*Xanthium strumarium*). **Μέτρια αποτελεσματικότητα:** Μουχρίτα (*Echinochloa crus-galli*). **Προφυτρωτική εφαρμογή:** **Καλή αποτελεσματικότητα:** Λουβουδές (*Chenopodium spp.*), Αγριοβαμβακία (*Abutilon theophrasti*), Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*, *Amaranthus sp.*), Τάτουλας (*Datura stramonium*), Μουχρίτα (*Echinochloa crus-galli*), Αγριοπειράδια (*Polygonum persicaria*), Γλιστρίδα (*Portulaca oleracea*), Αγριοτομάτια (*Solanum nigrum*), Βέλιουρας (*Sorghum halepense*), Αγριοελιτζάνα (*Xanthium strumarium*). **Προσπαρτική εφαρμογή:** **Καλή αποτελεσματικότητα:** Λουβουδές (*Chenopodium spp.*), Αγριοβαμβακία (*Abutilon theophrasti*), Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*, *Amaranthus sp.*), Τάτουλας (*Datura stramonium*), Μουχρίτα (*Echinochloa crus-galli*), Αγριοπειράδια (*Polygonum persicaria*), Γλιστρίδα (*Portulaca oleracea*), Αγριοτομάτια (*Solanum nigrum*), Βέλιουρας (*Sorghum halepense*), Αγριοελιτζάνα (*Xanthium strumarium*). **Μέτρια αποτελεσματικότητα:** Μουχρίτα (*Echinochloa crus-galli*).

Προφυτρωτική εφαρμογή: **Καλή αποτελεσματικότητα:** Λουβουδές (*Chenopodium spp.*), Αγριοβαμβακία (*Abutilon theophrasti*), Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*, *Amaranthus sp.*), Τάτουλας (*Datura stramonium*), Μουχρίτα (*Echinochloa crus-galli*), Αγριοπειράδια (*Polygonum persicaria*), Γλιστρίδα (*Portulaca oleracea*), Αγριοτομάτια (*Solanum nigrum*), Βέλιουρας (*Sorghum halepense*), Αγριοελιτζάνα (*Xanthium strumarium*). **Μέτρια αποτελεσματικότητα:** Μουχρίτα (*Echinochloa crus-galli*).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: 1. Η δοσή είναι ανάλογη του τύπου του εδάφους και των ζιζανίων. Η ελαφρή εδάφη, μικρό πληθυσμό ζιζανίων και σε νεαρό στάδιο χρησιμοποιήστε χαμηλότερες δόσολησης. 2. Η προσπαρτική εφαρμογή συνιστάται για έρημα εδάφη ή όταν αναμένεται να επικρατήσουν συνήθεις έρημασις μεταξύ την προεποπτική ή προφυτρωτική εφαρμογή. 3. Η μεταφωτωτική εφαρμογή συνιστάται μόνο όταν δεν έχει υπάρξει κατά την προσπαρτική ή προφυτρωτική εφαρμογή, με δοσολογία που δεν υπερβαίνει τα 200 κ.κε./στρ. (σε κάθε περίπτωση, δε θα πρέπει να γίνεται υπέρβαση της συνολικής δόσης των 400 κ.κε./στρ. με το σκεύασμα ανά έτος). 4. Μπορεί να συνδυάστε με σκεύασμα με δραστική ουσία pendimethalin ή S-metolachlor (βλέπε «Οδηγίες Χρήσης») για καλύτερο έλεγχο της Μουχρίτας και άλλων αγρωτοδών ζιζανίων.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Δεν εφαρμόζεται.

Τρόπος δράσης: Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και διασυστηματικά παρεμποδίζοντας τη φωτοσύνθεση.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους προσπαρτικά με ενωμάτωση, προφυτρωτικά ή μεταφωτωτικά με κατευθυνόμενο ψεκασμό στη βάση των βαμβακούντων, όταν αυτά έχουν ώψος 10-15 εκ., με 30-60 λίτρα νερό ανά στρέμμα. Το ψεκαστικό να λειτουργεί υπό συνεχή ανάδευση με πίεση όχι μεγαλύτερη από 3 ατμόσφαιρες (45 psi) και με μπλή τύπου σκούπατα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού υγρού με νερό μέχρι τη μάση. Ανακινήστε καλά το σκεύασμα, διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα αυτού σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

22489/1215/GR

