

50 WG ARNAK

Φάσμα δράσης: Πεδίο εφαρμογής – Ασθένειες – Δόσεις (σε γραμ σκευάσματος/100 λίτρα νερό) – Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Αμπέλι: Βοτρώτης 200-500. Ψεκασμοί φυλλώματος. 1ος στην αρχή του κλεισίματος της σταφυλής και 2ος στην αλλαγή του χρωματισμού των ραγών.

Τομάτες (θερμοκηπίου): Βοτρώτης 125-250. Ψεκασμοί φυλλώματος από την έναρξη της άνθησης ως την πλήρη ωρίμανση.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λιπ/στρέμμα): Αμπέλι: 30-50, **Τομάτες θερμοκηπίου:** 80-120

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιαστήματα εφαρμογών σε ημέρες: Αμπέλι: 2, **Τομάτες (θερμοκηπίου):** 2 με μεσοδιαστήματα 15 ημερών

Παρατηρήσεις: Η χαμηλότερη δόση μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η προσβολή είναι μικρή ή όταν το προϊόν εφαρμόζεται στα πλαίσια προγραμμάτων με άλλα προϊόντα, διαφορετικού τρόπου δράσης ανάλογα με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και την ευαισθησία της ποικιλίας

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπο τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Στρατηγική διαχείριση ανθεκτικότητας: • Εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών που μειώνουν τους πληθυσμούς των παθογόνων. • Ελαχιστοποίηση της πίεσης επιλογής με ελαχιστοποίηση του αριθμού των εφαρμογών. Ανάλογα με την καλλιέργεια, να μην γίνονται περισσότερες από 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο. • Χρήση του **Arvak** μόνο ως μέρος ολοκληρωμένου προγράμματος ψεκασμών για όλα τα παθογόνα στόχους και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων που δεν ανήκουν στα δικαρβοξυμίδια, αρωματικούς υδρογονάνθρακες και φαινυλοπυρρόλες. • Καθώς στο βοτρώτη (παθογόνο υψηλού κινδύνου) η πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας είναι υψηλή, χρησιμοποιείστε νωρίς κατά την καλλιεργητική περίοδο ένα μη-δικαρβοξυμίδιο μυκητοκτόνο και εφαρμόστε το **Arvak** αργότερα, σαν τμήμα προγράμματος ψεκασμών (σε εναλλαγή ως ανωτέρω). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανα καλλιεργητική περίοδο 2 για όλες τις καλλιέργειες. Στις περιπτώσεις που υπάρχει διαπιστωμένη ανθεκτικότητα στο iprodione, διατηρείστε μία καλ/κή περίοδο χωρίς έκθεση του παθογόνου στα δικαρβοξυμίδια και εφαρμόστε μυκητοκτόνα άλλων ομάδων που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με αυτά (απουσία δικαρβοξυμιδίων ή συχνότητα των ανθεκτικών στελεχών στον αγρό τείνει να μειωθεί)

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Αμπέλι 14 ημέρες. **Τομάτα θερμοκηπίου** 3 ημέρες.

Προφυλάξεις: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Μην αναπνέετε την σκόνη. • Αποφεύγετε επαφή με τα μάτια. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής σύντομα μετά τον ψεκασμό. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας. • Μην μολύνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του (Μην καθαρίζετε τα ψεκαστικά κοντά σε επιφανειακά ύδατα. • Αποφύγετε μόλυνση μέσω αποχετεύσεων από αυλές και δρόμους). • Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων για τις καλλιέργειες από τα επιφανειακά ύδατα.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό για 10-15 λεπτά. Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής. Ζητείστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε το σκεύασμα. Ξεπλυνθείτε καλά με νερό για 15 λεπτά. Ζητείστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα. Σε περίπτωση εισπνοής: Βγάλτε τον παθόνα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον σε ανάπαυση, καθιστό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύντε το στόμα με νερό (μόνο αν το άτομο έχει τις αισθήσεις του). Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια και δείξτε την ετικέτα. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

**ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

ARNAK 50 WG

Iprodione 50% (ιπροντιον)

Εναιωρηματοποιησιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: iprodione 50% (β/β)

Βοηθητικές ουσίες: 48,61% (β/β)

Αρ.Εγκρ.Κυκλοφορίας : 60.333/10-8-2012

**ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ. ΔΡΑ ΜΕ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ
ΜΥΚΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ**

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

•Υποππο
καρκινογένεσης



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

•Τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισμούς.Μπορεί να
προκαλέσει μακροχρόνιες
δυσμενείς επιπτώσεις στο
υδάτινο περιβάλλον

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 200 γραμ.



Κάτοχος της έγκρισης - Παρασκευαστής:
CHEMINOVA AGRO Ισπανία
Υπεύθυνος για την Διάθεσή στην αγορά –
Εργοστάσιο συσκευασίας – Διανομή :
ΕΠΙΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπηγάδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ. 210 5555220, 210 5559001-2
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. Γ' Φάση ΒΙ.ΠΕ.Θ-Σίνδος
Τηλ. 2310 795884, Fax: 796741



CHEMINOVA

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε την στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπο πίεση ή με τριπλό ζέπλυμα (τα νερά του ζεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Για υπόλοιπα ή τυχόν προϊόν για απόσυρση, καύση σε εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα τρεις φορές με νερό (με 10% του όγκου X 3 φορές)
Δεν απαιτείται χρήση απορρυπαντικού.

Συνθήκες αποθήκευσης – Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΗΜ ΛΗΞΗΣ
ΑΡ, ΠΑΡΤΙΔΑΣ

