

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Η ανάμιξη/φόρτωση του προϊόντος να γίνεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Μην ελαβείτε στην περιοχή εφαρμογής πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία κατά τη διάρκεια εφαρμογής στο θερμοκήπιο.

ΠΡΑΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Γενικές πληροφορίες: Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα, τα μάτια και το ρουχισμό. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα: Ζητήστε ιατρική βοήθεια. Επιδείξτε τον περιέκτη, την ετικέτα και/ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στον γιατρό. Αφαιρέστε/βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Αντιόδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντιόδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία (απολύμανση, ζωπικές λειτουργίες).

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ψεκαστική ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου III της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει απολαστική και διαλασματική κίνηση, ενώ το dimethomorph δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος και εμφανίζει επίσης διαλασματική κίνηση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασιμό καλύτερες της φυλλικής επιφάνειας.

ΤΟΜΑΤΑ (ΥΠΛΙΘΡΟΥ, ΒΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (*Phytophthora infestans*) με δόση 250-400 κ.ε./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. Συστηνται η έναρξη προληπτικών ψεκασιμών στην αρχή της άνθησης. Η μέγιστη δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται με το μικρότερο όγκο ψεκαστικού υγρού, ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα (200-250 κ.ε./στρέμμα). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-8 ημέρες, εφόσον απαιτείται.

ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ (ΒΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (*Pseudoperonospora cubensis*) και του ωιδίου (*Erysiphe cichoracearum*) με δόση 250 κ.ε./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (250 κ.ε./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. Συστηνται προληπτικοί ψεκασιμοί με την έναρξη του σχηματισμού των καρπών. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-8 ημέρες, εφόσον απαιτείται.

ΠΕΠΙΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΣΙ (ΥΠΛΙΘΡΟΥ): Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (*Pseudoperonospora cubensis*) με δόση 250 κ.ε./στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 80 λίτρα/στρέμμα. Συστηνται η έναρξη προληπτικών ψεκασιμών με την εμφάνιση του 5^{ου} πραγματικού φύλλου. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες, εφόσον απαιτείται.

COACH® PLUS

4/7.2 EC

Pyraclostrobin/Dimethomorph (πυρακλόστροβιν/ντιμεθομόρφ)

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: Pyraclostrobin 4% β/ο (ομάδα μεδεξυκαρβαμικά), Dimethomorph 7.2% β/ο (ομάδα μορφολινικά), Βοηθητικές ουσίες 89% β/β.

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση ασθενειών που οφείλονται σε παθογόνα της ομάδας Ωμομυκήτων (περονόσποροι) και Ασκομυκήτων (ωιδία).

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. • Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. • Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιος επίπτωσης. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Αποφύγετε να ανανέψετε ατμούς. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και ενδυμασία. • Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό. • Μολύψτε τη χυμίστη ποσότητα. • Αφαιρέστε/βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. • ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. • Ξεπλύντε το στόμα. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. • Για να αποφευχete κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 60373/7-6-2013

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., © Σχίμα κατατεθέν BASF
Παραδείου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι,
τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr.



ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

θέση Ήροφυλάδο, 19600 Μόδρα Αττικής
Τηλ: 210 5550431 • Fax: 210 5556100
Θεσ/νίκη: 53 Ο.Τ. Γ, Θάσος, ΒΙΠ.Ε.Α. - Σίνδος
Τηλ: 2310 795884 • Fax: 2310 796741
www.ellagret.gr



ΜΑΡΟΥΛΙ, ΛΥΚΟΤΡΙΒΟΛΟ (ΥΠΛΙΘΡΟΥ): Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (*Bremia lactucae*) με δόση 200-250 κ.ε./ στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40-80 λίτρα/στρέμμα. Συστηνται η έναρξη προληπτικών ψεκασιμών με την εμφάνιση του 5^{ου} πραγματικού φύλλου. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-8 ημέρες, εφόσον απαιτείται.

ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΣΚΟΡΔΟ (ΥΠΛΙΘΡΟΥ): Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (*Peronospora destructor*) με δόση 500 κ.ε. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40-50 λίτρα / στρέμμα. Συστηνται η έναρξη προληπτικών ψεκασιμών με την εμφάνιση του 3^{ου} φύλλου. Συστηνται η προσηθνη επιφανεοδραστηκός ουσίας. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-8 ημέρες, εφόσον απαιτείται.

ΠΑΤΑΤΑ: Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (*Phytophthora infestans*) με δόση 200-250 κ.ε./ στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 80-100 λίτρα/στρέμμα. Συστηνται η έναρξη προληπτικών ψεκασιμών πριν να κλείσουν οι γραμμές της καλλιέργειας. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημέρες, εφόσον απαιτείται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η δόση είναι ανάλογη της πίεσης προσβολής. Τα μικρότερα μεσοδιάστημα να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις υψηλής κίνησης εμφάνισης της προσβολής. 2. Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. 3. Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προστατεύσεων.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις προτιμώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναλόγως την αναμενόμενη δόση του κλειδώματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναλόγως συνεχώς και σε όλη τη διάρκεια του ψεκασιμού.

ΣΥΜΒΑΤΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΚΙΤΟΚΗΤΗΤΑΣ:

• Εφαρμόστε το COACH® PLUS 4/7.2 EC προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και αποψύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές. • Εφαρμόστε το COACH® PLUS 4/7.2 EC σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης (Μέγιστος αριθμός συνεχόμενων εφαρμογών: 2). • Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.

ΤΕΛΕΥΤΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Τομάτα (Υπλιθρού, Βερμοκηπίου), Πεπόνι, Καρπούζι (Υπλιθρού), Πατάτα: 3 ημέρες, Αγγούρι, Κολοκύθη (Βερμοκηπίου): 1 ημέρα. Μαρούλι, Λυκοτριβόλο, Κρεμμύδι, Σκόρδο (Υπλιθρού): 7 ημέρες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Συστηνται ο καθαρισμός του ψεκασιμού με νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΧΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Οι οφθαλμοί και τα δοχεία ξεπλένονται υποψήφια με κατάλληλο μηχανικό υγρό ή γίνεται τρίπλο ξεπλύμα (για νερό το ξεπλύμα γίνεται το πρώτο στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρίπλο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ανατινάζονται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ελαιολόγους.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική συσκευασία του σκευασμού του, σε χώρο δροσερό, ήπιο και καλά αεριζόμενο.



Αρ. Πρωτόκολλο: Ως άνω μέγρο συσκευασίας. Ημερομηνία παρασκευής: Ως άνω μέγρο συσκευασίας. Ημερομηνία λήξης: Ως άνω μέγρο συσκευασίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 500 Κ.Ε.Κ.