

# DIZIRAM 76WG


ZIRAM (ZIPAM) 76%

ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ

Εγγυημένη σύνθεση: ZIRAM: 76 % β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 21,65 % β/β

## ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΘΕΙΟΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



### ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Μπορεί να προκαλέσει δερματική αλλεργική αντίδραση.
- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
- Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα απο παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Αρ. έγκρισης κυκλοφορίας: 60270/24.02.2010

ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ: 1 ΚΙΛΟ

FMC®



Κάτοχος της έγκρισης : FMC Chemical sprl, 9/3 Boulevard de la plaine 1050 Brussels , Βελγιο  
Παρασκευαστής : Tamino B.V.B.A., Βέλγιο  
Εργοστάσιο συσκευασίας – Υπεύθυνος για τη διάθεση στην ελληνική αγορά – Διανομή :

**ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής  
Τηλ.: 210 5550431, 210 5556100  
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 53 Ο.Τ. , Γ' Φάση, ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Σίνδος  
Τηλ.: 2310 795884 - Fax: 2310 796741  
[www.ellagret.gr](http://www.ellagret.gr)



**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Το Ziram είναι προστατευτικό διθειοκαρβαμικό μυκητοκτόνο για προληπτική εφαρμογή στις καλλιέργειες: Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) για το φουζικλάδιο και την καστανή κηλίδωση και Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά) για τον εξώασκο, το κορόνιο και τη φαιά σήψη. Το Ziram παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων και σε ορισμένες περιπτώσεις την ανάπτυξη του μυκηλίου εμφανίζοντας προληπτική δράση.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ομοίομορφοι ψεκασμοί καλύψεως. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από το μέγεθος και τον όγκο των φυτών και τη συνθήκη γεωργική πρακτική ψεκασμού μυκητοκτόνων.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

### ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ :

**ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΔΟΣΕΙΣ (σε γραμ./100 λίτρ.ψεκ. Υγρό) - ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**

**Μηλιά:** Φουζικλάδιο: 250-300γρ. Προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια της πράσινης κορυφής, ρόδινης κορυφής, έναρξης πτώσης πετάλων, πλήρους πτώσης πετάλων.

**Αχλαδιά:** Φουζικλάδιο, Καστανή Κηλίδωση: 250-300γρ. Προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια της πράσινης κορυφής, λευκής κορυφής, πτώσης πετάλων, έναρξης ωρίμανσης του καρπιδίου.

**Ροδακινιά:** Εξώασκος, Κορόνιο: 250-300γρ. Προληπτικοί ψεκασμοί το φθινόπωρο κατά την πτώση των φύλλων, τέλος χειμώνα-αρχές άνοιξης πριν την διόγκωση των οφθαλμών, κατά την άνθηση. Φαιά σήψη: 250-300γρ. Στο στάδιο ρόδινης κορυφής, έναρξης πτώσης πετάλων, πλήρους πτώσης πετάλων.

**Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτ/στρέμμα):** 100-120.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες εφόσον απαιτείται.

**Παρατηρήσεις:** 1) Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης των φυτών.

2) Όταν απαιτείται όγκος ψεκαστικού υγρού μεγαλύτερος από 100 λίτρα/στρέμμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μικρότερη συνιστώμενη δόση ανά 100 λίτρα νερό.

3) Οι εφαρμογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που αυτές εφαρμόζονται.

**Διαχείριση Ανθεκτικότητας:** Λόγω του τρόπου δράσης και του χαμηλού κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η συνδυασμένη εφαρμογή του, ή η εναλλαγή του με τα νέα εκλεκτικά και θεραπευτικά μυκητοκτόνα, για διευκρίνιση του φάσματος δράσης και για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των νέων θεραπευτικών μυκητοκτόνων.

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** Μηλιά: Τέλος άνθησης (πτώση πετάλων), Αχλαδιά: 60 ημέρες, Ροδακινιά: Τέλος άνθησης (πτώση πετάλων).

Αριθμός Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας  
Ημερ. Παρασκευής: Βλέπε επί της συσκευασίας

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε τα προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να τα ξεπλύνετε.
- Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
- Εάν παρατηρήει ερεθισμό του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκευθείτε γιατρό.
- Μαζέψτε τη χυμμένη ποσότητα.
- Φοράτε κατάλληλες μπότες και μάσκα με φίλτρα και προσωπίδα κατά την ανάμιξη / φόρτωση ή ψεκασμό.
- Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.
- Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή με ψεκαστήρα πλάτης.
- Μην καταναλώνετε οινόπνευμα ποτά πριν και μετά τον ψεκασμό

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμείνει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα αμέσως, πιείτε άφθονο νερό, προκαλέστε εμετό, εφόσον ο παθών έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ήρεμο. Εάν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή χορηγήστε οξυγόνο. Καλέστε γιατρό.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777**

**ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ**  
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς  
να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων  
από τα επιφανειακά ύδατα για τις δένδρωδεις καλλιέργειες.

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στις ποικιλίες μηλιάς "Golden Delicious", αχλαδιάς "Κρυστάλλι".

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο σκοτεινό, ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

