

Δηλώσεις Προφύλαξης:

Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις /αέρια /σταγονίδια /ατμούς / εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. **Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.**

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα λερωμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό. **ΜΗΝ** προκαλέσετε εμετό.

Αντιδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους, προστατευόμενα από το κρύο. Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. Μη ψεκάζετε όταν φυσάει και αντίθετα με τη φορά του ανέμου. Ψεκάστε με πίεση ως 3 Atm (40 - 50 psi). Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας. Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται. Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με διάλυμα 50 ml Agral ανά 100/λίτρου νερού.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας και εφόσον πρόκειται να ακολουθήσει καλλιέργεια δημητριακών, είναι αναγκαία μία περίοδος αναμονής 3 μηνών πριν τη σπορά.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες): Βαμβάκι 120, Ζαχαρότευτλα: 110, Πατάτα: 60, Τομάτα: 30

SELAS²⁴ EC

Clethodim (Κλεθοντίμ)

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: Clethodim 24% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 72,9% β/β

**Εκλεκτικό
μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο
με διασυστηματική δράση
σε αγρωστώδη ζιζάνια.**

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει clethodim.
- Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο.

* Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ

Αριθμός άδειας διάθεσης: 7825/30.05.2007

Κάτοχος της άδειας: Arysta LifeScience S.A.S, Route d'Artix BP 80, 64150 Noguères, Γαλλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Arysta LifeScience Ελλάς ΑΕ, Ριζαρείου 16, 15233 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210-5578777



Εργοστάσιο συσκευασίας - Διανομή:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431, 210 5556100
www.ellagret.gr

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο με διασυστηματική δράση σε αγρωστώδη ζιζάνια. Σε βιομηχανικό επίπεδο παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων (παρεμποδιστής του ενζύμου καρβοξυλάση του ακετυλοσυνενζύμου Α).

Τρόπος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση έως 3 Atm με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα με μπεκ σκούπας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινείστε καλά τη φιάλη συσκευασίας και προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας συγχρόνως για 2 - 3 λεπτά, προσθέστε το λάδι και απογεμίστε το δοχείο με συνεχή ανάδευση. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Πεδίο Εφαρμογής - Στόχοι - Δόσεις (κ. εκ. σκευάσματος /στρέμμα): ΒΑΜΒΑΚΙ, ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΠΑΤΑΤΑ, ΤΟΜΑΤΑ: Αλεπονουρά, Αγριοβρώμη, Μουχρίτσα, Σετάριας: 75-100 + 0,5% λάδι *. Ψεκασμός όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο των 2-3 φύλλων μέχρι αδελφώματος. Βέλιουρας: 100-125 +0,5% λάδι *. Ψεκασμός στο στάδιο των 20-30 εκ. Αγριάδα: 125-150 + 0,5% λάδι *. Ψεκασμός στο στάδιο των 20 - 30 εκ.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα / στρέμμα): 20 - 40.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: *Να χρησιμοποιείται ένα μη φυτοτοξικό παραφινικό ορυκτέλαιο.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναφέρονται στην ετικέτα, το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνιστάται ο συνδυασμός του με άλλα σκευάσματα, με εξαίρεση την προσθήκη λαδιού που πρέπει πάντα να γίνεται.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος να ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από την άμεση έκθεσή του στο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.



ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: