

DOURO 10 EC

ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ (EC)
Penconazole (πενκοναζόλ) 10%

Εγγυημένη σύνθεση: Penconazole 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 89,7% β/β

**ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ**

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ



**ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ. ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.**

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 60.232/23-12-08

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
SAPEC AGRO SA, Alameda dos Oceanos, lote 1.06.1.1 - 3οΑ, Parque das Nacoes,
1990-207, Lisboa, Πορτογαλία



Υπεύθυνος Επικοινωνίας - Διανομέας:
ΕΛΤΟΝ

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., Θέση Ντράσεζα (ΒΙΠΑ),
Τ.Κ. 190 11 Αυλώνας Αττικής, Τηλ.: 22950 29350, Φάξ: 22950 29305

Προφυλάξεις: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντιδοτο: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης:** Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να μην προκληθεί εμετός. Μη χορηγείτε τίποτε από το στόμα σε ασθενή που έχει χάσει τις αισθήσεις του. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:
Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προψησμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 200 κ.εκ.

Καλλιέργειες - Ασθένειες - Δόσεις (ανά 100 λίτρα ψεκ. υγρού) - Χρόνος εφαρμογής: Βερικοκιά: Δόση 35-50 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 150-250 λίτρα/στρ. Για **Ίδιιο** εφαρμογές στην πτώση των πετάλων, στην απόσπαση του κάλυκα και 20 ημέρες αργότερα. **Ροδακινιά:** Δόση 35-50 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 150-250 λίτρα/στρ. Για **Ίδιιο** εφαρμογές στην πτώση των πετάλων, στην απόσπαση του κάλυκα και 20 ημέρες αργότερα. **Αμπέλι:** Δόση 25-40 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 50-150 λίτρα/στρ. Για **Ίδιιο**, εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων και εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, ψεκασμοί όταν οι βλαστοί αποκτήσουν 2-3 φύλλα και κατά την άνθηση. Οι ψεκασμοί μπορούν να συνεχιστούν ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες. **Κολοκυνθοειδή (Πεπόνι, Καρπούζι):** Δόση 25-35 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρ. Για **Ίδιιο** εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες. Η μικρή δόση συνιστάται για ψεκασμούς κάθε 7-14 ημέρες και η μεγάλη κάθε 10-16 ημέρες. **Καπνός:** Δόση 35-50 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 50-150 λίτρα/στρ. Για **Ίδιιο** 2-3 ψεκασμοί σε όλα τα στάδια με μεσοδιαστήματα 14 ημέρες. **Καλλωπιστικά υπαίθρου:** Δόση 35-50 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρ. Για **Ίδιιο** μέχρι 5 ψεκασμοί ανάλογα με την ένταση της προσβολής και μεσοδιαστήματα 14 ημέρες.

Παρατηρήσεις: Η μικρή δόση να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις χαμηλής πίεσης προσβολής. Στο αμπέλι η εφαρμογή του πρέπει απαραίτητα να εναλλάσσεται με μυκητοκτόνα επαφής και οι επεμβάσεις με το σκεύασμα να μην ξεπερνούν τις δύο (2) ανά καλλιεργητική περίοδο.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κολοκυνθοειδή (Πεπόνι, Καρπούζι), Καπνός: 3. Αμπέλι: 2. Καλλωπιστικά υπαίθρου: 5.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συστάμενες οδηγίες χρήσεως.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Βερικοκιά, Ροδακινιά, Καπνός: 21 ημέρες. Αμπέλι: 35 ημέρες. Πεπόνι, Καρπούζι: 3 ημέρες.