

CURENOX 50 WG

Copper oxychloride (Οξυχλωριούχος χαλκός)

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: Μεταλλικός χαλκός 50% β/β (σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού)
Βοηθητικές ουσίες 10.71% β/β

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ



- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / εκνεφώματα. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν. Καλέστε το **ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ** ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Μαζέψτε τη χυμνή ποσότητα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Πενικιλλαμίνη.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους)

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκάσμενη περιοχή για 21 ημέρες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικούς πολτούς, με σκευάσματα mancozeb, maneb, thiram, captan, folpet και με ισχυρά οξέα και αμμωνία.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Είναι φυτοτοξικό στη ροδακινιά, κερασιά και δαμασκηνιά μετά το φούσκωμα των οφθαλμών καθώς και στα κολοκυνθοειδή. Οι ποικιλίες μηλιάς Golden delicious, Jonathan, Reinnete και Staimon είναι ευαίσθητες όταν το σκεύασμα εφαρμόζεται μετά την έναρξη της βλάστησης. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Εσπεριδοειδή, Αμπέλι (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια), Ελιά, Πατάτα, Ζαχαρότευτλα: 21 ημέρες. Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φιστικιά, Φουντουκιά: 28 ημέρες. Λαχανικά (Υ+Θ): 7 ημέρες. Τομάτα Υπαίθρου: 10 ημέρες, Τομάτα θερμοκηπίου: 7 ημέρες. Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα: Μη Εφαρμοσμένο (Καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκάσμός φυλλώματος

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ρίξτε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος αργά στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας συνέχεια. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σασκούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και σκιερό. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ • ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ • ΔΟΣΕΙΣ (ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού) • **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: (Γκρέιπ φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Νερατζιά). **Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση:** Με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου. **Φυτόφθορα καρπών:** Το δεύτερο 15νήμερο του Οκτωβρίου και επανάληψη μετά από 3 - 4 μήνες. Συνατάται να ψεκάζονται τα χαμηλά κλαδιά μέχρι 1,5 μ. από το έδαφος. **Δόση:** 190 γραμ.

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ: **Κηλίδωση φύλλων:** Στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και το χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών. **Δόση:** 160 γραμ.

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ: **Βακτηριακό έλκος:** Στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές α. μόλις αρχίσουν να πέφτουν τα φύλλα και β. όταν πέσει το 75% των φύλλων. **Δόση:** 160 γραμ.

ΚΑΡΔΙΑ: **Ανθράκωση, Κηλίδωση φύλλων και καρπών:** Εφαρμογές που αρχίζουν πριν εκπτυχθούν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες. **Δόση:** 160 γραμ.

ΦΙΣΤΙΚΙΑ: **Σεπτορίωση:** α. Στην πρώτη εμφάνιση της βλάστησης, β. όταν ο καρπός αποκτήσει μήκος 1 εκ., γ. Μετά από 20 ημέρες δ. αρχές φθινοπώρου μετά τη συγκομιδή των καρπών. **Δόση:** 160 γραμ.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ: (Μηλιά, Αχλαδιά): **Φουζικλάδιο, Σεπτορίωση, Φαϊά σήψη:** Το φθινόπωρο πριν την πτώση των φύλλων και στα στάδια της πράσινης και ρόδινης κορυφής εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. **Βακτηρίωση, Βακτηριακό κάψιμο:** Στις περιοχές που υπάρχει χρόνιο πρόβλημα προσβολών από τα βακτήρια, συνιστώνται δύο εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων. **Δόση:** 250 γραμ.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά): **Κορύνιο, Εξώασκος, Κλαδοσπορίωση:** Στις περιοχές όπου ενδημούν οι ασθένειες, εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών. **Φαϊά σήψη:** Εφαρμογές στη διόγκωση των οφθαλμών και στη ρόδινη κορυφή. **Βακτηριακό έλκος:** Στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων. **Δόση:** 170 γραμ.

ΑΜΠΕΛΙ (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): **Περονόσπορος:** Εφαρμογές όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά την γονιμοποίηση. **Δόση:** 260 γραμ.

ΕΛΙΑ: **Κυκλοκόνιο:** Δύο εφαρμογές: Η πρώτη εφαρμογή το φθινόπωρο λίγο πριν την έναρξη των βροχών και η δεύτερη την άνοιξη όταν τα νέα φύλλα αποκτήσουν μήκος 2 εκ.

ΓΛΙΣΤΟΠΟΡΙΟ: Δύο εφαρμογές: Η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα. **Καρκίνωση:** Εφαρμογές μετά το κλάδεμα και μετά από χαλάρι ή παγετό. **Δόση:** 260 γραμ.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ: (Καρότο, Κρεμμύδι, Πιπεριά, Πράσο, Κουνουπίδι, Λάχανο, Μαρούλι, Σέλινο, Φασόλι, Μπιζέλι): **Περονόσπορος:** Από το στάδιο των νεαρών σπορόφυτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες. **Ανθράκωση, Σεπτορίωση, Κλαδοσπορίωση:** Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7 - 10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **Δόση:** 240 γραμ.

ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ • ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: **Περονόσπορος:** Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **Δόση:** 250 γραμ.

ΚΑΛΛΑΠΙΣΤΙΚΑ: **Περονόσπορος, Φυτόφθορα:** Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **Δόση:** 280-350 γραμ.

ΠΑΤΑΤΑ: **Περονόσπορος:** Όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **Δόση:** 240 γραμ.

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ: **Κερκοσπορίωση:** Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **Δόση:** 350 γραμ.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: Εσπεριδοειδή, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Μηλοειδή, Αμπέλι, Λαχανικά, Ζαχαρότευτλα: 3. Καρυδιά, Φιστικιά, Πυρηνόκαρπα: 4. Ελιά, Τομάτα (Υ+Θ), Πατάτα, Καλλωπιστικά: 2.

ΟΝΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (ΛΙΤΡΑ/ΣΤΡΕΨΜΑ): Εσπεριδοειδή: 125-250, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά, Καρυδιά: 100-150, Μηλοειδή: 100-200, Πυρηνόκαρπα: 100-120, Αμπέλι: 50-150, Ελιά: 150 - 300, Λαχανικά, Τομάτα (Υ+Θ), Πατάτα, Καλλωπιστικά: 50 - 100, Ζαχαρότευτλα: 40.

Παρατηρήσεις: 1) Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση, ιδιαίτερα για τα μηλοειδή. Οι μεγαλύτερες δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που γίνονται όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί, το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής. 2) Στα λαχανικά να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. 3) Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. 4) Στις καλλιέργειες αμπέλι, εσπεριδοειδή, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

Αρ. εγκρ. κυκλοφορίας: 60.010/26-09-2005

Κάτοχος έγκρισης κυκλοφορίας: ALINTRA S.A., Ισπανία
Garbí 3, Polígono Industrial Can Volant, 08150 Parets del Valles, Barcelona, Spain
Παρασκευαστής του σκευάσματος - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία & σήμανση - Εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας:
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES (IQV) S.A., Ισπανία Av. de Rafael Casanova 81,
08100 Mollet del Valles, Barcelona, Spain
Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε., Μουρούζη 9, 106 74 Αθήνα.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Καθαρό Βάρος: 10 ΚΙΛΑ

Αριθ. Παρτίδας (Batch No):
Ημερ. Παρασκευής (Prod.Date):



Διανομή:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Εμπορήςγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ: 210 5550431 • Fax: 210 5556100
Θεσ/νίκη: 53 Ο.Τ., Γ' Φάση, ΒΙΠΕ.Θ. - Σίνδος
Τηλ: 2310 795884 • Fax: 2310 796741
www.ellagret.gr

