

ΘΞΥΚΛΩΡ 50 WP

Copper oxychloride

Εγγυημένη σύνθεση: Μεταλλικός χαλκός 50% β/β (σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού)
Βοηθητικές ουσίες 14,53% β/β

Βρέξιμη σκόνη (WP)

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Επιβλαβές σε περιπτώσεις εισπνοής.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/σταγονίδια. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Διάθεση περιεχομένου/περέκτυπ σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: Εάν έπληξε καταική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΙΣΤΙΠΝΩΣΗΣ:** Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε οσάση που δεικνύει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση.
Αντίδοτο: πενικιλλαμίνη.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε τη συστασμένη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αφού το περάσετε από φίλη στή. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό αναερόντως καλά.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με οργανοφωσφορικά σκευάσματα, θειάφι, carban, zifam, dafline και διθειοκαρβαμιδικά.

Φυτοτοξικότητα: Είναι φυτοτοξικό στη ροδακινιά, κερασιά και δαμασκηνιά αφού φουσκώσουν τα μάρτια καθώς και στα κολοκυνθοειδή. Οι ποικιλίες της μηλιάς Golden Delicious, Jonathan, Penniel και Sialonia είναι ευαίσθητες όταν το σκεύασμα εφαρμόζεται μετά την έναρξη της βλάστησης. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την ανθήση.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Εσπεριδοειδή, Αμπέλι, Ελιά, Πατάτα, Ζαχαρότευπλα: 21 ημέρες, Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φουντουκιά, Φιστικιά: 28 ημέρες, Λαχανικά (Υ+Θ), Τομάτα Εσπεροκίτιου: 7 ημέρες, Τομάτα υπαίθρου: 10 ημέρες, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα: Καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σάκοι/εξοχή) μαζί με τα κομμάτια αφού καταστραφούν προηγούμενος με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δυο (2) χρόνια.

BIO

Επιτρέπεται η χρήση του στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008.

Καθαρό Βάρος:
1 ΚΙΛΟ

Αριθ. Παρτίδας
Ημερ. Παρασκευής

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΣ - ΔΟΣΕΙΣ (γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού) - **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΕΣΠΕΡΙΔΕΙΔΗ** (Γκρέιπφρουτ, Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Νεραντζιά) για **Κορυμόζηρα, Σεπτορίωση** με δόση 190 γρ. Εφαρμογές με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου. Για **Φυτόφθορα καρπών** με δόση 190 γρ. Εφαρμογές το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου και επανάληψη μετά από 3-4 μήνες. Σύνιστάται να ψεκάζονται τα χαμηλά κλαδιά μέχρι 1,5 μ. από το έδαφος. Για **Προσβολή κλαδικών, φύλλων και καρπών** με δόση 190 γρ. Εφαρμογές πριν την έναρξη των βροχών και μετά από χαλαζή ή παγετό. **ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ** για **Κηλίωση φύλλων** με δόση 160 γρ. Εφαρμογές στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και το χειμώνα πριν φουσκώσουν τα μάρτια. **ΚΑΡΥΔΙΑ** για **Ανθράκωση** και **Κηλίωση φύλλων και καρπών** με δόση 160 γρ. Εφαρμογές που αρχίζουν πριν εκπτυχθούν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες. **ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ** για **Βακτηριακό έλκος** με δόση 160 γρ. Εφαρμογές στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια: α) μόλις αρχίσουν να πεφτούν τα φύλλα και β) όταν πέσει το 75% των φύλλων. **ΦΙΣΤΙΚΙΑ** για **Σεπτορίωση** με δόση 160 γρ. Εφαρμογές α) στην πρώτη εμφάνιση της βλάστησης, β) όταν ο καρπός αποκτάει μήκος 1 εκ. γ) μετά από 20 ημέρες και δ) αρχές φθινοπώρου μετά τη συγκομιδή των καρπών. **ΜΗΛΟΕΙΔΗ** (Αχλαδιά, Μηλιά) για **Φουσικλάδιο, Σεπτορίωση, Φαιά Σηψη** με δόση 250 γρ. Εφαρμογές το φθινόπωρο πριν τη πτώση των φύλλων και στα στάδια της πράσινης και ρόδινης κορυφής, εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Για **Βακτηρίωση, Βακτηριακό κάψιμο** με δόση 250 γρ. Εφαρμογές στις περιοχές που υπάρχει χρόνιο πρόβλημα προσβολών από τα βακτήρια, συνιστώνται δυο εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Βερούκια, Κερασιά, Ροδακινιά, Δαμασκηνιά) για **Κορύνηο, Εξώασκο, Κλαδοσπορίωση** με δόση 170 γρ. Εφαρμογές στις περιοχές που ενδημούν οι ασθένειες α) το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και β) στο τέλος του χειμώνα πριν τη διακώση των ορθάλων. Για **Φαιά Σηψη** με δόση 170 γρ. Εφαρμογές στη διάρκεια των ορθάλων και στη ρόδινη κορυφή. Για **Βακτηριακό έλκος** με δόση 170 γρ. Εφαρμογές στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων. **ΑΜΠΕΛΙ** (για επιτραπέζια και οινολογία σταφύλια) για **Περωνόσπορο** και **Ανθράκωση** με δόση 260 γρ. Εφαρμογές όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., λίγο πριν την ανθήση και λίγο μετά την έναρξη της. **ΕΛΙΑ** για **Κυκλοκόνιο** με δόση 260 γρ. Δυο εφαρμογές. Η πρώτη το φθινόπωρο λίγο πριν την έναρξη των βροχών και η δεύτερη την άνοιξη όταν τα νέα φύλλα αποκτήσουν μήκος 2 εκ. Για **Γλοισπόριο** με δόση 260 γρ. Δυο εφαρμογές. Η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα. Για **Καρκίνωση** με δόση 260 γρ. Εφαρμογές μετά το κλάδεμα και μετά από χαλαζή ή παγετό. **ΛΑΧΑΝΙΚΑ** (Καρτότο, Κρεμμύδι, Πιπεριά, Πράσο, Κουνουπίδι, Λαχανό, Μαρούλι, Σέλινο, Φασόλι, Μπιζέλι) για **Περωνόσπορο** με δόση 240 γρ. Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφυτών και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες. Για **Ανθράκωση, Σεπτορίωση, Κλαδοσπορίωση** με δόση 240 γρ. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ)** για **Περωνόσπορο** με δόση 250 γρ. Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **ΠΑΤΑΤΑ** για **Περωνόσπορο** με δόση 240 γρ. Εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν ύψος 15 - 20 εκ. και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΠΛΑ** για **Κερκοσπορίωση** με δόση 350 γρ. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **ΚΑΛΩΔΙΣΤΙΚΑ** για **Περωνόσπορο, Φυτοφθορά** με δόση 200-350 γρ. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.

Παρατηρήσεις: 1) Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την ανθήση, ιδιαίτερα για τα μηλοειδή. 2) Οι μεγαλύτερες δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που γίνονται όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί, το εμρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής. 3) Στα λαχανικά να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. 4) Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. 5) Στις καλλιέργειες: αμπέλι, εσπεριδοειδή, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά μετά κάλυψη να ακολουθούνται στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προεπιδοτήσεων. 6) Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): Εσπεριδοειδή 125-200, Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φουντουκιά 100-150, Φιστικιά 100-125, Μηλιά, Αχλαδιά 100, Πυρηνόκαρπα 100-120, Αμπέλι, Τομάτα (Υ+Θ), Λαχανικά, Πατάτα, Καλλιπαστικά 50-100, Ελιά 150, Ζαχαρότευπλα 40.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Εσπεριδοειδή, Ελιά, Τομάτα (Υ+Θ), Πατάτα, Καλλιπαστικά: 2. Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φουντουκιά, Μηλιά, Αχλαδιά, Αμπέλι, Λαχανικά, Ζαχαρότευπλα: 3. Φιστικιά, Πυρηνόκαρπα: 4.

Αριθμός άδειας διάθεσης στην αγορά: 60774/19.12.2018
Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά Εργοστάσιο συσκευασίας - Διανομή:
ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
Θέση Ξηροπηγάδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5555 4310, 210 5556 100
www.ellagret.gr

