

Τρόπος εφαρμογής: Φεκασμός φυλλώματος με εστιακή εφαρμογή.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο με νερό ως τη μέση. Ρίχνουμε την απαραύμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Πρέπει οπωδήποτε να ξεπλένετε τον ψεκαστήρα μετά την χρήση του GENOXONE ZX και πάτε μόνο με νερό. Συνιστάται η χρήση διαλύματος 3% οικιακής αμμωνίας. Μη χρησιμοποιείστε τον ψεκαστήρα για άλλο πριόνι αν δεν τον ξεπλύνετε σχολαστικά σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 1. Αραίωστε το ψεκαστικό διάλυμα που έχει απομείνει τουλάχιστον 5 φορές και ψεκάστε το στην ίδια καλλιέργεια ή σε άλλη που έχει εφαρμοστεί το πριόνι (σε αψέκαστη ζώνη) ή σε τιμήμα του αγρού όπου δεν έχει εφαρμοσθεί η μέγιστη συνιστώμενη δόση). 2. Γεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό, κυκλοφορείστε το μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απογείστε το βυτίο με καθαρό νερό και αφήστε το επί δύο ώρες. Στην συνέχεια αδειάστε το τελείως. 3. Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό. 5. Αφαίρεστε φίλτρα και μπέκ και απομείνετε τα ξεχωριστά σε δυσχεία που πρέχει το διάλυμα καθαρισμού που αναφέρεται στο σημείο 3 στην ίδια συγκέντρωση και στη συνέχεια ξεπλύντε με καθαρό νερό. Μη ρίχνετε ποτέ τα νερά του καθαρισμού σε αποχετεύσεις ή επιφανειακά νερά ώπτες κοντά σε πηγάδια ή αλλού υδάτων πάρους ή άλλες καλλιέργειες ή έδαφη τα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν με άλλες καλλιέργειες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού πριόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στην συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσμιο ή τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακτηση ενέργειας.

Συνδιαστικότητα:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΑΚΑΛΙΑΙΡΕΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 1) για Βάτα (*Rubus spp.*), θάμνοι-πουρνάρια, ξυλώδης διάλαση, πλατύψυλλα ζιζάνιαⁱⁱ) ευαίσθηση: Κίριοι, Τουσκιάδια, Επιλόβιο, Γεράνιⁱⁱ μετρώντας ευαίσθηση: Αγιορέαδικο: Ένας ψεκασμός φυλλώματος με εστιακή εφαρμογή όταν το φύλλωμα έχει αναπτυχθεί ικανοποιητικά (BBCN 13 ως BBCN 91) από άνοιξη μερικών τέλων καλοκαιριού με Δόση: 125 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα (max) και δύο ψεκαστικού υγρού 10 λίτρα/ στρέμμα (ή 1250 κ.εκ. σκευάσματας ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού). 2) για αποζημρωσή κούτσουρων, κομμένων κορμών: Απευθείας εφαρμογή στον κομμένο κορμό, αμέσως μετά το κόψιμο του κορμού, με ψεκασμό ή με επάλεψη. Δόση: Διάλυση σε αναλογία 1:2 σε νερό και εφαρμογή 325 ml/m² επιφάνειας κορμού.

Παρατηρήσεις: 1) Εστιακή εφαρμογή του πριόντος με κατεργασία ≤20% της περιοχής.

Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών ανά Καλλιέργεια Περίοδο: Μία (1).

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκευάσμα μπορεί να χρησιμοποιείται ή να αποκλείστε: Να αποφευχθεί η διασπορά σταγονίδων σε γειτονικές καλλιέργειες ή θερμοκηπία και η επαφή σταγονίδων με κωνοφόρα ή άλλα δένδρα.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ

- εφαρμογής και σπόρων ή φύτευσης των καλλιέργειών που ακολουθούν: Η ελάχιστη περιόδος ενός μήνας είναι απαραίτητη μεταξύ της εφαρμογής του ζιζανιοκτόνου και της σπόρως σιτρών. Σπόρα ή φύτευση πλατύψυλλων καλλιέργειών θα πρέπει να αποφεύγεται την ίδια καλλιεργητική περίοδο με την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου. Φύτευση δένδρων μπορεί να γίνει ένα μήνα μετά την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

- της πρόσδεσης του ανθρώπου ή των ζωών στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκευάσμα: Για τα παραγωγικά ζώα 14 ημέρες. Για τον άνθρωπο όταν το ψεκαστικό υγρό έχει στεγνωθεί εντελώς.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μη Εφαρμόσιμο

Στοιχεία φυτοποιητικής, ευαισθησίας ποικιλίων και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τη προϊόντα τους: Μη Εφαρμόσιμο

Συνθήκες αποβίβασης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του και σε μέρους ξηρό δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.



2,4-D 9,3% + Triclopyr 10,36 %

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για θάμνους, βάτα/πουρνάρια, ξυλώδη φυτά και άλλα πλατύφυλλα ζιζάνια.

Εγγυημένη Σύνθεση:

Δραστικές ουσίες: **2,4-D 9,3% 6/o, Triclopyr 10,36 % 6/o**
(pure 2,4-D 93 g/L ως 2,4-D 2EHE 140.2 g/L,
pure triclopyr 103.6 g/L ως triclopyr BEE 144 g/L)
Βοηθητικές ουσίες: 67,8% β/β

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

ΑΡΙΘ. ΑΔ.ΔΙΑΘ.Α: 70072/ 6-3-2014

Περιεχόμενο: 1L

Κάτοχος της άδειας: AGRIPHAR S.A.

Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée, Belgium

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

Agriphar ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Πιζαρείου 16, T.K. 15233 Χαλάνδρι

Τηλ.: 210 5578777



KINΔΥΝΟΣ

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Γάντια κατά την ανάμηξη/ γέμισμα και κατά την εφαρμογή. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει triclopyr. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης: Φύλασστε κλειδωμένο - Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, γυμνές φλόγες. Μην καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το δέρμα σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το πριόνι. Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικά γάντια. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό. Μη ρυπαίνετε το νερό με το πριόνι ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας: **10 μέτρων** από τα επιφανειακά υδάτα για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων, **15 μέτρων** από τα επιφανειακά υδάτα για την καταπολέμηση σε βάτα (*Rubus spp.*), θάμνους-πουρνάρια, ξυλώδη βλάστηση την άνοιξη και **30 μέτρων** από τα επιφανειακά υδάτα για την καταπολέμηση σε βάτα (*Rubus spp.*), θάμνους-πουρνάρια, ξυλώδη βλάστηση την άνοιξη και **30 μέτρων** από τα επιφανειακά υδάτα για την καταπολέμηση σε βάτα (*Rubus spp.*), θάμνους-πουρνάρια, ξυλώδη βλάστηση το καλοκαίρι.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 10-15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Αν επιλένετεν συμπάτωμα σε πόνο, δάκρυα, ερυθρότητα, ζητήστε ιατρική συμβούλη. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε όλα τα λερώμένα ρούχα και πλύνετε το δέρμα με νερό και σαπουνί. Εάν υπάρξει ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβούλη και δείξτε την ετικέτα. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφερέτε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Χορήγηστε οξυγόνο αν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή. Εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή αν χρειαστεί. Ζητήστε ιατρική συμβούλη και δείξτε την ετικέτα. Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέστε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο αν ο παθών έχει τις αισθήσεις του). Ζητήστε ιατρική συμβούλη και δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν. Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία και συμβουλεύετε το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

Αριθ. Παρτίδας (BATCH No)

Ημερ. Παραγωγής (MFG DATE): Βλέπε φιάλη

CA603757 GENOXONE.indd 1

