

ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ.

Υγρό διάλυμα λιπάσματος με βάση τον ψευδάργυρο.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Ψευδάργυρος (Zn), υδατοδιαλυτός	3% β/β
---------------------------------	--------

ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Άλατα ψευδαργύρου.

ΦΥΣΙΚΟ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

pH: 4 περίπου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ

Φιάλες πολυαιθυλενίου 1L, με καθαρό βάρος 1,05Kg ± 2%.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να φυλάσσεται στην αρχική του συσκευασία, σε ξηρό και δροσερό μέρος σε θερμοκρασίες μεταξύ 0°C και 35°C, για να διατηρηθεί σταθερό για τουλάχιστον 3 χρόνια.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102: Μακριά από παιδιά. P264: Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα αποκομιδής απορριμμάτων.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

1L



INSUMOS PARA AGRICULTURA ECOLÓGICA

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 834/2007 (ΕΕ L 189) και 889/2008 (ΕΕ L 250), όπως κάθε φορά ισχύουν.

TOTALSER®



Pollgono Industrial Ingruinsa
Av. D. Jerónimo Roure, Parc. 45
46520 Puerto Sagunto
Valencia - España

Tel. +34 962 691 690
Fax +34 962 690 963
servalesa@servalesa.es

www.servalesa.es



ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ-ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Εηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ. 210 5555220 • Fax: 210 5556100

www.ellagret.gr

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Υγρό διάλυμα λιπάσματος με βάση τον ψευδάργυρο. Εφαρμόζεται για την εισαγωγή μοριακών μορφών ψευδαργύρου στο φυτό, οι οποίες δρουν προληπτικά έναντι δυσμενών κλιματολογικών συνθηκών.

Εφαρμόζεται στην **τομάτα**, **μελιτζάνα**, **πατάτα**, και γενικότερα σε όλα τα **σολανώδη**. Οι εφαρμογές ξεκινούν από την μεταφύτευση και επαναλαμβάνονται ανά εβδομάδα για συνολικό διάστημα 4 εβδομάδων.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Γενική δόση για διαφυλλική εφαρμογή: 250-300 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν πρέπει να αναμιγνύεται με θειικά ή αλκαλικά προϊόντα.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Εγγυόμαστε το περιεχόμενο, τις ιδιότητες και την ποιότητα του σκευάσματος, μόνον όταν αυτό βρίσκεται σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία. Διάφορες παράμετροι, πέρα από τον έλεγχο μας, όπως η προετοιμασία του μείγματος, οι δόσεις εφαρμογής, η τεχνική της εφαρμογής, οι καιρικές συνθήκες κ.α., μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν σε καλλιέργειες, στο έδαφος ή/και στον ίδιο, ως αποτέλεσμα της μη τήρησης των οδηγιών χρήσης που αναγράφονται επί της συσκευασίας ή ως αποτέλεσμα ακατάλληλης αποθήκευσης του προϊόντος. Συνιστάται η χρήση του προϊόντος υπό τις συμβουλές γεωτεχνικού. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνον σε περίπτωση διαπιστωμένης ανάγκης, χωρίς να υπερβείτε τις αναγραφόμενες δόσεις. Διαβάστε προσεκτικά το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ