

MORGAN 80 WG

P34860

MORGAN 80 WG

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΙΣ ΦΑΙΜΑ ΔΡΑΣΗΣ		ΔΩΣΟΜΟΓΙΑ			ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Μέγ. αριθμός σε δόσηση για τον καλλιεργητικό περίοδο / Μεσοβιωτική εφαρμογή
ΚΑΛΙΜΕΡΓΕΙΣ	ΣΤΟΧΟΣ	γραμ./ 100 lt φυτ. υγρού	γραμ. σκευασμος στρ. (max)	Ογκος ψεκ. υγρου (%) στρ.)		
Μηλοκοπή: Άγλαδα, Αχλαδία, Κυδωνία, Μηλιά	Φουζκάλινο	180	180	100	A) Εφαρμογής από την αρχή της διάρκειας των καρπών. B) Εφαρμογής μετά το δέσμη των καρπών. C) Εφαρμογής μετά τη συγκομιδή. Συνολικά 10 εφαρμογές σε δέσμη με PH<7.5 και μέχρι 8 εφαρμογές για δέσμη με PH>7.5.	2/7/14
Πυρηνόχορπο: Βέρεκονια	Φασι στηγ (ανθενα και κλαδινα)	150	180	120	Εφαρμογής από την αρχή έως το τέλος της άνθησης.	2/7/14
Πυρηνόχορπο: Δαμγιστονιά	Εξώσακος	300	300	100	Εφαρμογής από την περίοδο της θέρης της βλάστησης.	2/7/14
Πυρηνόχορπο: Ροδανίνα*	Φασι στηγ (ανθενα και κλαδινα)	150	180	120	Εφαρμογής από την αρχή έως το τέλος της άνθησης. Συνολικά 4 εφαρμογές.	2/7/14
Πυρηνόχορπο: Ροδανίνα ** Χρήση Ησονος Σημειωσης	Εξώσακος	300	300	100	Εφαρμογής από το στάδιο της πράσης κορυφής.	2/7/14
Πυρηνόχορπο: Ροδανίνα ** Χρήση Ησονος Σημειωσης	Φασι στηγ (ανθενα και κλαδινα)	150	180	120	Εφαρμογής από την αρχή έως το τέλος της άνθησης.	2/7/14
Πυρηνόχορπο: Κεραδίνια	Φασι στηγ (ανθενα και κλαδινα)	300	300	100	Κατά την πάση των φύλλων (BBCH 93-97).	1
Πυρηνόχορπο:	Φασι στηγ (ανθενα και κλαδινα)	150	180	120	Εφαρμογής έως το τέλος της άνθησης.	2/7/14
Σιταλωνίδη (Υ): Τομάτα	Αλτερνεράψη	-	190	60-120	Με την εφαρμονή των πρώτων συμπτωμάτων.	4/7-14
Αρδόνιας: Αλιβερνίδης** (Χρήση Ησονος Σημειωσης)	Φυσιολογικό ή φύσιμο ή διαλογισμένο έξισσων Κυδωνίας	150	180	120	Από την πάση των φύλλων μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 93-97).	4/7-14
Αλιβερνίας: Λαζαρίδης** Χρήση Ησονος Σημειωσης	Σεπτόρδης	150	180	120	Από την πάση των φύλλων μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 93-97).	4/7-14
Αρδόνιας: Κεραδίνια ** Χρήση Ησονος Σημειωσης	Βοτρυοφάρμαρα Αλτερνάρα	150	180	120	Από την πάση των φύλλων μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 93-97).	4/7-14
Αρδόνιας: Κεραδίνια ** Χρήση Ησονος Σημειωσης	Ανθράκωση	150	180	120	Από την πάση των φύλλων μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 93-97).	4/7-14
Αρδόνιας: Κεραδίνια ** Χρήση Ησονος Σημειωσης	Ανθράκωση	150	180	120	Από την πάση των φύλλων μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 93-97).	4/7-14

Περιπτώσεις:
 1. Εφαρμόζεται προληπτικά.
 2. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται τα προγράμματα των γεωργικών προεδοποιήσεων.
 *Συνολικά 6ών τεόσερες εφαρμογές για την καλλιέργεια της ροδανίνιας.
 ** Για τις ανωτέρω χρήσης ήσονος σημαίστηκε δεν έχει τεκμηρωθεί η απαλεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευασμάτος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές απατελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευασμάτος.

MORGAN 80 WG

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην το χρηματοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. Αποφύγετε να αναπνέετε σκόνη και εκνεύώματα. Μην τώρα, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρηματοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα απομήκηση προστασία για τα μάτια / πρόσωπο. Φοράτε γάντια, προστατευτικά γυαλιά και προστατευτική ενδύμασια κατά την άναμειξη / φόρτωση και προστατευτική ενδύμασια κατά την εφαρμογή. Πλύνετε τα μαλουμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε την επαφήκα με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι ευκόλο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αιμάτια το KΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με αφόνο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση εκθέσης ή πιθανότητας έκθεσης: Σύμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Εάν παρατηρήθει ερεθισμός του δέρματος μετά από την επικατέσταση γιατρό. Σε περίπτωση κατάστασης: Σημήστε αμέσως ιατρική συμβούλη και δείξτε αυτό το δοχείο ή την επικέτα. Μη προκαλέστε εμετό. Μην χρηγείται τίποτα από το στόμα. Σε περίπτωση εισιτούς: Μεταφέρετε τον παθόντα στο καθαρό αέρα και ζητείστε ιατρική συμβούλη. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμός εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφύγετε τη μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόδρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρηματοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει captaν περισσότερο από 2 φορές το χρόνο με μέγιστη δόση 240 γραμ. /στρ. δραστικής ουσίας ακολουθώμενο από 2 φορές το χρόνο με μέγιστη δόση 144 γραμ. /στρ. δραστικής ουσίας σε εδάφη με pH μεγαλύτερο από 7,5. Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρηματοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει captaν περισσότερο από 2 φορές το χρόνο με μέγιστη δόση 240 γραμ. /στρ. δραστικής ουσίας ακολουθώμενο από 2 φορές το χρόνο με μέγιστη δόση 144 γραμ. /στρ. δραστικής ουσίας σε εδάφη με pH μεγαλύτερο από 7,5. Για να προστατέψετε τους μόδισμους οργανισμούς να αφήστε μίαν ομέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από την επιφανειακά ύδατα σε δενδρώδεις καλλιέργειες και 5 μέτρων σε καλλιέργειες τομάτας.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

P34860

MORGAN 80 WG

CAPTAN (ΚΑΠΤΑΝ) Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι
Εγγυημένη σύνθεση: CAPTAN 80% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 12,1% β/β

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ. ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΣΗΜΕΙΑ.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



Αριθμός Αδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60581/06.12.2016

Κάτοχος της άδειας: Arysta LifeScience S.A.S, Route d'Artix, BP 80, 64150 Nogueres, Γαλλία.

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά - Εργοστάσιο συσκευασίας - Διανομή:



ΕΠΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπηγόδο, 19600 Μάρδαρα Αττικής

Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100

www.ellagret.gr

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Δραση σε πολλαπλά σημεία.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος με καλή διαβροχή των φυτών.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύντε την συνιστώμενη δόση σκευασμάτος σε ωκεάνη ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτετε νέα συνιστώμενη δόση σκευασμάτος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευα