



ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ

# PROMESS 72,2 SL (Propamocarb hydrochloride 72,2%)



## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς. Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά γυαλιά. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

*Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης δίνονται στο εσωτερικό της ετικέτας.*

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**



## ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει propamocarb hydrochloride.

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 6678/ 23.7.1997

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: Propamocarb υπό μορφή Propamocarb hydrochloride 72,2% Β/ο (Ομάδα καρβαμιδικών), Βοηθητικές ουσίες: 29,95% Β/Β

Πυκνό διάλυμα (SL)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Απορροφούμενο από τις ρίζες μεταφέρεται στα φύλλα. Στις εφαρμογές φυλλώματος εμφανίζει τοπικά διασυστηματική δράση.

Κάτοχος της Έγκρισης: Arysta LifeScience Benelux Spri  
Rue de Renory 26/1, B4102 Ougrée, Belgium

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε.,  
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι, Τ.Κ.:15233, Τηλ.:210 5578777

Ημερ. Παραγωγής (Batch No):  
Αρ. Παρτίδας (Man. Date):  
Βλέπε συσκευασία





Εφαρμογή στο έδαφος:

**Τομάτα (Υ+Θ), Πιπεριά (Υ+Θ), Αγγούρι (Υ+Θ), Καπνός (Υ+Θ):**

Πύθιο (*Pythium* spp.), Φυτόφθορα (*Phytophthora* spp.),

α) Σπορεία: 250 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού.

Μία (1) εφαρμογή με 2-4 λίτρα διαλύματος ανά τετραγωνικό μέτρο αμέσως μετά τη σπορά.

β) Κατά τη μεταφύτευση: 150 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού.

Μία (1) εφαρμογή με 100 κ.εκ. διαλύματος ανά φυτό με πότισμα, κατά τη μεταφύτευση.

**Καλλωπιστικά (Υ+Θ):** Πύθιο (*Pythium* spp.), Φυτόφθορα (*Phytophthora* spp.),

α) Σπορεία: 250 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογή με 2-4 λίτρα διαλύματος ανά τετραγωνικό μέτρο σπορείου, πριν ή μετά τη σπορά.

β) Φυτώρια: 150 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογή με 5-10 λίτρα διαλύματος ανά τετραγωνικό μέτρο εδάφους με πότισμα πριν τη φύτευση των μοσχευμάτων ή εμφύτευση των ριζών των μοσχευμάτων που ριζοβόλησαν πριν τη μεταφύτευση.

γ) Γλάστρες: 150 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογή 100-200 κ.εκ. διαλύματος ανά γλάστρα διαμέτρου 10-12 εκ. με πότισμα αμέσως μετά τη φύτευση και επανάληψη μετά από 3-6 εβδομάδες εάν χρειαστεί.

δ) Βολβοί: 300 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εμφύτευση στο διάλυμα για 20 λεπτά πριν τη φύτευση.

**Παρατήρηση:**

Για ομοιόμορφη διαβροχή και καλύτερη αποτελεσματικότητα του σκευάσματος πρέπει το έδαφος να είναι υγρό. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε αρκετό νερό ώστε το διάλυμα να διεισδύσει πλήρως στη ζώνη των ριζών.

Εφαρμογή στο φύλλωμα:

**Αγγούρι (Θ), Πεπόνι (Υ+Θ):** Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*), 200-300 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/ στρέμμα (100-300 κ.εκ. /στρ.). Από το στάδιο που τα φυτά έχουν αποκτήσει 3-4 φύλλα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα επεμβάσεων 8-10 ημέρες.

**Πατάτα:** Περονόσπορος (*Phytophthora infestans*), 200-300 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 50 λίτρα/ στρέμμα (100-150 κ.εκ. /στρ.). Από το στάδιο που τα φυτά έχουν αποκτήσει 4-6 πραγματικά φύλλα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα επεμβάσεων 10-14 ημέρες.

**Παρατηρήσεις:**

- Στις εφαρμογές στο φύλλωμα η δόση των 300 κ.εκ. ανά 10 ημέρες για την πατάτα και ανά 8 ημέρες για αγγούρι και πεπόνι, συνιστάται σε περιπτώσεις ιδιαίτερα ευνοϊκών για την ασθένεια συνθηκών ή για θεραπευτικές εφαρμογές.
- Για τις ανωτέρω καλλιέργειες να ακολουθούνται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων στις περιοχές όπου αυτά εφαρμόζονται.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:**

- Για εφαρμογή στο έδαφος: Όλες οι καλλιέργειες: 21 ημέρες.
- Για εφαρμογή στο φύλλωμα: Πατάτα: 15 ημέρες, Αγγούρι: 3 ημέρες, Πεπόνι: 7 ημέρες.



**Τρόπος εφαρμογής:**

1. Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος (μέχρι απορροής).
2. Εφαρμογή στο έδαφος με πότισμα.
3. Εμβάπτιση βολβών πριν τη φύτευση.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Ρίχνουμε μέσα στο ψεκαστικό δοχείο την απαιτούμενη δόση αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε στη συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μεταλλικά μέσα εφαρμογής καθώς το σκεύασμα διαβρώνει τα μέταλλα.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Τριπλό ξέπλυμα με νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (κυτία, φιάλες), ξεπλένονται υπο πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση της ενέργειας.

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Στα καλλωπιστικά ελέγξτε πρώτα κάθε ποικιλία σε μικρή κλίμακα πριν από γενικευμένη χρήση.

**Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:**

Το προϊόν διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο και σε κανονικές θερμοκρασίες. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**

**Εισπνοή:** Μετακινήστε τον ασθενή σε καθαρό αέρα. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια εάν η δύσπνοια επιμένει. **Επαφή με το δέρμα:** Πλύνετε καλά με σαπούνι και νερό. **Επαφή με τα μάτια:** Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. **Κατάποση:** Πλύνετε καλά τη στοματική κοιλότητα, προκαλέστε εμετό εφόσον ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Θεϊϊκή ατροπίνη κατόπιν συμβουλής ιατρού αλλιώς συμπτωματική θεραπεία.  
**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777**



# PROMESS 72,2 SL (Propamocarb hydrochloride 72,2%)



## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς. Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά γυαλιά. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

*Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**



## ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει propamocarb hydrochloride.

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 6678/ 23.7.1997

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: Propamocarb υπό μορφή Propamocarb hydrochloride 72,2% Β/ο (Ομάδα καρβαμιδικών), Βοηθητικές ουσίες: 29,95% Β/Β

Πυκνό διάλυμα (SL)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Απορροφούμενο από τις ρίζες μεταφέρεται στα φύλλα. Στις εφαρμογές φυλλώματος εμφανίζει τοπικά διασυστηματική δράση.

Κάτοχος της Έγκρισης: Arysta LifeScience Benelux Spri  
Rue de Renory 26/1, B4102 Ougrée, Belgium

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε.,  
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι, Τ.Κ.:15233, Τηλ.:210 5578777

Ημερ. Παραγωγής (Batch No):  
Αρ. Παρτίδας (Man. Date):  
Βλέπε συσκευασία



Περιεχόμενο: **500 ml**

