

150x160

OXAMYL SAPEC 10 SL

ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL)
Oxamyl (Οξαμίλ) 10%

Εγγυημένη σύνθεση: Oxamyl 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 90,18% β/β

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΟ ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Α.Ε.Κ.: 3060/11-10-2016

Κάτοχος της άδειας: SAPEC Agro S.A.
Alameda dos Oceanos, lote 1.06.1.1 - 3οΑ,
Parque das Nacoes, 1990 - 207, Lisboa, Πορτογαλία

Υπεύθυνος για τη τελική διάθεση στην αγορά:



ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Κεντρικά: Θέση Νιράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.), 190 11 Αυλώνας Αττικής
Τηλ.: +30 22950 29350-4, Fax: +30 22950 29305,

Υποκατάστημα Βορείου Ελλάδος: ΒΙΠΕΘ. Ο.Τ. 42, Δ.Α.11
Τ.Θ. 174, 570 22 Σίνδος Θεσσαλονίκης,
Τηλ.: +30 2310 788002-3, Fax: +30 2310 799840

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 5 ΛΙΤΡΑ

112016

A-A CLP



150x160

Τρόπος δράσης: Εφαρμόζεται στο έδαφος μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης. Απορροφάται από τις ρίζες των φυτών, μεταφέρεται στο φύλλωμα και έχει δευτερεύουσα δράση κατά εντόμων φυλλώματος. Δρα στο νευρικό σύστημα, λόγω αναστολής της ακετυλοχολινεστεράσης.
Καλλιέργειες – Στόχος – Δόσεις – Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:
Τομάτα, Μελιτζάνα (θερμοκηπίου): Δόση 1 λίτρο/στρ. Για **Νηματώδεις (Meloïdogyne spp, Ditylenchus spp)** 1η εφαρμογή κατά την μεταφύτευση και επανάληψη εφαρμογής εάν χρειαστεί, μετά από 20 ημέρες. **Πιπεριά (θερμοκηπίου):** Δόση 1 λίτρο/στρ. Για **Νηματώδεις (Meloïdogyne spp, Ditylenchus spp)** 1η εφαρμογή κατά την μεταφύτευση και επανάληψη εφαρμογής εάν χρειαστεί, μετά από 20 ημέρες. **Κολοκυνθοειδή θερμοκηπίου με βρώσιμο φλοιό (Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι):** Δόση 1 λίτρο/στρ. Για **Νηματώδεις (Meloïdogyne spp, Ditylenchus spp)** 1η εφαρμογή κατά την μεταφύτευση και επανάληψη εφαρμογής εάν χρειαστεί, μετά από 20 ημέρες.

Παρατηρήσεις: 1. Για την προστασία των μελισσών και άλλων επικονιαστών συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. 2. Σε ορισμένες συνθήκες, η αραίωση του προϊόντος σε νερό άρδευσης, όπου η τιμή έχει ρυθμιστεί στο pH 5,5 (όξινο), βελτιώνει την απορρόφηση και τη διαθεσιμότητά του, από το ριζικό σύστημα των φυτών.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 εφαρμογές ανά 20 ημέρες για όλες τις καλλιέργειες.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται στο έδαφος μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης κατά τη φύτευση ή μεταφύτευση των φυτών. Η συνιστώμενη δόση του σκευάσματος προστίθεται στο σύστημα άρδευσης και η εφαρμογή του συνιστάται να γίνεται λίγο πριν το τέλος της προγραμματισμένης άρδευσης.

Καθαρισμός συστήματος άρδευσης: Τα τελευταία 2-3 λεπτά της άρδευσης να γίνουν με καθαρό νερό ώστε να καθαρίζεται το σύστημα άρδευσης. Αδειάστε τελείως το βυτίο του συστήματος άρδευσης, πλύνετε το με νερό και απορρυπαντικό και ξεπλύνετε το τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να γίνεται εναλλαγή εφαρμογών με νηματωδοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: - **σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:** 120 ημέρες. - **της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Να φοράτε μπότες κατά την είσοδο σε καλλιέργεια στην οποία έχει πρόσφατα εφαρμοστεί το σκεύασμα.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.


Συνδυαστικότητα: Το προϊόν εφαρμόζεται μόνο του.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 21 ημέρες για όλες τις καλλιέργειες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο σύστημα της στάγδην άρδευσης) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα, σε σημεία συλλογής για διαχείρισή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του όταν φυλάσσεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από πηγές ανάφλεξης, θερμότητα, ηλιακό φως και παγετό.

112016



Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης. Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει 1,2 -Benzisotiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Προφυλάξεις: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. «Φορέστε γάντια και ρούχα προστασίας κατά τη διάρκεια όλων των χειρισμών ανάμιξης/φόρτωσης και εφαρμογής». Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης, από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση. Για την προστασία των υπόγειων υδάτων, μην το εφαρμόζετε σε όξινα εδάφη ή σε εδάφη με περιεκτικότητα σε άμμο > 80%. Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Σε καλλιέργειες θερμοκηπίου θα πρέπει να περάσουν 24 ημέρες από την εφαρμογή του σκευάσματος πριν την εξαπόλυση εντόμων επικονίασης και 73 ημέρες για την εξαπόλυση ωφέλιμων εντόμων. **Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** **Πρώτες Βοήθειες – Αντίδοτο: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Να μη χορηγηθεί τίποτα από το στόμα και να μη προκαλέσετε εμετό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε καλά με νερό για τουλάχιστον 15 – 20 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε αμέσως τα λερωμένα, με το ψεκαστικό υγρό, ρούχα. Πλύνετε τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι για 15-20 λεπτά. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα ερεθισμού, ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Αντίδοτο: Θεϊκή ατροπίνη. Μη χρησιμοποιείτε μορφίνη ή 2-PAM.** Το oxamyl (N-methyl carbamate) προκαλεί συμπτώματα αναστολής της χολινεστεράσης. Αν εμφανιστούν προειδοποιητικά συμπτώματα, χορηγήστε θεϊκή ατροπίνη 1,2-2 mg ενδοφλεβίως, κάθε 10-30 λεπτά, μέχρι πλήρη ατροπινισμό. **Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ