

# Rovral® Aquaflo 50 SC

Iprodione (Ιπροντιόν)

Πυκνό εναιώρημα (SC)

Περιεχόμενο: **1** λίτρο

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς  
Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 15125 Μαρούσι,  
Τηλ.: 210-6860130, [www.basf-agro.gr](http://www.basf-agro.gr)

  
We create chemistry

**Εγγυημένη σύνθεση:** Iprodione 50% β/ο (ομάδα δικαρβοξιμίδιων)  
Βοηθητικές ουσίες 55.03% β/β

**Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση, που δρα παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη βλάστηση των σπορίων στους ευαίσθητους μύκητες.**

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
- Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό.
- Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Αριθμ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 6664/2-6-2008

**ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ**



**ΠΡΟΣΟΧΗ**

© Σήμα κατατεθέν BASF

**Αρ. Παρτίδας:** Ως άνω μέρος συσκευασίας.  
**Ημερομηνία παρασκευής:** Ως άνω μέρος συσκευασίας.  
**Ημερομηνία λήξης:** Ως άνω μέρος συσκευασίας.



ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.

## ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό.

**Γενικές συμβουλές:** Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Απομακρύνετε τα εμποτισμένα από το ψεκαστικό υγρό ρούχα. Εάν εμφανιστούν δυσκολίες, αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Δείξτε το δοχείο και/ή το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στο γιατρό. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Αν εμφανιστούν αναπνευστικές ή άλλες δυσχέρειες κρατήστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρατέ τον στον καθαρό αέρα. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν προκληθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε αμέσως τα προσβεβλημένα μάτια με άφθονο νερό κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε άφθονο νερό, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό αν δεν συμβουλευτείτε Κέντρο Δηλητηριάσεων ή γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό ή μην δίνετε τίποτα από στόματος σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

**ΓΙΑΤΡΟΙ:** Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

## ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων για τις δένδρωδεις καλλιέργειες** και **5 μέτρων για τις λοιπές καλλιέργειες** από τα επιφανειακά ύδατα.

## ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ – ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ :** Ψεκασμός φυλλώματος.

**ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ:** Ενάντιον της **Μονιλίας ανθέων (Monilinia laxa)**, με **δόση** 150 κ.εκ/εκατόλιτρο. Κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 14 ημέρες στην άνθηση. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρ. **ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ-ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ-ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ:** Ενάντιον της **Μονιλίας ανθέων (Monilinia laxa)** και καρπών (**Monilinia fructigena**), με **δόση** 100-150 κ.εκ/εκατόλιτρο. Για την Μονιλία των ανθέων κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 14 ημέρες στην άνθηση. Για την Μονιλία των καρπών κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 14 ημέρες στην ωρίμανση των καρπών. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα/στρ. **ΑΜΠΕΛΙ:** Ενάντιον του **Βοτρυτί (Botrytis cinerea)**, με **δόση** 150 κ.εκ/εκατόλιτρο. Κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 14 ημέρες από την πλήρη άνθηση ως την ωρίμανση των καρπών. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **ΦΡΑΟΥΛΑ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου):** Ενάντιον του **Βοτρυτί (Botrytis cinerea)**, με **δόση** 150 κ.εκ/εκατόλιτρο. Κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 10-14 ημέρες ξεκινώντας από την έναρξη της άνθησης. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρ. **ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ:** Ενάντιον του **Βοτρυτί (Botrytis cinerea)**, με **δόση** 100-150 κ.εκ/εκατόλιτρο. Κάνετε 1 ψεκασμό φυλλώματος από το στάδιο της άνθησης μέχρι τη συγκομιδή. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα/στρ. **ΚΑΡΟΤΟ:** Ενάντιον της **Αλτερνάριας (Alternaria spp.)**, με **δόση** 150 κ.εκ/στρ. Κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 10-14 ημέρες με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα /στρ. **ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Ξηρός Βολβός):** Ενάντιον του **Βοτρυτί (Botrytis cinerea)** και της **Σκληρωτινίας (Sclerotinia sclerotiorum)**, με **δόση** 150 κ.εκ/στρ. Κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 10-14 ημέρες με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40-50 λίτρα /στρ. **ΤΟΜΑΤΑ-ΠΙΠΕΡΙΑ-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Θερμοκηπίου):** Ενάντιον του **Βοτρυτί (Botrytis cinerea)**, της **Αλτερνάριας (Alternaria solani)** και της **Σκληρωτινίας (Sclerotinia spp.)**, με **δόση** 100-440 κ.εκ/εκατόλιτρο (τομάτα), 150-440 κ.εκ/εκατόλιτρο (πιπερία, μελιτζάνα). Κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 7-14 ημέρες από την έναρξη της άνθησης μέχρι την πλήρη ωρίμανση. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-150 λίτρα /στρ. (τομάτα), 50-100 λίτρα /στρ. (πιπερία, μελιτζάνα). **ΑΓΓΟΥΡΙ-ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ ΤΟΥΡΣΙ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου):** Ενάντιον του **Βοτρυτί (Botrytis cinerea)** και της **Σκληρωτινίας (Sclerotinia spp.)**, με **δόση** 100-150 κ.εκ/εκατόλιτρο. Κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 10-14 ημέρες από την έναρξη της άνθησης μέχρι την πλήρη ωρίμανση. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα /στρ. (υπαίθρος), 50-150 λίτρα/στρ. (θερμοκήπιο). **ΠΕΠΟΝΙ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)-ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Υπαίθρου):** Ενάντιον του **Βοτρυτί (Botrytis cinerea)** και της **Σκληρωτινίας (Sclerotinia spp.)**, με **δόση** 100-150 κ.εκ/εκατόλιτρο. Κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 10-14 ημέρες από την έναρξη της άνθησης μέχρι την πλήρη ωρίμανση. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **ΚΟΛΟΚΥΘΙ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου):** Ενάντιον του **Βοτρυτί (Botrytis cinerea)** και της **Σκληρωτινίας (Sclerotinia spp.)**, με **δόση** 100-150 κ.εκ/εκατόλιτρο. Κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 10-14 ημέρες από

την έναρξη της άνθησης μέχρι την πλήρη ωρίμανση. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-80 λίτρα/στρ. (υπαίθρος), 50-150 λίτρα/στρ. (θερμοκήπιο). **ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ-ΜΠΡΟΚΟΛΟ:** Ενάντιον του **Βοτρυτί (Botrytis cinerea)**, της **Αλτερνάριας (Alternaria solani)**, της **Σκληρωτινίας (Sclerotinia spp.)** και της **Ριζοκτόνιας (Rhizoctonia solani)**, με **δόση** 150 κ.εκ/στρ. Κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 10-14 ημέρες από την έναρξη σχηματισμού της κεφαλής. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρ. **ΜΑΡΟΥΛΙ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου):** Ενάντιον του **Βοτρυτί (Botrytis cinerea)**, της **Σκληρωτινίας (Sclerotinia spp.)** και της **Ριζοκτόνιας (Rhizoctonia solani)**, με **δόση** 150 κ.εκ/στρ (υπαίθρος) και 120 κ.εκ/στρ (θερμοκήπιο). Κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 10-14 ημέρες μετά το στάδιο των 2-3 φύλλων, μέχρι το κλείσιμο των γραμμών. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-80 λίτρα/στρ. **ΦΑΣΟΛΙ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)-ΑΡΑΚΑΣ (Υπαίθρου):** Ενάντιον του **Βοτρυτί (Botrytis cinerea)** και της **Σκληρωτινίας (Sclerotinia sclerotiorum)** με **δόση** 100-150 κ.εκ/εκατόλιτρο. Κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 10-14 ημέρες κατά την άνθηση. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-80 λίτρα/στρ. (υπαίθρος), 100-150 λίτρα/στρ. (θερμοκήπιο). **ΣΠΑΡΑΓΓΙ:** Ενάντιον του **Βοτρυτί (Botrytis cinerea)**, της **Σκωρίωσης (Puccinia asparagi)** και του **Στεμφυλίου (Stemphylium spp.)** (μέτρια δόση), με **δόση** 150 κ.εκ/στρ. Κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 14 ημέρες με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **ΚΑΛΛΟΠΙΣΤΙΚΑ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου):** Ενάντιον του **Βοτρυτί (Botrytis cinerea)**, με **δόση** 150 κ.εκ/εκατόλιτρο. Κάνετε 2 ψεκασμούς φυλλώματος ανά 10-14 ημέρες με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ.

## ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ :

Ακτινιδιά: 1 - Λοιπές καλλιέργειες: 2.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:** α) Στις περιπτώσεις που υπάρχει εύρος δόσης και εύρος όγκου ψεκαστικού υγρού, η χαμηλότερη δόση θα πρέπει να συνδυάζεται με τον μεγαλύτερο όγκο ψεκαστικού υγρού.

β) Στην Ελλάδα η πολύχρονη εμπειρία από τη χρήση του προϊόντος έχει δείξει άριστη αποτελεσματικότητα με τη μικρότερη δόση στην τομάτα.

## ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

- Εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών που μειώνουν τους πληθυσμούς των παθογόνων.
- Ελαχιστοποίηση της πίεσης επιλογής με ελαχιστοποίηση του αριθμού των εφαρμογών. Ανάλογα με την καλλιέργεια, να μην γίνονται περισσότερες από 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο.
- Χρήση του Rovral® Aquafl 50 SC μόνο ως μέρος ολοκληρωμένων προγράμματος ψεκασμών για όλα τα παθογόνα-στόχους και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων που δεν ανήκουν στα δικαρβοξυμείδια, αρωματικούς υδρογονάνθρακες και φαυλοτυπυρρόλες
- Ειδικά για το Βοτρυτί (παθογόνο υψηλού κινδύνου) όπου η πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας είναι υψηλή, χρησιμοποιήστε χωρίς κατά την καλλιεργητική περίοδο ένα μη-δικαρβοξυμειδικό μυκητοκτόνο και εφαρμόστε το Rovral® Aquafl 50 SC αργότερα, σαν τμήμα προγράμματος ψεκασμών (σε εναλλαγή ως ανωτέρω). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 2 για όλες τις καλλιέργειες. Ειδικά για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς, μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 1. Στις περιπτώσεις που υπάρχει διαπιστωμένη ανθεκτικότητα στο iprodione, διατηρήστε μια καλλιεργητική περίοδο χωρίς έκθεση του παθογόνου στα δικαρβοξυμείδια και εφαρμόστε μυκητοκτόνα άλλων ομάδων που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με αυτά (απουσία δικαρβοξυμειδίων ή σχοχνητό των ανθεκτικών στελεχών στον αγρό τείνει να μειωθεί).
- **Να μην εφαρμόζεται σε εδάφη με pH < 6 καθώς υπάρχει κίνδυνος έκπλυσης.**
- **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΕΚΚΕΥΣΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίστε το ψεκαστικό βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το μέσα στο ψεκαστικό βυτίο αναδεύοντας. Συμπληρώστε στη συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή αναδευση.

## ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: --

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** Ροδακινία, Νεκταρινιά, Βερικοκία, Φράουλα, Τομάτα θερμοκηπίου, Μελιτζάνα θερμοκηπίου, Πιπεριά θερμοκηπίου, Αγγούρι, Αγγουράκι τουρσί, Κολοκυθία (υπαίθρου, θερμοκηπίου) - Φασόλι, Αρακάς (υπαίθρου): 3 ημέρες. Δαμασκηινιά - Φασόλι, Αρακάς (θερμοκηπίου) - Μαρούλι υπαίθρου: 14 ημέρες. Αμπέλι (επιτραπέζια, οινοποιήσιμα), Κρεμμύδι (ξηρός βολβός), Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Μαρούλι θερμοκηπίου: 21 ημέρες. Ακτινιδιά: 15 ημέρες. Καρότο: 27 ημέρες. Πεπόνι (υπαίθρου και θερμοκηπίου), Καρπούζι (υπαίθρου): 7 ημέρες, Αμυγδαλιά - Σπαράγγι: ---.

**ΦΥΤΟΠΟΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Το σκευάσμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

**ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΟΗΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ :** Το σκευάσμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις φορές με καθαρό νερό. Πριν το αναφραγισματίσσετε ξεπλύνετε το πάλι με άφθονο νερό.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Οι φιάλες ξεπλύνονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστίνονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

# Rovral® Aquaflo 50 SC

Iprodione (Ιπροντιόν)

Πυκνό εναιώρημα (SC)

Περιεχόμενο: **1** λίτρο

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς  
Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 15125 Μαρούσι,  
Τηλ.: 210-6860130, [www.basf-agro.gr](http://www.basf-agro.gr)

  
We create chemistry

**Εγγυημένη σύνθεση:** Iprodione 50% β/ο (ομάδα δικαρβοξιμίδιων)  
Βοηθητικές ουσίες 55.03% β/β

**Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση, που δρα παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη βλάστηση των σπορίων στους ευαίσθητους μύκητες.**

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
- Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό.
- Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Αριθμ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 6664/2-6-2008

**ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ**



**ΠΡΟΣΟΧΗ**

© Σήμα κατατεθέν BASF

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.  
Ημερομηνία παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.  
Ημερομηνία λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

