



273x150



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Υπόπνο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει Sulcotrione. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Προφυλάξεις: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Εφοδιαστείτε με ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση. Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις/ σταγονίδια / εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φύρτωση και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία. Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αμέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα, με φυτική κάλυψη. Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αμέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική γη.



Για να αποφυγείτε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να μην προκληθεί έμετος. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα στα οποία έπασκε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, για αρκετά λεπτά και συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα, κρατείστε τον ζεστό και σε ανάπωση. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Κατά την πρώτη - δεύτερη εβδομάδα μετά την εφαρμογή, είναι δυνατόν να παρατηρηθούν χλωρώσεις στα φύλλα του καλαμποκιού. Το φαινόμενο αυτό είναι συνάρτηση της χρησιμοποιούμενης δόσης και είναι παροδικό. Δεν επηρεάζει την ανάπτυξη της καλλιέργειας ή τις αποδόσεις. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται στο γλυκό καλαμπόκι και σε καλλιέργειες σποροπαράγωγής.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος, σε θερμοκρασίες < 40°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

WINNER START OD

Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
Nicosulfuron (Νικοσουλφουρόν) 2% & Sulcotrione (Σουλκοτριόν) 15 %

Εγγυημένη σύνθεση: Nicosulfuron 2% β/ο
Sulcotrione 15% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 83,37 % β/β

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Μίγμα δύο δραστικών ουσιών, του nicosulfuron (ομάδα σουλφονουλεριών), που δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξειγαλακτικού και του sulcotrione (ομάδα τρικετονών), που δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών στο ένζυμο 4-HPPD

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

A.A.D.A.: 70182/22-11-2016

Κάτοχος της άδειας: SAPEC AGRO S.A.

Alameda dos Oceanos, Lote 1.06.1.1 - 3º A,
Parque das Nações, 1990-207 Lisboa, Πορτογαλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:



ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Κεντρικά: Όση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.), 190 11 Αυλώνας Αττικής
Τηλ.: +30 22950 29350-4, Fax: +30 22950 29305

Υποκατάστημα Βορείου Ελλάδος:

ΒΙΠΕΘ, Ο.Τ. 42, Δ.Α. 11 Τ.Θ. 174, 570 22 Σίνδος Θεσσαλονίκης
Τηλ.: +30 2310 788002-3, Fax: +30 2310 799840

Πεδίο εφαρμογής-Στόχος- Δόσεις σκευάσματος - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:
Αραβόσιτος: Για **Αγρωστώδη** και **Πλατύφυλλα ζιζάνια** δόση 200 κ.εκ./στρ. και 100 κ.εκ./στρ. για σπαστή εφαρμογή (1). **Υγρός ψεκαστικό υγρού** 20-40 λίτρα/στρ. Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 2 έως το στάδιο των 9 φύλλων της καλλιέργειας.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο: 1 εφαρμογή για δόση 200 κ.εκ./στρ. και 2/14 ημέρες για σπαστή εφαρμογή με δόση 100 κ.εκ./στρ.

Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια: Μουχρίσα (*Echinochloa crus-galli*, έως τα 2-3 φύλλα), Σετάρια (*Setaria spp.*, έως τα 2-3 φύλλα), Αιματοχόρτο (*Digitaria sanguinalis*, έως τα 2-3 φύλλα), Πόα (*Poa annua*).

Ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια: Βλήτα (*Amaranthus retroflexus*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Σκαρολάχανο (*Mercurialis annua*), Αγριοματάι (*Solanum nigrum*), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*).

Παρατηρήσεις: 1. Όταν έχουμε σταδιακή εμφάνιση των ζιζανίων στο χρόνο, συνιστώνται 2 σπαστές εφαρμογές με δόση 100 κ.εκ./στρ. και μεσοδιάστημα 14 ημέρες. 2. Εφαρμόζεται ιδανικά όταν η θερμοκρασία είναι μεταξύ 15 και 25°C και η υγρασία είναι 60%. 3. Να εφαρμόζεται μόνο με ήπιο καιρό, όταν δεν φυσάει, ώστε να μη μεταφερθεί το ψεκαστικό νέφος σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. 4. Να μη γίνει άρδευση για 4 ώρες μετά τον ψεκασμό. 5. Να μην πραγματοποιείται ψεκασμός εάν αναμένεται βροχή στις επόμενες 6 ώρες. 6. Εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Να μη εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που υποφέρουν από χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω από 10°C), στρες υγρασίας ή όταν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή (πάνω από 25°C).

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους, μικτ τύπου σκούπας, πίεση μικρότερη των 2,5 atm και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση κατά την διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Μετά τον ψεκασμό και για να μην προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια το ψεκαστικό μέσο, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιερητικά μέτρα, κλπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης), για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: - σποράς ή φύτευσης της **προστατευόμενης καλλιέργειας:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το WINNER START, στον ίδιο αγρό, και κατά την ίδια περίοδο, μπορεί να ξανασπαρεί μόνο αραβόσιτος. - **σποράς ή φύτευσης των καλλιερειών που ακολουθούν:** Για σπορά χειμερινών σιτηρών πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες και για σπορά οποιασδήποτε άλλης καλλιέργειας, ένας χρόνος από την εφαρμογή του WINNER START και αφού προηγηθεί βαθιά άρση. - **της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά (6 ώρες).

02/2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ

a side

150x160



WINNER START OD

Ελαιώδες εναιώρημα (OD)

Nicosulfuron (Νικοσουλφουρόν) 2% & Sulcotrione (Σουλκοτριόν) 15 %

Εγγυημένη σύνθεση: Nicosulfuron 2% β/ο, Sulcotrione 15% β/ο, Βοηθητικές ουσίες 83,37 % β/β

Α.Α.Δ.Α.: 70182/22-11-2016

Διασυστηματικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο,

για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Μίγμα δύο δραστικών ουσιών, του nicosulfuron (ομάδα σουλφονουριών), που δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξειγαλακτικού και του sulcotrione (ομάδα τρικετονών), που δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών στο ένζυμο 4-HPPD

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Υποπίπτει για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει Sulcotrione. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Προφυλάξεις: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Εφοδιάστε με ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση. Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις/ σταγονίδια / εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία. Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα, με φυτική κάλυψη. Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική γη.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να μην προκληθεί εμετός. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα στα οποία έπασκεύασμα ή ψεκάστικό υγρό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, για αρκετά λεπτά και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα, κρατείστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Κάτοχος της άδειας: SAPEC AGRO S.A.
Alameda dos Oceanos, Lote 1.06.1.1 - 3º A,
Parque das Nações, 1990-207 Lisboa, Πορτογαλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:



022017

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Κεντρικά: Οέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.), 190 11 Αιυλάνας Αττικής
Τηλ.: +30 22950 29850-4, Fax: +30 22950 29305

Υποκατάστημα Βορείου Ελλάδος:
ΒΙΠΕΘ, Ο.Τ. 42, Δ.Α.11 Τ.Θ. 174, 570 22 Σίνδος Θεσσαλονίκης
Τηλ.: +30 2310 788002-3, Fax: +30 2310 799840

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 5 ΛΙΤΡΑ

Πεδίο εφαρμογής-Στόχος- Δόσεις σκευάσματος - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Αραβόσιτος: Για **Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια** δόση 200 κ.εκ./στρ. και 100 κ.εκ./στρ. για σπαστή εφαρμογή (1). Όγκος ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα/στρ. Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 2 έως το στάδιο των 9 φύλλων της καλλιέργειας.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 εφαρμογή για δόση 200 κ.εκ./στρ. και 2/14 ημέρες για σπαστή εφαρμογή με δόση 100 κ.εκ./στρ.

Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια: Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*, έως τα 2-3 φύλλα), Σετάριας (*Setaria spp.*, έως τα 2-3 φύλλα), Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*, έως τα 2-3 φύλλα), Πόα (*Poa annua*).

Ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια: Βλήτα (*Amaranthus retroflexus*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Σκαρολάχανο (*Mercurialis annua*), Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*), Αντράκλα (*Portulaca oleraceae*).

Παρατηρήσεις: 1. Όταν έχουμε σταδιακή εμφάνιση των ζιζανίων στο χρόνο, συνιστώνται 2 σπαστές εφαρμογές με δόση 100 κ.εκ./στρ. και μεσοδιάστημα 14 ημέρες. 2. Εφαρμόζεται ιδανικά όταν η θερμοκρασία είναι μεταξύ 15 και 25°C και η υγρασία είναι 60%. 3. Να εφαρμόζεται μόνο με ήπιο καιρό, όταν δεν φυσάει, ώστε να μη μεταφερθεί το ψεκαστικό νέφος σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. 4. Να μη γίνει άρδευση για 4 ώρες μετά τον ψεκασμό. 5. Να μην πραγματοποιείται ψεκασμός εάν αναμένεται βροχή στις επόμενες 6 ώρες. 6. Εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Να μη εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που υποφέρουν από χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω από 10°C), στρες υγρασίας ή όταν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή (πάνω από 25°C).

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους, μπεκ τύπου σκούπας, πίεση μικρότερη των 2,5 atm και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση κατά την διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Μετά τον ψεκασμό και για να μην προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια το ψεκαστικό μέσο, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα, κλπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης), για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: - **σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το WINNER START, στον ίδιο αγρό, και κατά την ίδια περίοδο, μπορεί να ξανασπαρεί μόνο αραβόσιτος. - **σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:** Για σπορά χειμερινών σιτηρών πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες και για σπορά οποιασδήποτε άλλης καλλιέργειας, ένας χρόνος από την εφαρμογή του WINNER START και αφού προηγηθεί βαθιά άρση. - **της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά (6 ώρες).

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Κατά την πρώτη - δεύτερη εβδομάδα μετά την εφαρμογή, είναι δυνατόν να παρατηρηθούν χλωρώσεις στα φύλλα του καλαμποκιού. Το φαινόμενο αυτό είναι συνάρτηση της χρησιμοποιούμενης δόσης και είναι παροδικό. Δεν επηρεάζει την ανάπτυξη της καλλιέργειας ή τις αποδόσεις. **Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται στο γλυκό καλαμπόκι και σε καλλιέργειες σποροπαραγωγής.**

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος, σε θερμοκρασίες < 40°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.