

INDOFIL PLUS 80 WP

Mancozeb (Μανκοζέμπ) 80 %

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγυημένη σύνθεση: Mancozeb 80 % β/β, Βοηθητικές ουσίες 5,88 % β/β

Μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών

Το Mancozeb δρα εμποδίζοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό των μυκήτων σε πολλαπλά σημεία. Διαθέτει ευρύ φάσμα δράσης

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

A.A.Δ.A.: 60.584/14-12-2016

092017



Κάτοχος της άδειας: INDOFIL INDUSTRIES (NETHERLANDS) B.V. Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam, Ολλανδία
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
Κέντρικά: Θέση Ντράσσεζα (Βι.ΠΑ), Τ.Κ. 190 11 Αιτωλίας Αττικής, Τηλ.: 22950 29350-4, Φάξ: 22950 29305
Υποκατάστημα Βορείου Ελλάδος: Βι.ΠΕ.Θ. Ο.Τ. 42, Δ.Α. 11, Τ.Θ. 174, Τ.Κ. 570 22 Σίνδος Θεσσαλονίκης,
Τηλ.: 2310 788002-3, Φαξ: 2310 799840

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΑΡΙΘ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 2,5 ΚΙΛΑ

Καλλιεργείες - Ασθένειες - Δόσεις (ανά 100 λίτρα ψεκ. υγρού) - Χρόνος εφαρμογής: Εσπεριδοειδή (Νεραντζιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέϊπ-φρουτ): Δόση 200-300 γρ. Όγκος ψεκ. υγρού 100-150 λίτρα/στρ. Για Φυτόφθορα εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Μήλιά: Δόση 200 γρ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Φουζικλάδιο, Φαιά σήψη (Monilia) εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Αχλαδιά: Δόση 200 γρ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Φουζικλάδιο, Σεπτορίωση, Φαιά σήψη (Monilia) εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Ροδάκινα, Νεκταρινιά, Βερκοκιά, Δαμασκηλιά: Δόση 200 γρ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Σκωρίαση, Φαιά σήψη (Monilia) εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών, ειδικά σε βροχερή και υγρή άνοιξη. Κερασιά: Δόση 200 γρ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Σκωρίαση, Φαιά σήψη (Monilia), Προσβολή φύλλων, Κορύνιο εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών, ειδικά σε βροχερή και υγρή άνοιξη. Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): Δόση 200 γρ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Περονόσπορο, Μαύρη σήψη εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Ελιά (εκτός ποικιλιών Καλαμών και Κορωνέϊκη): Δόση 200 - 300 γρ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 - 150 λίτρα/στρ. Για Κυκλοκόνιο εφαρμογή εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Σκόρδο, Κρεμμυδιά, Ασκαλώνια: Δόση 200-250 γρ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 - 125 λίτρα/στρ. Για Περονόσπορο εφαρμόζεται από το στάδιο του φυτάρου εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Καρότο, Λαγόχορτα - Λαχανίδες: Δόση 200 γρ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Αλτερναρίαση, Περονόσπορο εφαρμόζεται από το στάδιο του φυτάρου εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Τομάτα (Υ), Μελιτζάνα (Υ): Δόση 200 γρ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Περονόσπορο, Αλτερναρίαση, Ανθράκωση προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από το στάδιο του 3^{ου} πραγματικού φύλλου. Πιπεριά (Υ): Δόση 200 γρ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Περονόσπορο, Αλτερναρίαση, Ανθράκωση προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από το στάδιο του 3^{ου} πραγματικού φύλλου. Κολοκυθάκι (Υ), Αγγουράκι (Υ), Αγγούρι (Υ), Πεπόνι (Υ), Κολοκύθα (Υ): Δόση 200 γρ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Περονόσπορο, Ανθράκωση προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από το στάδιο του 5^{ου} φύλλου. Μπρόκολο: Δόση 200 γρ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Περονόσπορο, Αλτερναρίαση προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από το στάδιο των φυτάρων. Μαρρούλι (Υ): Δόση 200 γρ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Περονόσπορο προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, μετά την μεταφύτευση. Πράσο: Δόση 200 - 250 γρ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 - 125 λίτρα/στρ. Για Περονόσπορο προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας από το στάδιο των φυτάρων. Σπαράγγι: Δόση 200 γρ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Σκωρίαση ψεκασμοί μετά τη συγκομιδή. Μπιζέλια (αρακάς, όσπρια): Δόση 200 γρ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Ανθράκωση, Περονόσπορο εφαρμογή εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από το στάδιο του 3^{ου} φύλλου έως το 50% του τελικού μεγέθους των καρπών. Φασόλια (όσπρια): Δόση 200 γρ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Αλτερναρίαση, Ανθράκωση, Σκωρίαση εφαρμογή εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Πατάτα: Δόση 200 γρ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Περονόσπορο, Αλτερναρίαση προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από το φυτόμα της καλλιέργειας. Σπύρι: Δόση 200 γρ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Σεπτορίωση, Σκωρίαση προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών έως την πλήρη άνθηση. Καλλωπιστικά φυτά και θάμνοι Υπαίθρου: Δόση 200 γρ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Αλτερναρίαση, Περονόσπορο, Σκωρίαση προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών: Εσπεριδοειδή (Νεραντζιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέϊπ-φρουτ), Ελιά (εκτός ποικιλιών Καλαμών και Κορωνέϊκη), Μπιζέλια (αρακάς, όσπρια), Φασόλια (όσπρια): 1. Μήλιά, Αχλαδιά, Ροδάκινα, Νεκταρινιά, Βερκοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Σκόρδο, Κρεμμυδιά, Ασκαλώνια, Πιπεριά (Υ), Κολοκυθάκι (Υ), Αγγουράκι (Υ), Αγγούρι (Υ), Πεπόνι (Υ), Κολοκύθα (Υ), Μαρρούλι (Υ): Μέχρι 4 εφαρμογές ανά 10 ημέρες, εφόσον απαιτείται. Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): Μέχρι 3 εφαρμογές ανά 16 ημέρες, εφόσον απαιτείται. Καρότο, Λαγόχορτα - Λαχανίδες, Μπρόκολο, Σπαράγγι: Μέχρι 4 εφαρμογές ανά 14 ημέρες, εφόσον απαιτείται. Τομάτα (Υ), Μελιτζάνα (Υ): Μέχρι 5 εφαρμογές ανά 10 ημέρες, εφόσον απαιτείται. Πράσο: Μέχρι 3 εφαρμογές ανά 10 ημέρες, εφόσον απαιτείται. Πατάτα: Μέχρι 6 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες, εφόσον απαιτείται. Σπύρι: Μέχρι 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες, εφόσον απαιτείται. Καλλωπιστικά φυτά και θάμνοι Υπαίθρου: Μέχρι 4 εφαρμογές ανά 7 (φύτα)- 10 (θάμνοι) ημέρες εφόσον απαιτείται.

Προληπτικές: Το INDOFIL PLUS 80 WP είναι ένα προστατευτικό μυκητοκτόνο. Η πρώτη εφαρμογή είναι καλά να γίνεται πριν την προβλεπόμενη εμφάνιση της ασθένειας. Οι εφαρμογές επαναλαμβάνονται ανάλογα με την πίεση της προσβολής και σύμφωνα με τα συνιστώμενα μεσοδιαστήματα ψεκασμών για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απαιτείται προστασία. 2. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής. 3. Η δόση 100 λίτρα νερό να συνδυαστεί καταλλήλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπερβληθεί η μέγιστη δόση λίτρο. 4. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος το φύλλωμα πρέπει να είναι στεγνό μετά από άρδευση ή βροχή. 5. Μην εφαρμόζετε το σκευάσμα εάν αναμένεται βροχή εντός 4 ωρών. 6. Να μην χρησιμοποιούνται ως τροφή τα αμπελόφυλλα σε περίπτωση χρήσης του INDOFIL PLUS 80 WP. 7. Να ακολουθούνται οι ενστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί με καλό λούσιμο του φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Εσπεριδοειδή (Νεραντζιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέϊπ-φρουτ): 14 ημέρες, Μήλιά, Αχλαδιά, Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες), Σκόρδο, Κρεμμυδιά, Ασκαλώνια, Μπρόκολο, Μαρρούλι (Υ), Πράσο, Μπιζέλια (αρακάς, όσπρια), Φασόλια

(όσπρια): 28 ημέρες, Ροδάκινα, Νεκταρινιά, Βερκοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Καρότο, Λαγόχορτα - Λαχανίδες: 30. Ελιά: 21 ημέρες, Τομάτα (Υ), Μελιτζάνα (Υ), Πιπεριά (Υ), Αγγούρι (Υ), Αγγουράκι (Υ), Κολοκυθάκι (Υ), Κολοκύθα (Υ), Πεπόνι (Υ): 3 ημέρες, Σπαράγγι: 180 ημέρες, Πατάτα: 7 ημέρες, Σπύρι: Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής (εφαρμόζεται έως την πλήρη άνθηση).

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού. Ξεπλύνετε τα μηχανήματα εξωτερικά με νερό. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του δοχείου του ψεκαστικού με καθαρό νερό συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό το ένα τρίτο του όγκου του ψεκαστικού δοχείου. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με καθαρό νερό κατά το ήμισυ, αναδέψτε και αδειάστε τελείως. Επαναλάβετε τη διαδικασία. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού κατά το ήμισυ με νερό, προσθέστε καθαριστικό με βάση την αμμωνία (συγκέντρωση 0,03 %) αναδέψτε για 2 λεπτά και γεμίστε το ψεκαστικό με καθαρό νερό. Αφήστε το για 15 λεπτά χωρίς ανάδευση και κατόπιν αδειάστε το δοχείο με πίεση μέσα από σωληνώσεις και βροχιόνες. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Φίλτρα και μετεκκία αφαιρούνται και καθαρίζονται ξεχωριστά με καθαρό νερό.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιεργείες και δόσεις εφαρμογής. Να μη χρησιμοποιείται στις ποικιλίες της αχλαδιάς Κρυστάλλι, Κόσια και Βουτυράτα. Μπορεί να προκαλέσει σκωρίωση σε μηλιές ποικιλίας "Golden Delicious".

Συνδυαστικότητα: Στα Μηλοειδή το INDOFIL PLUS 80 WP μπορεί να συνδυαστεί με σκευάσματα με δ.ο. myclobutanil ή fenbuconazole.

Διευχέρηση ανθεκτικότητας: Το INDOFIL PLUS 80 WP μπορεί να χρησιμοποιείται προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης.

Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα: Η χρήση του είναι συμβατή σε προγράμματα Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης για τις καλλιεργείες των μηλοειδών και του αμπελιού.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκευάσμα: Η επανείσοδος στον ψεκασμένο χώρο να γίνεται αφού έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκόμιο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκευάσμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευόμενο από υγρασία, ακραίες θερμοκρασίες και ηλιακό φως.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει Hexamethylene tetramine. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Υποπνο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Προφυλάξεις: Φυλάσσετε κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Εφοδιάστε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης. Αποφύγετε να αναπνεύσετε σταγονίδια/ εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα. «Φοράτε προστατευτικά γάντια και κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή». Φοράτε κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή με τρακέτ χωρίς κλειστή καμπίνα. Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψεκαστήρι ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: 40 μέτρων σε δένδρα, 12 μέτρων σε Αμπέλι, 5 μέτρων στις υπόλοιπες καλλιεργείες.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντιδοτό: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφρονο σαπούνι και νερό. Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το διάλυμα ρούχα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη χορηγήσετε τίποτε από το στόμα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Συμβουλευθείτε γιατρό. Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.