

260 x 150 mm

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώετε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα απομήκη προστασίας για τα μάτια. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Φοράτε ολόσωμη φόρμα και κατάλληλα γάντια κατά την ανάμηξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη φόρμα και κατάλληλα γάντια. Μη ρυπάνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Για να προστέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από την επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες της τομάτας και των κολοκυνθοειδών υπό κάλυψη (μη μόνιμη).

Πράττες Βούθειες – Αντίδοτο: Σε περίπτωση κατάποσης: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Να μην χορηγηθεί τίποτα από το σόδα σε άτομα που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το παθόντα στον καθαρό αέρα. Καλέστε γιατρό εάν χρειάστε. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαίρεστε αμέσως όλα τα ρούχα στα οποία έπεσε το σκεύασμα. Πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπαραστική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρο Δλητηριάσεων: 210-7793777.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μπχανίματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε καλά την φάλη και προσθέστε τη συνιστώμενη δόση με ψεκαστικό υγρό αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μπχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι κενές συσκευασίες ξέπλενονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προπογυμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποθεύονται όλα σε σημεία σύλλογης για ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκεύασματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό (σε θερμοκρασίες μεταξύ 5 °C και 30°C) και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 Λίτρο



SIVAR 25 SC

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (ΕΣΔ)

Azoxystrobin (Αζοξιστρομίν) Εγγυημένη σύνθεση: Azoxystrobin 25% Β/ο
Βοηθητικές ουσίες 76,6% Β/Β

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

ΠΡΟΣΟΧΗ



Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Ημ. Παραγωγής (Manuf. Date):

Αρ. Παρτίδας (Lot. No):

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60.650/13.12.2017

Κάτοχος της άδειας: LAINCO S.A., Pol. Ind. Can. Jardi,
Avda. Bizet, 8-12, 08191 Rubí, Barcelona, Ισπανία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Διανομή:



ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100
www.ellagret.gr

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση. Έχει και διελασματική κίνηση. Τρόπος δράσης: αναστολή της μιτοχονδριακής αναπονής, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της βλάστησης και παραγωγής σπορίων και την αναστολή ανάπτυξης μυκητίου του μύκητα.

Πεδίο εφαρμογής – Στόχος – Δόσεις σκευάσματος – Χρόνος εφαρμογής – Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: TOMATA (Θ): για Ήλιος με δύση 80 κ.εκ./στρ. (όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρ.), προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από την έναρξη της άνθησης. Μέγιστο 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημερών. ΑΓΓΟΥΡΙ (Θ) - ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ (Θ) - ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ (Θ) - ΠΕΠΩΝΙ (Θ) - ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Θ) - ΚΟΛΟΚΥΘΑ (Θ): για Ήλιος με δύση 80 κ.εκ./στρ. (όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρ.), προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από την έναρξη της άνθησης. Μέγιστο 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημερών. PYZI: για Πυρικουλάρια, Ελινιθοσπορίωση με δύση 100 κ.εκ./στρ. (όγκος ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρ.). Μία (1) εφαρμογή από το στάδιο φουσκώματος του κολεού – μέχρι το τέλος του ξεσταχύσματος.

Παρατήρηση: στο ρύζι, ο εφαρμογή για πραγματοποιείται σε χωράφια που δεν είναι πλημμυρισμένα.
[Θ]: Θερμοκρούποι]

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Τομάτα (Θ), Αγγούρι (Θ), Αγγούρακι (Θ), Κολοκύθα (Θ), Κολοκυθάκι (Θ), Καρπούζι (Θ), Πεπόνι (Θ): 3 ημέρες. Ρύζι: 28 ημέρες.

Συνδυαστικότητα: --

Φυτοτοξικότητα: 1. Να μην εφαρμόζεται σε νεαρά φυτά τομάτας πριν περάσουν 3 εβδομάδες από τη μεταφύτευση ή 5 εβδομάδες από τη σπορά. 2. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργεια τομάτας υπό κάλυψη, όταν επικρατούν συνθήκες υπερβολικά υψηλής σχετικής υγρασίας (>90%) ή/και υψηλών θερμοκρασιών (>30°C). 3. Το σκεύασμα είναι φυτοτοξικό στις μηλιές. Μην το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχει πιθανότητα το ψεκαστικό νέρο να φθάσει σε γειτονικές καλλιέργεια μηλιάς. 4. Να ζεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή τα ψεκαστικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή του σκεύασματος πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαλλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Τηρείτε το μέγιστο αριθμό εφαρμογών (1-3 ανάλογα την καλλιέργεια) ανά καλλιεργητική περίοδο. Αποφεύγετε τις συνεχόμενες εφαρμογές του σκεύασματος στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. Να γίνεται εναλλαγή ψεκασμών, με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης. Οι εναλλαγές να συνεχίζονται και στις καλλιέργειες που ακολουθούν.

Χρονικό διάστημα σαφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -της πρόσθασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεσθε στην περιοχή που έγινε εφαρμογή του σκεύασματος πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει στα φύλλα (24 ώρες).