

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Διάθεση περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τα έντομα επικονίασης μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων.

Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.

Πρώτες βοήθειες Αντίδοτο: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκάστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται σε χώρο ξηρό, δροσερό και χωρίς να εκτίθεται απ' ευθείας στο φως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

Αριθμός Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας
Ημερ. Παρασκευής: Βλέπε επί της συσκευασίας



SHARIMIDA

20 SL

Imidacloprid (Ιμιντακλοπρίντ) Υγρό διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση: Imidacloprid 20% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 82,25% β/β

ENTOMOKTONO

Διασυστηματικό εντομοκτόνο
επαφής και στομάχου

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 Λίτρο

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14.312/04.11.2008

Κάτοχος της άδειας: Sharda Cropchem Espana S.L.,
Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina no 3, 12th Floor,
30006 Murcia - Ισπανία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
SHARDA BALKAN Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
Λεωφόρος Πεντέλης 8, Τ.Κ. 152 34, Χαλάνδρι Τηλ. :210 6815766, 2310 521045



Εργοστάσιο συσκευασίας - Διανομή:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπήναδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100
www.ellagret.gr

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΤΟΜΑΤΑ (Θ): Για Αλευρώδη με δόση 75-125 κ.εκ./στρέμμα (Παρατήρηση 1). Ριζοπότισμα με το νερό της άρδευσης. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών:** Δυο εφαρμογές ανά 14 ημέρες.

ΑΓΓΟΥΡΙ (Θ): Για Αλευρώδη με δόση 75-125 κ.εκ./στρέμμα (Παρατήρηση 1). Ριζοπότισμα - προληπτική εφαρμογή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών:** Δυο εφαρμογές ανά 14 ημέρες.

Παρατηρήσεις:

1. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την πυκνότητα των φυτών.
2. Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα κατά την περίοδο της άνθησης.
3. Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περίπτωση που εμφανίζεται μελίτωμα (π.χ. περισσότερο από 4 αφίδες ανά φύλλο).

Τρόπος εφαρμογής: Ριζοπότισμα (εντός θερμοκηπίου).

Τρόπος παρασκευής ψεκάστικού υγρού: -

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες, δόσεις και για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Τομάτα (Θ), Αγγούρι (Θ): 7 ημέρες.