

Fosetyl-Al (Φοσετύλ-αλ) 80% Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

PIRGUS WG

PIRGUS WG

Fosetyl-Al (Φοσετύλ-αλ) 80%

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη Σύνθεση:

Fosetyl-Al : 80% B/B,

Βοηθητικές ουσίες: 17,53% B/B

Διασυστηματικό ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

με προστατευτική και θεραπευτική δράση

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (YAAT): 60949/07.04.2020

Κάτοχος της άδειας - Παρασκευαστής σκευάσματος: Industrial Química Key S.A.,
Avda. Cervera, s/n, 25300 Tárrega, Lleida, SPAIN (Ισπανία).



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά -
Αποκλειστικός Διανομέας:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Επικοινωνίας, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431, email: ellagret@ellagret.gr
www.ellagret.gr

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ
(Net Weight):
100gr

PIRGUS WG

Διασυστηματικό ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

με προστατευτική και
θεραπευτική δράση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος. Τρόπος παρασκευής **ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας. Πριν την ανόδευση, **καθαρίστε ψεκαστήρα.** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο μετά τον ψεκασμό. Ξεπλύνετε τη δεξαμενή και τα εξαρτήματά της τρεις φορές με καθαρό νερό μέχρι ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος να έχουν απομακρυνθεί. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, κουτιά) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίασμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Συνδυαστικότητα:** Δε συνιστάται η ανάμειξη του σκευάσματος με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμοστεί αφού περάσει διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας από εφαρμογή με παραφινικό λάδι. Το προϊόν δε συνδυάζεται με διαφυλλικά λιπάσματα αζώτου.

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ
(Net Weight):
100gr

PIRGUS WG

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Παρουσιάζει συμπλαστική και αποπλαστική κίνηση, δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων του μύκητα και ταυτόχρονα ενισχύει τους μηχανισμούς άμυνας των φυτών.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (Καλλιέργειες – Στόχος – Δόσεις - Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής):

ΕΞΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Γκρέιπ-φρουτ, Φράπα, Κίτρο, Περγαμόντο, Νεραντζιά): Για Φυτόφθορα: Δόση 330-600 γρ./σπρέιμα (300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού 110-200 λίτρα/σπρέιμα. Τρεις (3) ψεκασμοί: 1ος ψεκασμός την άνοιξη, στην αρχή της άνθησης (Απρίλιο-Μάιο), 2ος ψεκασμός τον Ιούλιο-Αύγουστο και 3ος ψεκασμός τον Οκτώβριο-Δεκέμβριο (BBCH 37-81). **ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυdonία, Μουσμουλιά, Αχλαδόμυλα):** Δόση 300 γρ./σπρέιμα (300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού 80-100 λίτρα/σπρέιμα. Για Φυτόφθορα **λαϊμού** και **ριζών:** Τρεις (3) ψεκασμοί: 1ος ψεκασμός την άνοιξη (Απρίλιο-Μάιο), 2ος ψεκασμός τον Ιούνιο-Ιούλιο και 3ος τον Οκτώβριο κατά το λήθαργο (BBCH 91-77). Για Βακτηρίωση: Ψεκασμοί από την πτώση των πετάλων έως το στάδιο καρπών διαμέτρου 10 mm (στάδιο καρπιδίου) (BBCH 69-71). **ΑΜΠΕΛΙ (Ιονοποίηση και επιτραπέζια σταφύλια):** Για Περονόσπορο: Δόση 250 γρ./σπρέιμα (250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα/σπρέιμα. Ψεκασμοί που ξεκινούν από την αρχή της βλάστησης (BBCH 12-13). **ΦΡΑΓΟΥΛΑ (Υ+Θ):** Για Φυτόφθορα **λαϊμού** και **ριζών:** Δόση 250 γρ./σπρέιμα (250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/σπρέιμα. Προληπτικοί ψεκασμοί έως την άνθηση (BBCH 12-59). **Εμβάπτιση ριζώματος πριν τη φύτευση:** Δόση 250 γρ./σπρέιμα. Όγκος ψεκ. υγρού 10 λίτρα/σπρέιμα. **ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ):** Για Περονόσπορο: Δόση 250 γρ./σπρέιμα. Όγκος ψεκ. υγρού 30-100 λίτρα/σπρέιμα. Ψεκασμοί που ξεκινούν από το στάδιο των σποροφύτων (BBCH 10). **ΚΟΛΟΚΥΘΙ/ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ (Υ+Θ):** Για Περονόσπορο: Δόση 160-300 γρ./σπρέιμα (200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού 80-100 λίτρα/σπρέιμα. Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-89). **ΠΕΠΟΝΙ/ΚΑΡΠΟΥΖΙ/ΚΟΛΟΚΥΘΑ (Υ+Θ):** Για Περονόσπορο: Δόση 160-300 γρ./σπρέιμα (200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού 80-100 λίτρα/σπρέιμα. Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-89). **ΜΑΡΟΥΛΙ (Υ+Θ):** Για Περονόσπορο: Δόση 250 γρ./σπρέιμα. Όγκος ψεκ. υγρού 30-100 λίτρα/σπρέιμα. Ψεκασμοί που ξεκινούν από το στάδιο των σποροφύτων (BBCH 10). **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ* (Υ+Θ):** Για Φυτόφθορα: Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος: Δόση 100-120 γρ./σπρέιμα (250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού 250-300 λίτρα/σπρέιμα. Ριζοπάσημα: Δόση 100 γρ./σπρέιμα (5-10 γρ./τετρ. μέτρο). **Υ. Υπαίθρου. Θ. Θερμοκηπίου.**

Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο | Μεσοδιάστημα Εφαρμογών:

ΕΞΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: 3/30 ημέρες, **ΜΗΛΟΕΙΔΗ:** 3/30 ημέρες (για Φυτόφθορα), 2/30 ημέρες (για Βακτηρίωση), **ΑΜΠΕΛΙ:** 3/10 ημέρες, **ΦΡΑΓΟΥΛΑ:** 1-3 | 8-10 ημέρες (προληπτικοί ψεκασμοί), 1 εφαρμογή για εμβάπτιση ριζώματος πριν τη φύτευση, **ΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΜΑΡΟΥΛΙ:** 4/10 ημέρες, **ΚΟΛΟΚΥΘΙ / ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ:** 1-3 | 8-10 ημέρες, **ΠΕΠΟΝΙ / ΚΑΡΠΟΥΖΙ / ΚΟΛΟΚΥΘΑ:** 1-2 | 8-10 ημέρες, **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ:** 1-3 | 30 ημέρες (προληπτικοί ψεκασμοί), 1-2 | 30 ημέρες (ριζοπάσημα). **Παρατηρήσεις:** Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Εταιρικών Προειδοποιήσεων.

*Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος να προηγήσει δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Τομάτα, Αγγούρι, Κολοκύθι/Κολοκυθάκι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα: **3 ημέρες** | Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Γκρέιπ-φρουτ, Φράπα, Κίτρο, Περγαμόντο, Νεραντζιά), Φράουλα (ψεκασμός φυλλώματος): **14 ημέρες** | Μηλοειδή, Μαρούλι: **15 ημέρες** | Αμπέλι: **28 ημέρες** | Φράουλα (εμβάπτιση ριζώματος), Καλλιωπιστικά: -

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: 30 ημέρες.

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στο φυλλώμα των καλλιεργειών.

Φυτοτοξικότητα: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Prod. Date) } ΒΛΕΠΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ (Batch No)

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ
(Net Weight):
100gr

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Περιέχει

2,4,7,9-tetramethyl-5-decyne-4,7-diol.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: • Φυλάσσεται

κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε,

μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε

αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά

γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα

ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

• Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με

την εθνική νομοθεσία. • Φοράτε μακριμάνικο

πουκάμιο και μακρύ παντελόνι και γάντια κατά

την ανάμιξη/φόρτωση και μακριμάνικο

πουκάμιο και μακρύ παντελόνι κατά την

εφαρμογή. • Σε περίπτωση επανεισόδου στην

καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε

μακριμάνικο πουκάμιο και μακρύ παντελόνι

και γάντια. • Μην ρυπαίνετε το νερό με το

προϊόν ή τη συσκευασία του. • Για να

προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να

αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων

από τα επιφανειακά ύδατα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε

προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν

υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους,

εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

• Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

• Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως

ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή

την ετικέτα. Μην χορηγείται τίποτα από το

στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις

τους. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε

το σκεύασμα.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό.

Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:

210-7793777