

Cabrio® Duo 4/7.2 EC

Pyraclostrobin/Dimethomorph
(πυρακλόστρομπιν/ντιμεθομόρφ)

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

121907α

Περιεχόμενο: **2,5** λίτρα

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς
Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι,
τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

 **BASF**
We create chemistry

ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ



Cabrio® Duo 4/7.2 EC

Pyraclostrobin/Dimethomorph (πυρακλόστρομπιν/ντιμεθομόρφ)

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: Pyraclostrobin 4% β/ο (ομάδα μεθόξυκαρβαμικά),
Dimethomorph 7.2% β/ο (ομάδα μορφολινικά),
Βοηθητικές ουσίες 89% β/β.

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση ασθενειών που οφείλονται σε παθογόνα της ομάδας Ωομυκήτων (περονόσποροι) και Ασκομυκήτων (ωΐδια).

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. • Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. • Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και ενδύματα. • Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. • Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. • Μην προκαλέσετε εμετό. • Ξεπλύνετε το στόμα. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. • Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 60305 / 19-1-2011

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσιος 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr.

Περιεχόμενο: **2,5** λίτρα

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερομηνία παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερομηνία λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Η ανάμιξη/φόρτωση του προϊόντος να γίνεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μην εισέλθετε στην περιοχή εφαρμογής πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία για τη διάρκεια εφαρμογής στο θερμικό κλίμα. **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Γενικές πληροφορίες:** Να αποφευχθεί η επαφή με το δέρμα, τα μάτια και το ρουχισμό. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα: Ζητήστε ιατρική βοήθεια. Ειδικείστε τον περικό, την ετικέτα και/ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στον γιατρό. Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρήσετε ερεθισμούς του δέρματος: Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΤΗΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε το στόμα. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. **Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία (απολαμπή, ζυμικές λειτουργίες). **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου III της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει αποπλαστική και διακυταστική κίνηση, ενώ το dimethomorph δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος και εμφανίζει επίσης διακυταστική κίνηση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (οι δόσεις αναφέρονται σε κ.ε.κ. σκευάσματα)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλλιέργειας της φυλλικής επιφάνειας.

ΤΟΜΑΤΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (*Phytophthora infestans*) με δόση 250-400 κ.ε./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Η δόση του σκευάσματος ανά στρέμμα είναι 200-250 κ.ε. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών ψεκασμών πριν αρχή της άνθησης. Η μέγιστη δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται με το μικρότερο όγκο ψεκαστικού υγρού, ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-8 ημέρες, εφόσον απαιτείται. **ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ (ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ):** Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (*Pseudoperonospora cubensis*) και του υιδίου (*Erysiphe cichoracearum*) με δόση 250 κ.ε./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (250 κ.ε./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται προληπτική ψεκασμοί με την έναρξη του σχηματισμού των καρπών. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-8 ημέρες, εφόσον απαιτείται. **ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ):** Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (*Pseudoperonospora cubensis*) με δόση 250 κ.ε./στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 80 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 5^{ου} πραγματικού φύλλου. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-8 ημέρες, εφόσον απαιτείται. **ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΛΑΧΑΝΟ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ):** Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (*Peronospora parasitica*) και της αλτερναρίας (*Alternaria brassicae*) με δόση 150-250 κ.ε./στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-100 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών ψεκασμών από την εμφάνιση του 1^{ου} πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ανάπτυξη του καρπού. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-12 ημέρες, εφόσον απαιτείται. **ΜΑΡΟΥΛΙ, ΑΥΚΟΤΡΙΒΟΛΟ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ):** Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (*Bremia lactucae*) με δόση 200-250 κ.ε./ στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40-80 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 5^{ου} πραγματικού φύλλου. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-8 ημέρες, εφόσον απαιτείται. **ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΣΚΟΡΔΟ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ):** Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (*Peronospora destructor*) με δόση 500 κ.ε. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (200-250 κ.ε./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40-50 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 3^{ου} φυλλοεργητικού. Συστήνεται η προώθηση επιφανειοδραστικής ουσίας. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-8 ημέρες, εφόσον απαιτείται. **ΣΚΟΡΔΟ**

(ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΥΓΡΟΪΚΗ ΜΙΚΡΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ): Για την καταπολέμηση της αλτερναρίας (*Alternaria porri*) με δόση 500 κ.ε./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (200-250 κ.ε./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40-50 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 3^{ου} φύλλου. Συστήνεται η προώθηση επιφανειοδραστικής ουσίας. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-8 ημέρες, εφόσον απαιτείται. **ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Βασιλικός, Μαιντανός, Θυμαρί, Δεντρολίβανο):** Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (*Peronospora spp., farinosa* etc.) με δόση 200-250 κ.ε./ στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 20-100 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών ψεκασμών από την εμφάνιση του 1^{ου} πραγματικού φύλλου. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες, εφόσον απαιτείται. **ΠΑΤΑΤΑ:** Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (*Phytophthora infestans*) με δόση 200-250 κ.ε./ στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 80-100 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών ψεκασμών πριν να κλείσουν οι γραμμές της καλλιέργειας. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημέρες, εφόσον απαιτείται. **ΑΓΚΙΝΑΡΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ, χρήση μικρής σημασίας):** Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (*Bremia lactucae*) με δόση 200-250 κ.ε./ στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 20-100 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών ψεκασμών από την πλήρη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος μέχρι το 50% της ανάπτυξης των καρπών. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες, εφόσον απαιτείται.

* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες σκόρδου (για την αντιμετώπιση της αλτερναρίας) και ακνιάρων υπαιθρου από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη μικρή σημασία χρήσης, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα κατά τη χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η δόση είναι ανάλογη της πίεσης προσβολής. Τα μικρότερα μεσοδιάσματα να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου εμφάνισης της προσβολής.

2. Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. 3. Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προεδροποιήσεων.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναθεωρημένη την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναθεωρημένα συνεχώς και σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

* Εφαρμόστε το Cabrio® Duo 4/7 2 EC προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και αποφυγείτε τις θεραπευτικές εφαρμογές. * Εφαρμόστε το Cabrio® Duo 4/7 2 EC σε εναλλαγή με μικροκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης (Μέγιστος αριθμός συνεχόμενων εφαρμογών: 2). * Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Τομάτα (Υπαίθρου, Θερμοκηπίου), Πεπόνι (Υπαίθρου), Καρπούζι (Υπαίθρου), Λάχανο (Υπαίθρου), Πατάτα (Υπαίθρου), Αγκινάρα (Υπαίθρου): 3 ημέρες. Αγγούρι (Θερμοκηπίου), Κολοκύθα (Θερμοκηπίου): 1 ημέρα.

Κουνουπίδι (Υπαίθρου), Μπρόκολο (Υπαίθρου), Μαρούλι (Υπαίθρου), Αυκοτριβόλο (Υπαίθρου), Κρεμμύδι (Υπαίθρου), Σκόρδο (Υπαίθρου), Αρωματικά φυτά (Υπαίθρου): 7 ημέρες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλύνονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύνμα (τα νερά του ξεπλύνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστρέφονται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.