

METMAN

25 WP

Εγγυημένη σύνθεση:
metalaxyl 25 % β/β
Βοηθητικές ουσίες:
73.7 % β/β

Metalaxyl (Μεταλαξίλ)
Βρέξιμη σκόνη WP

**Διασυστηματικό μυκητοκτόνο
με προστατευτική και θεραπευτική δράση**

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: **61039 / 25.05.2021**



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

UFI: 9XG6-6APH-QA01-UTMW




Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431, email: ellagret@ellagret.gr
www.ellagret.gr

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 500gr

Παρασκευαστής σκευάσματος, κάτοχος της άδειας:
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. (IQV)
Av. Rafael Casanova 81, 08100 Mollet del Vallès (Barcelona),
Ισπανία



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να φοράτε προστατευτική γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και μπότες κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και μπότες. Διάθεση περιεχομένου/περίεκτου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για πορτοκαλιά, γκρέιφρουτ, αμύγδα, πατάτα, τομάτα (Υ), μελιτζάνα (Υ), μαρούλι (Υ), σκαρόλες (πικρίδα)/ πλατύφυλλα αντίδια (Υ).

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ: ΓΕΝΙΚΑ: Σε περίπτωση αδιαθεσίας ζητείστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΔΙΑΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΙΣΠΝΟΗ: Μεταφέρετε τον παθόντα στο καθαρό αέρα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση δυσφορίας. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα σε αναισθητό άτομο. Διατηρείστε τη θερμοκρασία του σώματος. Ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε τον περιέκτη ή την ετικέτα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Τρόπος εφαρμογής: α) Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. β) Στάγδην άρδευση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά το ήμισυ με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος υπό ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Το ψεκαστικό υγρό να χρησιμοποιείται εντός της ημέρας παρασκευής του.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: Να μη συνδυάζεται με άλλα προϊόντα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με σχίσμα , για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Το μεταλαχλύ είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο που αναστέλλει την ανάπτυξη του παθογόνου και το σχηματισμό спорίων παρεμποδίζοντας την πρωτεϊνική σύνθεση των μυκήτων. Η πρόσληψη της δραστικής είναι ταχεία μετά την εφαρμογή και η ακροπεταλική κυρίως κίνηση επιτρέπει την προστασία της νεαρής βλάστησης.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ / ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ημέρες): ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ - ΓΚΡΕΪΦΡΟΥΤ. Φυτοφθορα: α) Ψεκασμός με 40-80 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (80 γρ./στρ.) από την πλήρη έκπτυξη των πρώτων φύλλων μέχρι οι καρποί να πάρουν το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας [BBCH 19-85]. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-200 λίτρα/στρ. 3 εφαρμογές / 14 ημέρες. β) Στάγδην άρδευση με 150 γρ./στρ. από την πλήρη έκπτυξη των πρώτων φύλλων μέχρι οι καρποί να πάρουν το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας [BBCH 19-85]. 1 εφαρμογή. **ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζιες και οινολογικές ποικιλίες σταφυλιών)*.** Περονόσπορος: Ψεκασμός με 80-200 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (80 γρ./στρ.) από την έκπτυξη του 4ου φύλλου μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης [BBCH 14-81]. Όγκος ψεκ. υγρού: 40-100 λίτρα/στρ. 2 εφαρμογές / 21 ημέρες. **ΦΡΑΟΥΛΑ (θερμοκηπίου).** Φυτοφθορα: Στάγδην άρδευση με 150 γρ./στρ. από την έκπτυξη του 3ου φύλλου μέχρι την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού (μετά την πτώση των πετάλων) [BBCH 13-71]. 1 εφαρμογή. **ΠΑΤΑΤΑ.** Περονόσπορος: Ψεκασμός με 80-200 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (80 γρ./στρ.) από την έκπτυξη του 4ου φύλλου μέχρι το τέλος της άνθησης της 1ης ταξιανθίας [BBCH 14-69]. Όγκος ψεκ. υγρού: 40-100 λίτρα/στρ. 3 εφαρμογές / 10 ημέρες. **ΤΟΜΑΤΑ - ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υπαίθρου και θερμοκηπίου).** Περονόσπορος: Ψεκασμός με 80-200 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (80 γρ./στρ.) από την έκπτυξη του 4ου φύλλου μέχρι την ωρίμανση του 70% των καρπών [BBCH 14-87]. Όγκος ψεκ. υγρού: 40-100 λίτρα/στρ. 3 εφαρμογές / 10 ημέρες. **ΠΙΠΕΡΙΑ (θερμοκηπίου).** Περονόσπορος: Στάγδην άρδευση με 150 γρ./στρ. από την έκπτυξη του 4ου φύλλου μέχρι το άνοιγμα των ανθέων σε 9 ή περισσότερες ταξιανθίες [BBCH 14-69]. 2 εφαρμογές / 14 ημέρες.

ΜΑΡΟΥΛΙ - ΣΚΑΡΟΛΕΣ (ΠΙΚΡΙΔΑ) / ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ ΑΝΤΙΔΙΑ (Υπαίθρου). Περονόσπορος: Ψεκασμός με 80-200 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (80 γρ./στρ.) από την έκπτυξη του 4ου φύλλου μέχρι το τέλος της ανθοφορίας [BBCH 14-69]. Όγκος ψεκ. υγρού: 40-100 λίτρα/στρ. 3 εφαρμογές / 10 ημέρες. ***Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεξιμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.**

Παρατηρήσεις:

1. Να ρυθμίζετε τη δόση ανά εκατόλιτρο ώστε να μην υπερβαίνει τη μέγιστη δόση ανά στρέμμα.

2. Οι εφαρμογές πρέπει να αρχίζουν προληπτικά όταν το επίπεδο της προσβολής είναι χαμηλό.

3. Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής μπορεί να μειωθεί εάν βρέξει μέσα σε 2 ώρες μετά τον ψεκασμό.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντολογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί. Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία μεταλαχλύ, η οποία ανήκει στην ομάδα 4 κατά FRAC.

Να γίνεται εναλλαγή μυκητοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των μυκήτων. * Εμφανιστάται η εφαρμογή του στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των καλλιέργειών για καλύτερα αποτελέσματα της διασυστηματικής δράσης του σκευάσματος.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης προστατευόμενης καλλιέργειας/ καλλιέργειών που ακολουθούν: ---

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 14 ημέρες στο αμπέλι. Να μην εισέρχεται στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Πορτοκαλιά, Γκρέιφρουτ, Αμύγδα, Φράουλα (Θ), Πατάτα, Τομάτα (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ), Πιπεριά (Θ), Μαρούλι (Υ), Σκαρόλες (πικρίδα)/ πλατύφυλλα αντίδια (Υ): 14 ημέρες.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Prod. Date)
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ (Batch No)

ΒΛΕΠΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

