

ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ(ΒΙΟΚΤΟΝΟ)

BONIRAT PASTA BAIT

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας (RB) Difenacoum (Ντιφενάκουμ) 0,005%

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Difenacoum: 0,005% β/β,

Βοηθητικές ουσίες: 99,995% β/β

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΠΙΚΡΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ: denatonium benzoate

Χρώμα: Κόκκινο

Αρ. έγκρ. Κυκλοφορίας (ΥΑΑ&Τ):

ΤΠ14-0002/6-3-2012

ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ

Ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, για την καταπολέμηση των ποντικών (*Mus musculus*) και των αρουραίων (*Rattus norvegicus*)

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: •Μπορεί να βλάψει το έμβryo. •Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (στο αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επαναληπτική έκθεση. •Μακριά από παιδιά. •Ευφραδίστε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. •Μην το χρησιμοποιείτε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφυλάξεως. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια. •Φυλάσσεται κλειδωμένο. •Δράσεις που περιεχομένου/πέρεκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. •Μην τοποθετείτε το σκεύασμα σε μέρη όπου είναι εύκολο να πλησιάσουν άλλα ζώα και πουλί (γονατσάκι ή μύη). •Πλύνετε τα χέρια και τα σκαθάκια μέρη του σώματος πριν έλθει σε επαφή με τα χέρια και μετά την εφαρμογή. •Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να φορούν μάσκα και προστατευτικό εξοπλισμό κατά τον χειρισμό των δολωμάτων. •Όταν τα δολώματα χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, οι πελάτες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολώματα θα πρέπει να επισημαίνονται για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχουν δολώματα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο ενώ κατά μήκος των περασών τοποθετούμε δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης. **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επικοινωνήστε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ ή ένα γιατρό. **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:** Η θρενακούμ (difenacoum) αποτελεί ένα αντιπηκτικό που ενδεχομένως να προκαλέσει αιμορραγία (η έναρξη της αιμορραγίας μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες μετά την έκθεση). Αν δεν υπάρχει ενεργή αιμορραγία, θα πρέπει να καταπίνει ο χρόνος προδρομικής (NIN) στην εμφάνιση του περιστατικού σκίμ και σε 48-72 ώρες μετά την έκθεση. Αν ο χρόνος προδρομικής είναι μεγαλύτερος από 4, χορηγείται 5-10 mg βιταμίνης K1 (φωτομεναδόνη) μέσω αργής ενδοφλέβιας έγχυσης (100 µg/kg σωματικού βάρους για παιδί). Ενδεχομένως να χρειαστεί θεραπεία με βιταμίνη K1 (από το στόμα ή ενδοφλέβια) για αρκετές εβδομάδες. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: κρατάτε τα μάτια ανοικτά και ξεπλύνετε αργά και απαλά με νερό για 15-20 λεπτά τις ώρες. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής αν υπάρχουν μετά από τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να ξεπλύνετε τα μάτια. Προσκολληθείτε τον ασθενή για συμπτώματα δηλητηρίασης (ιγνορραγίες, αίμα στα ούρα, αιμόπτυση, εσωφικό και αοσυνήθιστος πόνος στην κοιλιακή χώρα, αίμα στα ούρα, αύξηση χρόνου πήξεως του αίματος). • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν την επόμενη χρήση τους. Παρακολουθήστε τον ασθενή για συμπτώματα δηλητηρίασης (αίμα με τα ούρα). • Σε περίπτωση κατάποσης: ξεπλύνετε το στόμα με φρεσκο νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή δεικνύοντας την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό εκτός και αν συμβουλευτείτε σχετικά από ιατρό ή το κέντρο δηλητηρίασης. Μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. • Η χρήση του να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από τα άτομα που ακολουθούν αντιπηκτική αγωγή. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** βιταμίνη K1 (υπό ιατρική παρακολούθηση). **ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ:** 210 77 95 777

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Για να αποφεύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Προφυλάξτε για το οικοσύστημα: • Αναζητήστε τους νεκρούς αρουραίους ή τα ποντικά και θάψτε τα ή κάψτε τα μαζί με τυχόν υπόλοιπα δολωμάτων που δεν χρησιμοποιήθηκε ή που δεν έχει φαγαθεί από τα τρωκτικά. • Τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μόνιμα δολώματα.

Καθαρό βάρος: 5 ΚΙΛΩ (5KG)

Περιέχει δολώματα (φακελάκια) των 10 γρ.

Κάτοχος έγκρισης-Παρασκευαστής σκευάσματος- Εργοστάσιο παρασκευής & συσκευασίας- Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία & σήμανση: Zapi S.p.A., via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), Italy. Υπεύθυνος επικοινωνίας: ANORFKAΧΗΜ Α.Ε., Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα



Διανομή:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Επιτροπή, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100
www.ellagret.gr



Στόχος για τον οποίο προορίζεται - τρόπος δράσης: Ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των ποντικών (*Mus musculus*) και των αρουραίων (*Rattus norvegicus*). Αρκεί ένα και μόνο γεύμα από τα τρωκτικά για να ληφθεί με το δόλωμα η θανατηφόρος δόση.

Δόσεις εφαρμογής:

Είδος στόχος	Πεδίο εφαρμογής	Ένταση προσβολής	Δοσολογία
Ποντικός (<i>Mus musculus</i>)	Εσωτερικοί χώροι και γύρω από τα κτίρια	Υψηλή	50γρ ανά θέση δόλωσης κάθε 2 μέτρα
		Χαμηλή	50γρ ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα
Αρουραίοι (<i>Rattus norvegicus</i>)	Εσωτερικοί χώροι και γύρω από τα κτίρια	Υψηλή	100γρ ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα
		Χαμηλή	100γρ ανά θέση δόλωσης κάθε 10 μέτρα
	Υπόνομοι	---	150γρ ανά θέση δόλωσης

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Η χρήση των δολωμάτων προορίζεται για εσωτερικούς χώρους κτιρίων, γύρω από κτίρια αστικών ή αγροτικών περιοχών και σε υπονόμους. Πριν την εφαρμογή πρέπει να καθορίζεται ο χώρος από τις διάφορες τροφές των τρωκτικών. Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να είναι προφυλαγμένες και μη προσεγγίσιμες από ανθρώπους, κατοικίδια ζώα και πτηνά. Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσης τους από παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Όπου είναι εφικτό, τα δολώματα θα πρέπει να ασφαίζονται με τρόπο ώστε να μην μπορούν να τραβηχτούν προς τα έξω. Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιούνται δολωματικά σταθμοί ασφαλείας (tamper resistant) θα πρέπει να αναφέρονται ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν δόλωμα, ώστε να μην συγχέονται με άβλαβους δολωματικούς σταθμούς. Η δόλωση αρχίζει όταν φανούν τα πρώτα σημάδια από την παρουσία τρωκτικών. Οι θέσεις δόλωσης πρέπει να αλλάζουν περιοδικά. Η τοποθέτηση των δολωμάτων γίνεται χωρίς να έρθουν σε επαφή με τα χέρια. Τα δολώματα πρέπει να επιθεωρούνται καθημερινά και να αναπληρώνονται μέχρι να σταματήσουν να τρώνε από τα τρωκτικά. Θα πρέπει να αποφευχθεί η χρήση αντιπηκτικών δραστικών ουσιών σε μέρη όπου υπάρχουν ενδείξεις αντίστασης ανεπικρίτως των τρωκτικών σε αυτές τις δραστικές ουσίες. Για να ελεγχθεί η εξάλειψη της ανεπικρίτης, συστήνεται να γίνεται εναλλαγή των δολωμάτων, χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες κάθε φορά. Όταν τα δολώματα χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολώματα θα πρέπει να επισημαίνονται για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχουν δολώματα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, ενώ κατά μήκος των περασών τοποθετηθεί δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

Για επαγγελματίες χρήστες: Για χρήση κατά των ποντικών, τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών (που μπορεί να είναι και επαναχρησιμοποιήσιμοι) ή σε προφυλαγμένα σημεία δόλωσης. Για χρήση κατά των αρουραίων τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών που φέρουν προστασία από το άνοιγμα (tamper resistant) ή καλυμμένα σημεία δόλωσης. Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία όπου ζουν, διερχονται ή τρέφονται τα τρωκτικά και στην ιδανική περίπτωση θα πρέπει να τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών επάνω στην επιφάνεια του εδάφους. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν προστασία από το άνοιγμα, ώστε το δόλωμα να είναι προφυλαγμένο εντός του δολωματικού σταθμού. Στην περίπτωση που τα δολώματα δεν τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών μπορούν να τοποθετούνται σε δίσκους (trays) και να τοποθετούνται σε προφυλαγμένες θέσεις δόλωσης με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι προσεγγίσιμα από οργανισμούς μη στόχους (ανθρώπους, κατοικίδια ζώα και πτηνά). Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην ετικέτα του. **Καταστάματα πώλησης:** Πωλείται μόνο από καταστήματα εμπόρεως νεωργικών φαρμάκων. **Επιτρέπεται η πώληση του σε συνεργεία μιοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.** **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος:** Τα δολώματα δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται. Μη αναμειγμένα δολώματα θα πρέπει να απορρίπτονται μέσω καύσης. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και θα πρέπει να καταστρέφονται με σχίσμο και να αναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:** Στην αρχική κλειστή συσκευασία του, σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Prod. Date):

ΑΡΙΘ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ (Batch No):

