

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΙΤΑΡΙ (ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟ), ΚΡΙΘΑΡΙ: Πλατύφυλλα ζιζάνια (ετήσια και πολυετή). Ψεκασμός μεταφωτρωτικά, μετά τα 3 φύλλα της καλλιεργείας και μέχρι την πλήρη έκπτυξη του «φύλλου σημαία». Δόση: 3-5 γρ./ στρ.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/ στρ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 (μια εφαρμογή).

Παρατηρήσεις:

- Εισαχθείτα ζιζάνια: *Adonis aestivalis* (Αδωνής), *Allium vineale* (Αγριοκρέμμυδο), *Amarantus* spp. (Βλήτα), *Anthemis cotula* (Ανθεμίδ), *Bifora rians* (Μπιφόρα), *Bilderdylkia convolvulus* (Αναρχιζόμενο Πολύφυλλο), *Capsella bursa-pastoris* (Καπέλα), *Chenopodium album* (Λουβουδία), *Geranium dissectum* (Γεράνιο), *Lamium purpureum* (Λάμιο), *Motacilla chatomilla* (Χαμομήλι), *Myragrum perfoliatum* (Μύγαρο), *Papaver rhoeas* (Παπαρούνα), *Polygonum aviculare* (Πολυκώπιτι), *Polygonum persicaria* (Αγριοπιπεριά), *Portulaca olearacea* (Αντράκλα), *Ranunculus acer* (Ρανούνκουλος), *Rapistrum rugosum* (Ράπιστρο), *Rumex* sp. (Λάπαθο), *Sinapis arvensis* (Σινάπι), *Stellaria media* (Στελλάρις), *Vicia sativa* (Αγριοαρακάς), *Viola arvensis* (Αγριοπανσές).

- Μέτρια εισαχθείτα ζιζάνια (να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη δόση): *Cirsium* sp. (Κίρσιο), *Calystegia sepium* (Περικοκλάδα Μεγάλη), *Convolvulus arvensis* (Περικοκλάδα), *Centaurea cyanus* (Κενταύριος), *Chrysanthemum segetum* (Αγριομαργαρίτα), *Fumaria officinalis* (Κατινχορτό), *Scandix pecten-veners* (Μυρίνι), *Veronica persica* (Βερόνικα).

- Η δόση είναι ανάλογη του σταθίου ανάπτυξης των ζιζανίων.

- Υγρασία του εδάφους και ξεστός καιρός επιταχύνουν τη δράση του, ενώ μεγάλη ξηρασία και πολύ κρύο την επιβραδύνουν.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Καθολικός ψεκασμός με πίεση μικρότερη από 2,7 Atm (40 psi) και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Να χρησιμοποιείται πάντα καθαρός ψεκαστήρας. Γεμίστε το δοχείο με ψεκαστικό μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα ακευασμάτος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Ξεπλύντε τα κενά υλικά συσκευασίας και ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Πρέπει οπωσδήποτε να ξεπλύνετε τον ψεκαστήρα μετά την χρήση του NIMBLE με διάλυμα 3% οικιακής αμμωνίας και ποτέ μόνο με νερό. Μη χρησιμοποιήσετε τον ψεκαστήρα για άλλο προϊόν αν δεν τον ξεπλύνετε σχολαστικά σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Αρπάζετε το ψεκαστικό διάλυμα που έχει απομείνει τουλάχιστον κατά 5 φορές και ψεκάζετε το στην ίδια καλλιέργεια ή σε άλλη που έχει εφαρμοστεί το προϊόν (σε αμείκαστη ζώνη ή σε τμήμα του αγρού όπου δεν έχει εφαρμοστεί η μέγιστη συνιστώμενη δόση).

2. Γεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό, κυκλοφορείστε το μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού για τουλάχιστον 5 λεπτά και αδειάστε τελείως.

3. Γεμίστε το βυτίο μέχρι την μέση με καθαρό νερό και προσθέστε 1 λίτρο από διάλυμα οικιακής αμμωνίας περιεκτικότητας 3% για κάθε 100 λίτρα νερού. Βάλτε σε λειτουργία τον αναθετήρα και αφήστε το διάλυμα να κυκλοφορήσει σε όλο το ψεκαστικό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απογεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και αφήστε το επί δυο ώρες. Στην συνέχεια αδειάστε το τελείως.

4. Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό.

5. Αφαιρέστε φίλτρα και μπέκ και ξεπλύντε τα ξεχωριστά σε δοχείο που περιέχει το διάλυμα καθαρισμού που αναφέρεται στο σημείο 3 στην ίδια συγκέντρωση και στη συνέχεια ξεπλύντε με καθαρό νερό.

Μη ρίχνετε ποτέ τα νερά του καθαρισμού σε αποχετεύσεις ή επιφανειακά νερά, ούτε κοντά σε πηγάδια ή άλλους υδάτινους πόρους ή άλλες καλλιέργειες ή εδάφη τα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν με άλλες καλλιέργειες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως τα δοχεία με τρύπημα και τα κομμάτια με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

NIMBLE®

Thifensulfuron methyl (Θιφελσουφουρόν μέθυλ)
Tribenuron methyl (Τριμηνουρόν μέθυλ) Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: Thifensulfuron methyl: 50% β/β, Tribenuron methyl: 25% β/β,
Βοηθητικές ουσίες: 21,6% β/β

ZIZANIOKTONO

Εκλεκτικό, μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των σουλφονουριών για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι και κριθάρι. Απορροφάται από το φύλλωμα και από τη ρίζα των ζιζανίων. Το NIMBLE είναι μίγμα δύο δραστικών συστατικών (Thifensulfuron methyl και Tribenuron methyl) που δρουν αναστέλλοντας το ένζυμο Ακετογλακτική συνθετάση (ALS). Η καταστροφή των ζιζανίων επέρχεται μετά από 1 έως 3 εβδομάδες από την εφαρμογή.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Προσοχή, περιέχει Tribenuron methyl, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 Λίτρο

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 70125/17-07-2015

Κάτοχος της έγκρισης: CHEMINOVA AGRO SA,
Almansa 105-20, 28040 Madrid, Ισπανία
Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά –
Εργοστάσιο συσκευασίας –

Διανομή: **ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**

Εσέθ Ήροπτηγασδ, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100
Θεσ/νίκη: 53 Ο.Τ., Γ Φάση, Βλ.Π.Ε.Θ. – Σίνδος
Τηλ.: 2310 795884 • Fax: 2310 796741
www.ellagret.gr



ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Σε περίπτωση εισπνοής: απομακρύνετε τον παθόντα αμέσως από τη μολυσμένη περιοχή. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν η αδιαθεσία παραμείνει. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό μέχρι να απομακρυνθεί εντελώς το χημικό. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε το δέρμα καλά με νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: ή πρόκληση εμετού δεν συνιστάται. Ξεπλύνετε το στόμα και χορηγήστε νερό ή γάλα. Αν προκληθεί εμετός, ξεπλύνετε το στόμα και χορηγήστε πάλι υγρά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Πλύντε στομάχου ή χορηγήστε ενεργό άνθρακα συνιστώνται. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΑΙ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης πλάτους 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αμείκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη καλλιεργούμενη γη.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: --

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Με στόχο την αποφυγή ή την καθυστέρηση εμφάνισης ανθεκτικών ζιζανίων, συνιστάται η εναλλαγή ή ανάμειξη σκευασμάτων που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης. Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες υπό στρες. Μην αυξάνετε τις δόσεις.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Δεν έχει εφαρμογή.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Δεν ορίζεται. Καθορίζεται από το διάστημα της τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής >120 ημερών.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Αριθμός Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας
Ημερ. Παρασκευής: Βλέπε επί της συσκευασίας

 CHEMINOVA

