

**ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΔΟΣΕΙΣ** (κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού)  
**ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ:** για Ψευδοκρόκωπορα, Μαύρη κηλιδώση φύλλων, Αλτερνάρια, Κυνιδροσπορία, Σκληροτίνια, με εφαρμογές από το στάδιο της εμφάνισης των πλάγιων κλάδων και δόση 312,5-625 κ.εκ. **ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ:** για ρύθμιση της βλάστησης με εφαρμογές από το στάδιο της εμφάνισης των πλάγιων κλάδων και δόση 312,5-625 κ.εκ. **ΛΙΝΑΡΙ:** για Διδίο, Στίττορα, Πολυστοπορα, με εφαρμογές από το στάδιο που τα φυτά έχουν ύψος 20 εκατοστά και δόση 312,5-625 κ.εκ. **ΚΡΙΑΡΙΑ:** για Διδίο, Σκωρίαση, Ρυγχιστορίωση, Ελαιοσπορίωση, Φουζάριο, Ρευμοκλάδρια, με εφαρμογές από το στάδιο επιμήκυνσης του στελέχους και δόση 312,5-625 κ.εκ. **ΒΡΩΜΗ:** για Διδίο, Σκωρίαση, με εφαρμογές από το στάδιο επιμήκυνσης του στελέχους και δόση 312,5-625 κ.εκ. **ΣΙΤΑΡΙ** (σκληρό, μαλακό), **ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ, ΖΕΑ** (αγριοσίττορα): για Διδίο, Φουζάριο, Στίττορα, Σκωρίαση, με εφαρμογές από το στάδιο επιμήκυνσης του στελέχους και δόση 312,5-625 κ.εκ. **ΣΙΚΑΛΗ:** για Σκωρίαση, Ρυγχιστορίωση, με εφαρμογές από το στάδιο επιμήκυνσης του στελέχους και δόση 312,5-625 κ.εκ. **ΜΠΙΖΕΛΙ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΠΙΖΕΛΙ:** για Σκωρίαση, με εφαρμογές από το στάδιο εμφάνισης των πρώτων ανοιχτών ανθέων και δόση 250-500 κ.εκ. **ΑΜΠΕΛΙ** (ονοποισίμους ποικιλίες): για **μαύρη σήψη**, με εφαρμογές από το στάδιο του 3ου φύλλου και δόση 76-127 κ.εκ.

**Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρο / στρέμμα):** Για όλες τις καλλιέργειες 20-40, για αμπέλι 30-50.  
**Μείγματος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο:** ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ: 2 εφαρμογές (3 η εφαρμογή (1 ην χείμαυρα και δύο την άνοιξη), ΑΝΘΙΣΤΗΚΗ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ: 2 εφαρμογές (την άνοιξη), Μεσοδιστίττορα: 14 ημέρες, ΚΡΙΑΡΙΑ – ΚΡΙΑΡΙΑ – ΒΡΩΜΗ – ΣΙΤΑΡΙ – ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ – ΖΕΑ – ΣΙΚΑΛΗ – ΜΠΙΖΕΛΙ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΠΙΖΕΛΙ: 1, ΑΜΠΕΛΙ 2/14.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποδογίονται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

**Προστασία του χρήστη και των εργαζομένων:**

Για τον χρήστη, φοράτε:

Ψεκατήρες μεγάλων καλλιεργειών (ράμπτα) και νεφελωκασκήτες

• **Κατά την ανάμιξη/φόρτωση:** -Γάντια νιτριλίου σύμφωνα με την πιστοποίηση EN 374-3, -Ολόσωμη φόρμα εργασίας 65% πολυέστερ / 35% βαμβάκι βάρους τουλάχιστον 230 g/m<sup>2</sup>, με υδατοαπωθητική επεξεργασία, -Τμήμα μέσου στομικής προστασίας (μπλουζά ή ρούπα με μακριά μανίκια) κατηγορίας III και τύπου PB (3), το οποίο πρέπει να φοριέται πάνω από την ανωτέρω ολόσωμη φόρμα εργασίας, -Γυαλιά (ή μάσκα προσώπου) σύμφωνα με τον κανονισμό EN 166 (CE, περίττιψη 3).

• **Κατά την εφαρμογή – Ψεκασμός με ράμπτα (δημητριακά):**

Εάν η εφαρμογή γίνεται με τρακτέρ καμπίνας: - Ολόσωμη φόρμα εργασίας 65% πολυέστερ / 35% βαμβάκι βάρους τουλάχιστον 230 g/m<sup>2</sup>, με υδατοαπωθητική επεξεργασία, - Γάντια νιτριλίου σύμφωνα με την πιστοποίηση EN 374-2 μίας χρήσεως, σε περίπτωση επέμβασης στο υλικό κατά τη φάση του ψεκασμού. Σε αυτήν την περίπτωση, τα γάντια πρέπει να φοριούνται μόνον στο εξωτερικό της καμπίνας και πρέπει να αποθηκεύονται μετά τη χρήση εκτός καμπίνας.

Εάν η εφαρμογή γίνεται με τρακτέρ χωρίς καμπίνα: - Ολόσωμη φόρμα εργασίας 65% πολυέστερ / 35% βαμβάκι βάρους τουλάχιστον 230 g/m<sup>2</sup>, με υδατοαπωθητική επεξεργασία, - Γάντια νιτριλίου σύμφωνα με την πιστοποίηση EN 374-2 μίας χρήσεως, σε περίπτωση επέμβασης στο υλικό κατά τη φάση του ψεκασμού.

• **Κατά την εφαρμογή – Ψεκασμός με νεφελωκασκήτη (αμπέλι):**

Εάν η εφαρμογή γίνεται με τρακτέρ καμπίνας: - Ολόσωμη φόρμα εργασίας 65% πολυέστερ / 35% βαμβάκι βάρους τουλάχιστον 230 g/m<sup>2</sup>, με υδατοαπωθητική επεξεργασία, - Γάντια νιτριλίου σύμφωνα με την πιστοποίηση EN 374-2 μίας χρήσεως, σε περίπτωση επέμβασης στο υλικό κατά τη φάση του ψεκασμού. Σε αυτήν την περίπτωση, τα γάντια πρέπει να φοριούνται μόνον στο εξωτερικό της καμπίνας και πρέπει να αποθηκεύονται μετά τη χρήση εκτός καμπίνας.

Εάν η εφαρμογή γίνεται με τρακτέρ χωρίς καμπίνα: - Ολόσωμη προστατευτική φόρμα εργασίας κατηγορίας III τύπου 4 με κουκούλα ή ολόσωμη φόρμα εργασίας, - Γάντια νιτριλίου σύμφωνα με την πιστοποίηση EN 374-2 μίας χρήσεως, σε περίπτωση επέμβασης στο υλικό κατά τη φάση του ψεκασμού.

• **Κατά τον καθαρισμό της συσκευής ψεκασμού:**

-Γάντια νιτριλίου σύμφωνα με την πιστοποίηση EN 374-3, -Ολόσωμη φόρμα εργασίας 65% πολυέστερ / 35% βαμβάκι βάρους τουλάχιστον 230 g/m<sup>2</sup>, με υδατοαπωθητική επεξεργασία, -Τμήμα μέσου στομικής προστασίας (μπλουζά ή ρούπα με μακριά μανίκια) κατηγορίας III και τύπου PB (3), το οποίο πρέπει να φοριέται πάνω από την ανωτέρω ολόσωμη φόρμα εργασίας.

Ψεκατήρες πλάτης ανοιχτής υπαίθρου στα αμπέλια:

• **Κατά την ανάμιξη/φόρτωση:** -Γάντια νιτριλίου σύμφωνα με την πιστοποίηση EN 374-3, -Ολόσωμη προστατευτική φόρμα εργασίας κατηγορίας III τύπου 4 ή ολόσωμη φόρμα εργασίας και τμήμα μέσου στομικής προστασίας (μπλουζά ή ρούπα με μακριά μανίκια) κατηγορίας III και τύπου PB (3), το οποίο πρέπει να φοριέται πάνω από την ανωτέρω ολόσωμη φόρμα εργασίας.

• **Κατά την εφαρμογή:** -Γάντια νιτριλίου σύμφωνα με την πιστοποίηση EN 374-3, -Ολόσωμη προστατευτική φόρμα εργασίας κατηγορίας III τύπου 4 με κουκούλα ή ολόσωμη φόρμα εργασίας 65% πολυέστερ / 35% βαμβάκι, βάρους τουλάχιστον 230 g/m<sup>2</sup>, με υδατοαπωθητική επεξεργασία.

-Προστατευτικές μπότες σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον κανονισμό EN 13 832-3.

• **Κατά τον καθαρισμό της συσκευής ψεκασμού:** -Γάντια νιτριλίου σύμφωνα με την πιστοποίηση EN 374-3, -Ολόσωμη προστατευτική φόρμα εργασίας κατηγορίας III τύπου 4 ή ολόσωμη φόρμα εργασίας και τμήμα μέσου στομικής προστασίας (μπλουζά ή ρούπα με μακριά μανίκια) κατηγορίας III και τύπου PB (3), το οποίο πρέπει να φοριέται πάνω από την ανωτέρω ολόσωμη φόρμα εργασίας.

Για τον εργαζόμενο, να φοράτε:

-Γάντια νιτριλίου σύμφωνα με την πιστοποίηση EN 374-3, -Ολόσωμη φόρμα εργασίας 65% πολυέστερ / 35% βαμβάκι βάρους τουλάχιστον 230 g/m<sup>2</sup>, με υδατοαπωθητική επεξεργασία.

# RIZA 200 EC

Tebuconazole

(Τεμπουκοναζόλ: ομάδα τριαζολών)

Εγγυημένη σύνθεση: Tebuconazole 20% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 78,76% β/β

Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

## ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο και ρυθμιστής ανάπτυξης (για την καλλιέργεια της ελαιοκράμβης), της ομάδας των DMIs, (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors - DMIs).

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ  
ΠΡΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

## ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Υποπνο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
- Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 Λίτρο

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60.500/27.01.2016

Κάτοχος της άδειας: CHEMINOVA A/S P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Denmark  
Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά - Εργοστάσιο συσκευασίας - Διανομή:

**ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**

Θέση Ξηροπηγάδο, 19600 Μάνδρα Αττικής  
Τηλ.: 210 5580431 • Fax: 210 5550100  
Θεσ/νίκη, 53 ΟΤ, Γ. Φάση, ΒΙΠΕΘ - Σίνδος  
Τηλ.: 2310 795884 • Fax: 2310 796741  
www.ellagret.gr



## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Φυλάσσετε κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα αρκετές φορές με νερό ή γάλα. Να μην προκληθεί εμετός. Να μη δοθεί τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει αισθήσεις του. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε το θύμα από το σημείο έκθεσης και οδηγείστε το στον καθαρό αέρα.

**Οδηγίες για τον γιατρό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Σε περίπτωση κατάποσης συνιστάται πλύση στομάχου ή / και λήψη ενεργού άνθρακα.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77.93.777.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

Μη ρυτύνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

(Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθωστρωτές επιφάνειες και τους δρόμους).

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα στην οποία να υπάρχει μια ζώνη βλάστησης 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για να ανιχνεύονται και χειμερινά σιτηρά, τους χειμερινούς ελαιόχρους σπόρους, το λινάρι, τα μπιζέλια και το αμπέλι.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα στην οποία να υπάρχει μια ζώνη βλάστησης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τους ανιχνεύσιμους ελαιόχρους σπόρους.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Ελαιοκράμβη, Λινάρι: 63 ημέρες, Σίταρι, Τριτκάλε, Ζέα, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη: 35 ημέρες, Μπιζέλια: 28 ημέρες, Αμπέλι: 14 ημέρες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού ανακατεύοντας μέχρι να γίνει ομοιόμορφο γαλάκτωμα και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

Συνδυαστικότητα:

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστάμενες χρήσεις και δόσεις.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Χρήση του RIZA 200 EC μόνο προληπτικά και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα κατά πρόληψη επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs (υποομάδα των τριαζολών) ή δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMIs, στην οποία ανήκει και το tebuconazole.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 48 ώρες.

Συνθήκες αποθήκευσης – Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πάγο και ζέση και σε κανονικές θερμοκρασίες αποθήκευσης (5-30°C). Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

