

Φάσμα δράσης: α) Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος μέχρι απορρόφησης.					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκαστικού υγρού λίτρα / στρέμμα	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
Εσπεριδοειδή: Γκρέιπ-φρουτ, Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά	Ψευδοκόκκος Κόκκινη ψώρα Λεκάριο Ασπιδιατόξ Ισάβια Μυτιλόμορφη ψώρα Λοιπές ψώρες Θρίπες Αφίδες Ανθοτρήτης	200-500	200-400	Με την εμφάνιση των προσβολών	1-2 (μεσοδιάστημα 60 ημέρες)
Μηλοειδή: Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά	Καρπόκακη Ανθόνομος Υπονομευτής Ψώρα του Σαν Ζοζέ Βαμβάκιδα Ματοψείρα Φυλλορύκτες Ζευξέρα Κόσσοι Ξυλοφάγα έντομα	100 -250	100 -200	Εφαρμογές πριν την άνθηση (BBCH 10-59)	1-2 (μεσοδιάστημα 10-15 ημέρες)
Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά	Ανάσaris Βαμβάκιδα Καρπόκακη Φυλλοδέτες Ζευξέρα Κόσσοι Ξυλοφάγα έντομα	150 -312,5	150 -250	Εφαρμογές πριν την άνθηση (BBCH 10-59)	1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)
Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα υπαίθρου	Αφίδες Θρίπες Πράσινο σκουλήκι Πιερίδα	200-250	50-80	Εφαρμογές πριν την άνθηση (BBCH 11-59)	1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)
Βαμβάκι	Πράσινο σκουλήκι Ροδίνο σκουλήκι Σποντόπτερο Αφίδες Θρίπες	200	50-80	Ψεκασμός με την εμφάνιση των αυγών ή των πρώτων εντόμων.	1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)
Πατάτα	Δορυφόρος Θρομβία Αφίδες	200-250	50-80	Ψεκασμός με την εμφάνιση των εντόμων και πριν το σχηματισμό των κονδύλων (BBCH 10-39)	1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)

Παρατηρήσεις:

1. Στα εσπεριδοειδή να μη χρησιμοποιείται κατά την περίοδο της άνθησης
2. Βαμβάκι: Το ψεκασμένο φυτικό υλικό να μη χρησιμοποιείται για ζωοτροφή

β) Ψεκασμοί εδάφους και ενσωμάτωση (Πεδίο εφαρμογής, Στόχος, Δόσεις, Τρόπος και χρόνος εφαρμογής): Καρπούζι, Αγγούρι, Κολοκύθη, Τριφύλλια, Βαμβάκι, Πατάτα, Καπνός, Καλαμπόκι, Σιτάρι: Για Πρασάγγουρα, Χλώροπα, Ζάμπρο: 100 κ.εκ/στρ. max (σε λωρίδες ή αulάκια). Για Κοφτοσκουλήκο: 130 κ.εκ/στρ. max (καθολική εφαρμογή), 80 κ.εκ/στρ. max (σε λωρίδες ή αulάκια). Πριν τη σπορά ή φύτεμα με ομοιόμορφο ψεκασμό και ενσωμάτωση στα 5-10 εκ.

Καπνός, Τομάτα: Για Σιδεροσκουλήκο, Υλέμια, Πρασάγγουρα, Χλώροπα, Ζάμπρο, Κοφτοσκουλήκο: 150 κ.εκ/στρ. max. Κατά το φύτεμα. Εφαρμογή με το νερό του ποτίσματος.

γ) Δοσώματα για τις προαναφερθείσες καλλιέργειες: Για Κοφτοσκουλήκο, Πρασάγγουρα: 100 κ.εκ/στρ. με 3 κλά πούρα σε 1 λίτρο νερό. Με διασκορπισμό.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 εφαρμ.

DUCLOR 48 EC

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής, στομάχου και ατμών, για την καταπολέμηση μυζητικών και μασητικών εντόμων.

Εγγυημένη σύνθεση: Chlorpyrifos 48% β/ο,

Βοηθητικές ουσίες 55,47% β/β

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 1805/26.3.1999



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες
Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας

Παρασκευαστής: Dow Agrosciences Ltd, UK



Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
DELTA GAMMA AGRO A.B.E.E.
Αγ. Σοφίας, Θέση Μηλιαδίστα, 19300
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 2102849412,
2105595944 FAX: 2102850352
e-mail: dgagro@otenet.gr
www.dgagro.gr



Διανομή
ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
Θέση Σπρονήγο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100
www.ellagret.gr

Αρ. παρτίδας:

Ημ. παραγωγής - λήξης: (βλέπε επί της συσκευασίας)

Περιεχόμενο 1 λίτρο

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. — Μην καπνίζετε. Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Γενικές πληροφορίες: Μη χορηγείτε ποτέ υγρά και μη προκαλείτε εμετό εάν ο πάσχων δεν έχει τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει σπασμούς. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Μην χορηγείτε υγρά στον ασθενή. Μη χορηγείτε τίποτα από στόματος σε άτομα που δεν διατηρούν τις αισθήσεις τους. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον πάσχοντα στον καθαρό αέρα. Εάν ο πάσχων δεν ανανέει καλέστε ασθενοφόρο, και έπειτα εκτελέστε τεχνητή αναπνοή. Στην περίπτωση αυτή πάρτε μέτρα προστασίας (μάσκα) καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή γιατρό. Εάν ο πάσχων δυσκολεύεται να αναπνεύσει τότε πρέπει να του χορηγηθεί οξυγόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Το προτεινόμενο αντίδοτο είναι η ατροπίνη, μόνο σε ενέσιμη μορφή. Οι οξίμες (Oximes) π.χ. 2-PAM/protorham, μπορεί να είναι θεραπευτικές εάν χρησιμοποιηθούν χωρίς αλλά πάντα σε συνδυασμό με ατροπίνη. Σε περίπτωση μόλυνσης οι εξετάσεις χολινεστεράσης πλάσματος και ερυθρών αιμοσφαιρίων θα δείξουν το επίπεδο της μόλυνσης. Σε περίπτωση οξείας δηλητηρίασης χρησιμοποιήστε αμέσως το αντίδοτο μετά τη διασφάλιση της αναπνοής. Το προϊόν περιέχει ένα διαλύτη και έναν αναστολέα της χολινεστεράσης. Θεραπεία συμπτωματική. Εάν πραγματοποιηθεί πλήρης στομάχου συστατάι έλεγχος ενδοτραχειακό και/ή οισοφάγου. Ο κίνδυνος αναρρόφησης από τους πνεύμονες πρέπει να αξιολογηθεί σε σχέση με την τοξικότητα, στο ενδεχόμενο κένωσης του στομάχου. Ο γιατρός μόνο μπορεί να αποφασίσει επ' αυτού. Διατηρήστε επαρκή οξυγόνο. Η θεραπεία στοχεύει στον έλεγχο των συμπτωμάτων και την κλινική κατάσταση του ασθενούς.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77 93777

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος σε μια μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και το ρίχνουμε μέσα στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνουμε στην συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές τα κενά συσκευασίας ρίχνοντας το νερό στο ψεκαστικό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα αναποστεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την πρόσφατη ψεκασμένη περιοχή.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε πρώιμες ποικιλίες ροδακινιάς.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Στην αρχική του απασβεστική συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο διατηρείται σταθερό για δύο χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

1) Φυτικά προϊόντα (για τους ψεκασμούς φυλλώματος):

Πορτοκαλιά, Γκρέιπ-φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά: 21 ημέρες.

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά, Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Πατάτα: Δεν ορίζεται βάση του χρόνου εφαρμογής.

Βαμβάκι: 90 ημέρες.

2) Για τις εφαρμογές εδάφους: Δεν ορίζεται βάση του χρόνου εφαρμογής.



16x16mm



266x150mm