

INDOFIL PLUS 80 WP

Mancozeb (Μανκόζεμπ) 80 %

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγυημένη σύνθεση: Mancozeb 80 % β/β, Βοηθητικές ουσίες 5,88 % β/β

Μικητοκτόνο με προστατευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών
Το Mancozeb δρά εμποδίζοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό των μυκήτων σε πολλαπλά σημεία. Διαθέτει ευρύ φάσμα δράσης

022019

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

A.A.D.A.: 60.584/14-12-2016



Κάτοχος της άδειας: INDOFIL INDUSTRIES (NETHERLANDS) B.V. Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam, Ολλανδία
Υπεύθυνος για την τελική διόθεση στην αγορά: ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Κεντρικά: Θέση Ντράσεζα (Β.Π.Α.), Τ.Κ. 190 111 Αυλώνας Αττικής, Τηλ.: 22950 29350-4, Φαξ: 22950 29305
Υποκατάστημα Βορείου Ελλάδος: Β.Π.Ε.Θ. Ο.Τ. 42, Δ.Α. 11, Τ.Θ. 174, Τ.Κ. 570 22 Σινδος Θεσσαλονίκης,
Τηλ.: 2310 788002-3, Φαξ: 2310 799840

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΟΓΗΣ:
ΑΡΙΘ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 2,5 κιλά

Καλλιέργειες - Αθένειες - Δάσεις (πάνω 100 λίτρα φεκ. υγρού) - Χρόνος εφαρμογής: Επεριδοειδή (Νεραντζιά, Λεμονιά, Μανταρινία, Γκρέιπ-φρουτ): Δόση 200-300 γρ. Όγκος φεκ. υγρού 100-150 λίτρα/στρ. Για Φυτόφθορα εφαρμογές σταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών της πράσινης κορυφής και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Αχλαδία: Δόση 200 γρ. Όγκος φεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Φουζικλάδιο, Σεπτωρίων, Φαιδί σήμη εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Ροδοκάσια, Νεκταριά, Βερικοκά, Δαμασκηνία, Κερασά, Καρότο, Λαγόχορτα - Λαχανίδες: 30-50 λίτρα/στρ. Για Φουζικλάδιο, Σεπτωρίων, Φαιδί σήμη εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Αχλαδία: Δόση 200 γρ. Όγκος φεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Φουζικλάδιο, Σεπτωρίων, Φαιδί σήμη εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Ροδοκάσια, Νεκταριά, Βερικοκά, Δαμασκηνία: Δόση 200 γρ. Όγκος φεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Σκωρισσή, Φαιδί σήμη, Προσβολή φύλλων (Gnomonia erythrostroma), Κορύνεο εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Καρότο: Δόση 200 γρ. Όγκος φεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Σκωρισσή, Φαιδί σήμη, Προσβολή φύλλων (Gnomonia erythrostroma), Κορύνεο εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Καρότο: Δόση 200 γρ. Όγκος φεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Σκωρισσή, Φαιδί σήμη, Προσβολή φύλλων (Gnomonia erythrostroma), Κορύνεο εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Ελιά: Δόση 200 - 300 γρ. Όγκος φεκ. υγρού 100 - 150 λίτρα/στρ. Για Κυκλοκάνιο εφαρμογής εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Ελιά: Δόση 200 - 300 γρ. Όγκος φεκ. υγρού 100 - 150 λίτρα/στρ. Για Σκόρδο, Κρεμμύδι, Ασκαλώνια: Δόση 200-250 γρ. Όγκος φεκ. υγρού 100 - 125 λίτρα/στρ. Για Περονόσπορο εφαρμογές από το στάδιο των φυτών εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Σκόρδο, Κρεμμύδι, Ασκαλώνια: Δόση 200-250 γρ. Όγκος φεκ. υγρού 100 - 125 λίτρα/στρ. Για Περονόσπορο εφαρμογές από το στάδιο των φυτών εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Σκόρδο, Κρεμμύδι, Ασκαλώνια: Δόση 200 γρ. Όγκος φεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Αλεγχόρτα - Αχανίδες: Δόση 200 γρ. Όγκος φεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Αλεγχόρτα, Αλεγχόρτα, Ανθράκωση: Δόση 200 γρ. Όγκος φεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Περονόσπορο, Αλεγχόρτα, Αλεγχόρτα, Ανθράκωση προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από το στάδιο των 3^{ου} πραγματικού φύλλων. Πιπέρια (Y): Δόση 200 γρ. Όγκος φεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Περονόσπορο, Αλεγχόρτα, Αλεγχόρτα, Ανθράκωση προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από το στάδιο των φυτών. Μαρούλι (Y): Δόση 200 γρ. Όγκος φεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Περονόσπορο προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από το στάδιο των 3^{ου} πραγματικού φύλλων. Κολοκυθά (Y), Αγγούρια (Y), Αγγούρι (Y), Πεπόνι (Y), Κολοκυθά (Y): Δόση 200 γρ. Όγκος φεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Περονόσπορο, Ανθράκωση προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από το στάδιο των 5^{ου} φύλλων. Μπρόκολα: Δόση 200 γρ. Όγκος φεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Περονόσπορο, Αλεγχόρτα, Αλεγχόρτα, Ανθράκωση προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από το στάδιο των φυτών. Μαρούλι (Y): Δόση 200 γρ. Όγκος φεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για Περονόσπορο, Αλεγχόρτα, Αλεγχόρτα, Ανθράκωση προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από το στάδιο των φυτών. Πιπέρια (Y), Κολοκυθά (Y), Αγγούρια (Y), Αγγούρι (Y), Πεπόνι (Y), Κολοκυθά (Y), Μαρούλι (Y): Μέχρι 4 εφαρμογές ανά 10 μήνες, εφόσον απαιτείται. Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιημές ποικιλίες): Μέχρι 3 εφαρμογές ανά 16 μήνες, εφόσον απαιτείται. Καρότο, Λαγόχορτα - Αχανίδες, Μπρόκολα, Σπαράγη: Μέχρι 4 εφαρμογές ανά 14 μήνες, εφόσον απαιτείται. Καλλοπιστικά φύτα και θάμνοι: Υπαίθρου: Μέχρι 4 εφαρμογές ανά 7 μήνες, εφόσον απαιτείται. Πιπέρια (Y): Μέχρι 5 εφαρμογές ανά 10 μήνες, εφόσον απαιτείται. Πάτατα: Μέχρι 3 εφαρμογές ανά 10 μήνες, εφόσον απαιτείται. Καλλοπιστικά φύτα και θάμνοι: Υπαίθρου: Μέχρι 4 εφαρμογές ανά 7 (θάμνο) 5 μήνες εφόσον απαιτείται. Πιπέρια (Y): Μέχρι 8 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 μήνες, εφόσον απαιτείται. Σιτάρι: Μέχρι 3 εφαρμογές ανά 14 μήνες, εφόσον απαιτείται. Καλλοπιστικά φύτα και θάμνοι: Υπαίθρου: Μέχρι 4 εφαρμογές ανά 7 (θάμνο) 4 μήνες εφόσον απαιτείται. Παραπρήσης: Το INDOFIL PLUS 80 WP είναι ένα προστατευτικό μικητοκτόνο. Η πρώτη εφαρμογή είναι καλό να γίνεται πριν την προβλεπόμενη εμφάνιση της ασθένειας. Οι εφαρμογές επιναλαμβάνονται ανάλογα με την πίεση της προσβολής και συμφωνα με την ανιστορία της ασθένειας. Σε περιπτώσεις που η ασθένεια δεν αποτελείται από μόνο μυκήτων υψού ώστε να μην υπερβαίνεται η μένιστη δόση /στρ. 4. Πριν την εφαρμογή του οικεύαματος το φύλλωμα πρέπει να είναι στενό μετά από άρδευση ή βροχή. 5. Μην εφαρμόζετε το οικεύαμα εάν αναμένεται βροχή εντός 4 ωρών. 6. Να μην χρησιμοποιούνται ως τροφή τα αμπελόδουλα σε περιπτώσεις χρήσης του INDOFIL PLUS 80 WP. 7. Να ακολουθούνται οι ουσιότησιν των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιησεων, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί με καλό λόισμα του φυτώλωματος.

Τρόπος παρακεντήσεως Φυκεστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του φυκεστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε τη συνιστώμενη δόση του οικεύαματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο φυκεστικό δοχείο αναδύοντας τη συγκέντρωση. Συμπληρώστε το δοχείο με νερό.

Τελευταία επέβαση πριν τη συγκριμή: Επεριδοειδή (Νεραντζιά, Λεμονιά, Μανταρινία, Γκρέιπ-φρουτ): 14 μήρες, Μηλιά, Αχλαδία, Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιημές ποικιλίες), Σκόρδο, Κρεμμύδι, Μπρόκολα, Μαρούλι (Y), Πράσο, Μπιζέλια (αρακάς,

σπόρια), Φασόλια (σπόρια): 28 μήρες, Ροδακινιά, Νεκταρινία, Βερικοκά, Δαμασκηνία, Κερασά, Καρότο, Λαγόχορτα - Λαχανίδες: 30-35 μήρες, Τομάτα (Y), Μελιτζάνα (Y), Πιπέρι (Y), Αγγούρι (Y), Αγγούρια (Y), Κολοκυθά (Y), Κολοκυθά (Y), Πεπόνι (Y); 3 ημέρες, Σπαράγη: 180 μήρες. Σιτάρι: 7 μήρες. Σιτάρι: Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής (εφαρμόζεται έως την πλήρη ανάθηση).

Καθορισμός φυκεστικού: Άδειάστε τελείως το δοχείο του φυκεστικού. Ξεπλύνετε τα μηχανήματα εξωτερικά με νερό. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του δοχείου του φυκεστικού με καθάρο νερό πριν πείσετε μέσω μέσης παληγώσεων και βραχίονες. Άδειάστε τελείως το φυκεστικό δοχείο. Φύλακα και μπεκάκια αφαρούνται και καθαρίζονται ξεχωριστικά με καθάρο νερό.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Να μη χρησιμοποιείται στις ποικιλίες της αχλαδιάς Κρυστάλλου, Κόδια και Βούτηρα. Μπορεί να προκαλέσει σκωριόχρωση σε μηλές ποικιλίας "Golden Delicious".

Συνδυαστικότητα: Στα Μηλοειδή το INDOFIL PLUS 80 WP μπορεί να συνδυαστεί με οικείαματα με δ.ο. myclobutanil ή fenbuconazol.

Διοχετήριο ανθεκτικότητας: Το INDOFIL PLUS 80 WP μπορεί να χρησιμοποιείται προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικούτης σε μηκτηρικότητα στο έσιδελμακόνεμό του δρόσου.

Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα: Η χρήση του είναι συμβατή σε προγράμματα Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης για τις καλλιέργειες των μηλειδίων και του αμπελιού.

Χρονικό διάστημα αποφέλειας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί στο σκεύασμα: Το ανεπιστρέφιο στον φυκεστικό χώρο που γίνεται απόφελο έχει στεγνώσει το φυκεστικό μέσα στην καλλιέργεια.

Οδηγίες για χρήση την αποφάσισης στη συσκευασία: Τα κενά υλικά συσκευασιασίας για ασύνταρτη φραγμούνα με σκίδιο, για τη διασφάλιση της περιπτώσεως ότι περιέχει χρήση, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανακτηση γενέριας.

Συνθήκες αποδίκησης, χρονική σταθερότητα του οικεύαματος: Το οικεύαμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την πμεριμνή παρασκευής του, όταν αποθεκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενό χώρο.

Παραπρήσης: Το INDOFIL PLUS 80 WP είναι ένα προστατευτικό μικητοκτόνο. Η πρώτη εφαρμογή είναι καλό να γίνεται πριν την προβλεπόμενη εμφάνιση της ασθένειας. Οι εφαρμογές επιναλαμβάνονται ανάλογα με την πίεση της προσβολής και συμφωνα με την ανιστορία της ασθένειας. Σε περιπτώσεις που η ασθένεια δεν αποτελείται από μόνο μυκήτων υψού ώστε να μην υπερβαίνεται η μένιστη δόση /στρ. 4. Πριν την εφαρμογή του οικεύαματος το φύλλωμα πρέπει να είναι στενό μετά από άρδευση ή βροχή. 5. Μην εφαρμόζετε το οικεύαμα εάν αναμένεται βροχή εντός 4 ωρών. 6. Να μην χρησιμοποιούνται ως τροφή τα αμπελόδουλα σε περιπτώσεις χρήσης του INDOFIL PLUS 80 WP. 7. Να ακολουθούνται οι ουσιότησιν των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιησεων, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο: Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με αφρόνα σαπούνι και νερό. Αφαιρέστε τους ισχυρούς φακούς επιφάς, αφαιρέστε τους εισώδους. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣ: Μην προκαλέσετε εμετό. Ζήσυτε μέσως ταρική συμβουλή και δείτε το δοχείο την επικέτα. Μη χρησιμεύτε τόποτε από το στόμα σε στόμα που έχουν χάσει τις αισθησίες τους. Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΟΝΙΣΜΟΥ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθάρο αέρα. Συμβουλεύετε γατρό. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθίστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηρίσεων: 210 77 93 777.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περίειται Hexamethylene tetramine. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Υπόποτο για πρόληψη βλάβης στο έμβριο. Πολύ τοξικό για τους ιδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειστώμενό. Μακριά από παιδιά. Εφοδιαστεί με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιήστε πριν διαβάσετε και κατανήστε όλες τις οδηγίες προφύλαξης. Αποφέυγετε την αναπνέση σταγονίδια / εκνεύφωμα. Μην τρώτε πάντα πίνετε ή καπνίζετε στην ίδια στιγμή με την εφαρμογή. Φοράτε κατάλληλες μποτες κατά την εφαρμογή με τραέλα χωρίς κλειστή καμπίνα. Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη οιμύφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους ιδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αιχμήστη ζώνη προστασίας από τη επιφανειακά υδάτα: 40 μέτρων σε δέντρα, 12 μέτρων σε άμπελους, 5 μέτρων στις υπόλοιπες καλλιέργειες.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο: Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Επιπλέοντες με αφρόνα σαπούνι και νερό. Αφαιρέστε τους εισώδους, εφόδους εισώδους. Συνεχίστε να