

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή κοπήζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικό γάντια / μέσα απομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμηξη / φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Διάθεση περιεχομένου / περιεκτή σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκευασμά ή τη συσκευασία του. Για να προστατεψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αιφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη ή ψεκάστε με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90%. Για να προστατεψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αιφέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από το όριο της καλλιέργειας μέχρι τις υδάτινες επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένης της φυτικής ζώνης ανάσχεσης. Να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν αναμένεται έντονη βροχόπτωση εντός 24 ώρας. **Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και τα περιβάλλοντα, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επικεκριθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητείστε ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. **Σε περίπτωση εισιτονικής:** Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό μετά από συβαρή έκθεση. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777.

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός μεταφυτρωτικός ψεκασμός με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους, με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, πίεση μικρότερη των 2,5 atm και μπετ τύπου σκούπας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι την μέρη με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση καθ' όλη την διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστικού μηχανήματος: Άμεσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα και ξεπλύνετε το βυτό και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό και απορρυπαντικό διάλυμα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Τα φίλτρα και ακροφύσια πρέπει να αφαιρούνται και να καθαρίζονται χωριστά και να ξεπλένονται με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι κενές συσκευασίες (φιάλες/δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προσηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία, καλά κλειστό, σε χώρο ξηρό, δροσερό (θερμοκρασίες ≤ 35°C) και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγράφομένη ημερομηνία παρασκευής.

Ημερ. Παραγωγής: Βλέπε επί της συσκευασίας
Αριθμός Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας

RiNiDi

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: rimsulfuron 2,3% β/β
nicosulfuron 9,2% β/β
dicamba υπό μορφή άλατος νατρίου 55% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 27,29% β/β

ZIZANIOKTONO

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια αράβοσίτου

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Πολλοί τοξικοί για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 440 γραμ.

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΔΑΑ): 70257 / 05.12.2017

Κάτοχος της άδειας: Sharda Cropchem España S.L, Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 12th Floor, 30006 Murcia - Ισπανία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: AgriDirection O.E. Φρίξου 5, 546 27, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 324898

Εργοστάσιο Συσκευασίας - Διανομή:



ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ: 210 5550431 • Fax: 210 5556100
www.ellagret.gr

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια αράβοσίτου. Μίγμα τριών διασυστηματικών ζιζανιοκτόνων, το rimsulfuron και το nicosulfuron της ομάδας των Σουλφονυλουριών και το dicamba το οποίο ανήκει στα παράγωγα βενζοϊκού οξέος με ορμονική δράση.

Φάσμα δράσης:

Περίοδος εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής
Ογκός ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.	γραμμ.	/ στρ.	
Αραβόσιτος	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζανία	20-40	44 Νωρίς μεταφυτρωτικά, όταν ο αραβόσιτος έχει 3 - 9 φύλλα

Παρατηρήσεις:

- Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν τα ζιζανία είναι μικρά και στο στάδιο της ζωηρής ανάπτυξης.
- Αποφεύγετε την διασπορά ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες ευαίσθητες καλλιέργειες.
- Συνιστάται η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού σκευάσματος σε αναλογία 0,1% κατ' όγκο.
- Κατατοπευμένα ζιζανία: **Μουχρίτσα** (*Echinocloa crus-galli*), **Βέλιουρας από σπόρο** (*Sorghum halepense*), **Πλαγιαστό Βλήτο** (*Amaranthus blitoides*), **Τραχύ Βλήτο** (*Amaranthus retroflexus*), **Λουβουδιά** (*Chenopodium album*), **Αγριοπεριά** (*Polygonum persicaria*), **Μαρτιάκος** (*Senecio vulgaris*), **Στελλάρια** (*Stellaria media*), **Στύφο** (*Solanum nigrum*).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργητη περίοδο:

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ δεν εφαρμόζεται.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογενείς, ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκευάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλείστε: Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι και σε καλλιέργειες αράβοσίτου που προσφίνταν για σποροπαραγωγή.

Διαχείριση Ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανικό μεθόδος, καλλιέργητη μέτρα κ.λ.π.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλίων και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δοσίσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Συνδιαστικότητα:

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το RiNiDi, στον ίδιο αγρό την ίδια περίοδο, να σπέρνεται μόνο αράβοσίτος και αφού πρώτα γίνεται άρωμα, - σποράς ή φύτευσης των καλλιέργειών που ακολουθούν: Μή σπέρνετε εάλλη καλλιέργεια εκτός από σπιρρά, πριν περάσουν 6 μήνες από την εφαρμογή του σκευάσματος, - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πιλήρωα το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια. Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 30 ημέρες μετά τον ψεκασμό.