



BRODIFACOUM (ΒΡΩΔΙΦΑΚΟΥΜΗ) 0.0029%
KILLER NEO Wheat

Το προϊόν (Τρωκτικόν-Βιοκτόνο) χρησιμοποιείται για την προστασία της δόμησις υγείας, την προστασία αποθηκευμένων προϊόντων και τροφίμων και την προστασία ουλιών [πχ ιστορικά κτίρια, τεχνικά αντικείμενα]. Προορίζεται για την καταπολέμηση των οικιακών ποντικών (*Mus musculus*) και των καφέ αρουραίων (*Rattus norvegicus*) σε εσωτερικούς χώρους και εξωτερικούς χώρους (γύρω από κτίρια) μέσω: α) καλυμμένης εφαρμογής, β) σε δολώματικούς σταθμούς. Για χρήση κατά των ποντικών, επιτρέπονται οι εμπορικά διαθέσιμοι δολώματικοί σταθμοί (έτοιμοι ή επαναπληρώσιμοι) ή εφαρμογή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης. Για χρήση κατά των αρουραίων, επιτρέπονται οι εμπορικά διαθέσιμοι, ανθεκτικοί στην παροβίαση, δολώματικοί σταθμοί (έτοιμοι ή επαναπληρώσιμοι). Για τους αρουραίους και τους ποντικούς, το δόλωμα θα πρέπει να παρέχεται συσκευασμένο, περιέχοντας την ποσότητα δολώματος που απαιτείται για μια δόση δόλωσης (είτε για αρουραία είτε για ποντικό). Ολόκληρη η συσκευασία θα πρέπει να περιέχει το πολύ 1.5 κιλό δολώματος. Οι δολώματικοί σταθμοί / τα σημεία δόλωσης τοποθετούνται χειρωνακτικά στην προσθετική από τρωκτικά περιοχή. Ιδινικά, οι δολώματικοί σταθμοί θα πρέπει να είναι στερεωμένα στο έδαφος. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται υψηλά.

ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Για προσβολές από ποντικούς χρησιμοποιείσθε μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετείτε τις θέσεις δόλωσης κάθε 5 μέτρα, μειώνοντας την απόσταση στα 2 μέτρα σε περιοχές με συδρόμιο προσβολής.

Για προσβολές από αρουραίους χρησιμοποιείσθε μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετείτε τις θέσεις δόλωσης κάθε 10 μέτρα, μειώνοντας την απόσταση στα 5 μέτρα σε περιοχές με συδρόμιο προσβολής.

Κάνετε τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων δόλωσης (συνιστάται κάθε 3 ή 4 μηνές) και αναπληρώνετε τα δολώματα που έχουν φαγωθεί από τα τρωκτικά ή καταστραφεί από νερό ή λερωθεί. Στις περιοχές όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τους. Για να ελεγχθεί τη εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνιστάται να γίνεται εναλλαγή των δολωμάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπικτικές δραστικές ουσίες. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται υψηλά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Πλένετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν από κάθε γεύμα και μετά την χρησιμογραφία. Για χρήση μόνο σε περιοχές δύο δεν είναι δυνατή η πρόσθιση σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφίας και μη στοχευόμενα ζώα. Αποτρέψτε την πρόσθιση στα δόλωμα από παιδιά, πινάκια και μη στοχευόμενα ζώα (ιδιαίτερα από σκυλά, γάτες, χοίρους και πουλερικά). Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάσπασής τους από άλλα ζώα ή παιδιά. Όπου είναι δυνατόν, τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλίζονται με τρόπο ώστε να μην μπορούν να απομακρυνθούν. Εκτός και αν υπάρχει επιθετική από επαγγελματική χρήση, τα αντιπικτικά τρωκτικότανά δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μόνιμα δολώματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αντιπικτικό δόλωμα θα πρέπει να επιτύχει τον έλεγχο των τρωκτικών εντός 35 μηνών. Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, τουλάχισταν κάθε φορά που ελέγχετε και/ή αναπληρώνετε τα δολώματα. Ενδεχομένως να απαιτείται καθημερινός έλεγχος σε ορισμένες περιπτώσεις. Να απορρίπτετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Ημερομηνία Παραγωγής (Prod. Date):
Αριθμός Παρτίδας (Lot No.):

P22035

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ ΤΟΥ:
Απομακρύνετε όλα τα δολώματα μετά την εφαρμογή και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Τα νεκρά τρωκτικά και τα δολώματα εκτός δολωματικών σταθμών θα πρέπει να απομακρύνονται με τη χρήση προστατευτικών γαντιών.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:
Φυλάξτε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία. Φυλάξτε το σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Φυλάξτε το μακριά από τη φως. Χρονική διάρκεια σταθερότητας μέχρι 2 χρόνια.

(περιέχει δόλωμα σε σακουλάκια των 50 γραμμαρίων)



Καθαρό Θάρος (Net weight):
150 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ (gr)

KILLER NEO Wheat
BRODIFACOUM (ΒΡΩΔΙΦΑΚΟΥΜΗ) 0.0029%

ΕΤΟΙΜΟΧΡΗΣΤΟ ΔΟΛΩΜΑ ΣΕ ΣΠΟΡΟΥΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ (AB)

Εγγυημένη σύνθεση: Brodifacoum 0.0029% B/B
Βοηθητικές ουσίες 99.9971% B/B.

Περιέχει τον πικραντικό - αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate.
Χρώμα: κόκκινο

Αριθ. Έγκρ. Κυκλοφ. (YAA&T): ΤΠ14-0124 / 21-06-2017

ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ (ΒΙΟΚΤΟΝΟ)

Αντιπικτικό τρωκτικοκτόνο που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των οικιακών ποντικών (*Mus musculus*) και των καφέ αρουραίων (*Rattus norvegicus*) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (γύρω από κτίρια).

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ (ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ)

Η πώλησή του επιτρέπεται από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και από φαρμακεία

Κάτοχος της έγκρισης - Παρασκευαστής σκευάσματος - Εργοστάσιο παρασκευής: ZAPI S.p.A., via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), ITALY
Υπεύθυνος επικοινωνίας & για την τελική συσκευασία και σήμανση: ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ ΑΕ. Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα
Αποκλειστική διάθεση:
ΕΠΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
Θέση Επαρονήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5555220 • Fax: 210 5556100
www.ellagret.gr



H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (στο αίμα) όταν στέρεται από παρατεταμένη ή επανελημμένη έκθεση. P102: Μακριά από παιδιά. P103: Διαβάστε την εικόνα πριν από τη χρήση. P101: Εάν ηπάσητε ιατρική συμβούλη, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος. P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το KENTΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣ ΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Η Βρωδιφακουμίνη (Brodifacoum) είναι ένα αντιπικτικό που ενδεχομένως να προκαλέσει αιμορραγία, η έναρξη της οποίας μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες μετά την έκθεση. Αν δεν υπάρχει ενεργή αιμορραγία, πάντα πρέπει να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες μετά την έκθεση. Αν δεν υπάρχει η αιμορραγία, πάντα πρέπει να κατατερπεθεί ο χρόνος προθρομβίνης (INR) στην εμφάνιση του περιστατικού και σε 48-72 ώρες μετά την έκθεση. Αν ο χρόνος προθρομβίνης (INR) είναι μεγαλύτερος από 4, χορηγήστε 5-10 mg Βιταμίνης K1 (φυτομεναδιόν): μέσω αργής ενδοφλέβης έγχυσης (100 µg/kg συμπατικού δόσης για παιδιά). Ενδεχομένως να χρειαστεί θεραπεία με Βιταμίνη K1 (από το στόμα ή ενδοφλέβως) για αρκετές εβδομάδες.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Βιταμίνη K1 (από ιατρική παρακολούθηση).
ΤΗΛ. KENTΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣ ΑΣΕΩΝ: 210 7793777