

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκυτρώσεις σταγονιδίων/ατμίσεων/αεριοσφαιρών. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Διάθεση περιεχομένου/περιεκτ σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. **Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

Για χρήση στην ύπαιθρο: Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για την αντανόη κατά την ανάμειξη/φόρτωση. Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία και γάντια κατά την εφαρμογή. Για χρήση στο θερμοκήπιο: Φοράτε γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για την αντανόη κατά την ανάμειξη/φόρτωση. Φοράτε διαπέραση ενδυμασία και γάντια κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεξόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, να φοράτε μακρύ παντελόνι, μακριμάνικη μπλούζα και γάντια. Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για την προστασία των υπέργων υδάτων, μην εφαρμόζετε σε ολκακά εδάφη στην καλλιέργεια του αμπελιού. Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να μην εφαρμόζετε σε αργιλλώδη, μη αποστραγγιζόμενα εδάφη για τις καλλιέργειες των βολβωδών λαχανικών, της αγκινάρας και της φράουλας. Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης • 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή μία αμείκαστη ζώνη 20 μέτρων συμπεριλαμβανομένης μιας φυτικής ζώνης ανάσχεσης 10 μέτρων στην καλλιέργεια του αμπελιού • 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες των κολοκυνθοειδών, οστανυδών, βολβωδών λαχανικών, του καρπού της αγκινάρας, του σπαράγγιου, της φράουλας • 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια των χαροχοειδών.

**ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος. Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Διαπρήστε τον ζεστό και ζαχαρώδη. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως το μολυσμένο μέρος του σώματος, συμπεριλαμβανομένης της μασχάλης και τα νύχια, με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν παρατηρήσετε ερεθισμό ή κοκκίνισμα ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό ή ειδικό διάλυμα για τα μάτια, κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα τουλάχιστον για 15 λεπτά. Αν εμφανιστεί οφθαλμικός ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως συμβουλή γιατρού και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα. Εάν ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του ξεπλύνετε του το στόμα με νερό. ΜΗ προκαλέσετε εμετό.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε την αναλυόμενη δόση του σκευάσματος αναδύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση κατά την διάρκεια του ψεκασμού. Ψεκάστε αμέσως μετά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού. Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα στο βυτίο για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους όπως κατά την διάρκεια του διαλείμματος ή της νύχτας.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξφανιστούν πλήρως ο σπρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενα με τρίψιμα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

**Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

**Συνδυαστικότητα:**

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Μπορεί να παρατηρηθεί σε μερικές ποικιλίες αμπελιού ένα ελαφρό, διάχυτο κίτρινασμα των φυλλών που βρίσκονται στο στάδιο της γρήγορης ανάπτυξης. Το σύμπτωμα αυτό, που παρατηρείται και φυσιολογικά είναι καμία φορά πιο έντονο μετά από ψεκασμό με AZOFIN®. Κρατάει λίγες ημέρες (περίπου μία εβδομάδα) και υποχωρεί μετά, χωρίς καμία συνέπεια για το αμπελί. Δεν συντρέχει λόγος για να λαμβάνουν μέτρα να παρουσιαστεί. Το AZOFIN® είναι φυτοτοξικό στις μηλιές. Μην χρησιμοποιείτε το AZOFIN® για εφαρμογές στις μηλιές ή όταν υπάρχει πιθανότητα το ψεκαστικό νερό να φθάσει σε γεωτονική καλλιέργεια μηλιών. Ψεκαστικά μέσα που είχαν χρησιμοσηθεί για εφαρμογές με το AZOFIN®, να ξεπλύνονται με ιδιαίτερη προσοχή πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιών.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτογείας ή περιβαλλοντικής υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** Μην εκκρίνετε όταν το εδάφος είναι παγωμένο ή ξηρό. Να αποφεύγετε την μεταφορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε γεωτονικές καλλιέργειες. Προσοχή κατά την εφαρμογή στην ή διπλή καλλιέργεια είναι μπιλά, δαμασκηνιά, κεράσι.

**Διακρίσεις ανθεκτικότητας:** Το σκεύασμα περιέχει azoxystrobin, ένα μυκητοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 11 κατά FRAC. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 2-3 ανά καλλιεργητική περίοδο ανάλογα με τις καλλιέργειες. Για το μύκητα *Uncinula necator* επιτρέπονται έως δύο διαδοχικές εφαρμογές με το AZOFIN®. Για το μύκητα *Plasmopara viticola* επιτρέπεται μία εφαρμογή με το AZOFIN® ανά τρεις εφαρμογές. Εφαρμογή στο AZOFIN® σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτή των στρομπιλουρινών (Qals) με τα οποία δεν εμφανίζεται διασπομή ανθεκτικότητας. Εφαρμογή στο AZOFIN® προληπτικά και σε πρώιμο στάδιο της ασθένειας, αποφεύγει τις θεραπευτικές εφαρμογές.

**Χρονική διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογών και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στην ψεκασθείσα φυλλική επιφάνεια. Έως ότου παρέλθουν 2 ημέρες από την εφαρμογή, για την καλλιέργεια του αμπελιού.

**Τελείαση επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Αμπέλι: 21 ημέρες [Σκόρδο, Κρεμμύδι (Ξηρό), Καρότο (Υ), 14 ημέρες | Αγκινάρα: 7 ημέρες, Κολοκυθάκι (Υ/Θ), Αγγούρι (Υ/Θ), Πεπόνι (Υ/Θ), Καπνός (Υ/Θ), Πιπεριά (Υ/Θ), Τομάτα (Θ), Φράουλα (Υ), Μελίτζανα (Θ): 3 ημέρες | Σπαράγγι: Μη εφαρμοσμένο | Χαροχοειδή: 30 ημέρες.

**HMER. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Prod. Date) } ΒΛΕΠΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**  
**ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ (Batch No)**



# AZOFIN®

## 250 SC

Azoxystrobin (Αζοξυστρομπιν)  
ομάδα Στρομπιλουρινών

Πυκνό εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: azoxystrobin 25% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 76,45 % β/β

## ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις  
Περιέχει 1,2-benzothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60976/29.07.2020

**FINCHIMICA**  
TRUST IN AGROSCIENCE



Υπευθύνος για την τελική διάθεση  
στην αγορά-Διανομή-Συσκευασία:

**ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**

Θέση Επικοινωνίας, 19600 Μάνδρα Αττικής,  
Τηλ.: 2105550431  
email: ellagret@ellagret.gr  
www.ellagret.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση. Η δ.δ. azoxystrobin ανήκει στην ομάδα των στρομπιλουρινών και δρα παρεμποδίζοντας τη διασπορά των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων, ελέγχοντας έτσι ένα μεγάλο εύρος μυκήτων. Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο σύμπλοκο III της αναπνευστικής αλυσίδας.

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:** Πεδίο Εφαρμογής - Στόχοι - Αδασές Σκευάσματος - Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής: ΑΜΠΕΛΙ (επιτρέπεται και οινοποίησης): Για **οίδιο** (*Uncinula necator*) και **Περωνόσπορο** (*Plasmopara viticola*), Δόση 75 κ.εκ./στρέμμα<sup>3</sup> [65-150 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού]<sup>3</sup>, για μικρό έως μέτριο κίνδυνο προσβολής ή 100 κ.εκ./ στρέμμα<sup>3</sup> [85-200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού]<sup>3</sup>, για υψηλό κίνδυνο προσβολής (βλ. σημειώσεις 2.3). Όγκος ψεκ. υγρού 50-120 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος από την εμφάνιση του τρίτου φύλλου έως την έναρξη της ωρίμανσης (οι καρποί αρχίζουν να αποκτούν το τυπικό χρώμα της ποικιλίας τους) [BBCH 13-81].

**ΑΓΚΙΝΑΡΑ:** Για **οίδιο** (*Leveillula taurica*), Δόση 80 κ.εκ./ στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 50-125 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 5<sup>ου</sup> φύλλου έως την εμφάνιση της ανθοστάσης (κεφαλές) [BBCH 15-55].

**ΣΠΑΡΑΓΓΙ:** Για **Σκωρίωση** (*Puccinia asparagi*) και **Στεμφύλιο** (*Stemphylium* sp.) Δόση 80 κ.εκ./ στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 30-100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος όταν σταματήσει να αναπτύσσεται ο μακρύτερος βλαστός έως το τέλος της ανάπτυξης των καρπών [BBCH 41-89].

**ΠΙΠΕΡΙΑ (Υ+Θ):** Για **οίδιο** (*Leveillula taurica*, *Oidium* sp.), Δόση 80 κ.εκ./ στρέμμα [80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού], Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6<sup>ου</sup> φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών [BBCH 16-89].

**ΤΟΜΑΤΑ (Θ), ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ\*(Θ) (ΧΗΣ):** Για **οίδιο** (*Leveillula Taurica*, *Oidium* sp.), Δόση 80 κ.εκ./στρέμμα [80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού], Όγκος ψεκ. υγρού 40-100 λίτρα/στρέμμα. Για **Αλτερνάρια** (*Alternaria solani*) και **Περωνόσπορο** (*Phytophthora infestans*), Δόση 100 κ.εκ./στρέμμα [80-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού], Όγκος ψεκ. υγρού 40-100 λίτρα/στρέμμα. | Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6<sup>ου</sup> φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών [BBCH 16-89].

**ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ (Υ+Θ):** Για **οίδιο** (*Sphaerotheca fuliginea*), Δόση 80 κ.εκ./στρέμμα [60-80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού], Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6<sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών [BBCH 16-89].

**ΑΓΓΟΥΡΙ (Υ+Θ):** Για **οίδιο** (*Erysiphe cichoseae*, *Sphaerotheca fuliginea*), Δόση 80 κ.εκ./στρέμμα [60-80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού], Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. Για **Περωνόσπορο** (*Pseudoperonospora cubensis*), Δόση 100 κ.εκ./στρέμμα [80-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού], Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. | Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6<sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών [BBCH 16-89].

**ΠΕΠΟΝΙ (Υ+Θ):** Για **οίδιο** (*Erysiphe cichoseae*, *Sphaerotheca fuliginea*), Δόση 80 κ.εκ./στρέμμα [60-80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού], Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. Για **Περωνόσπορο** (*Pseudoperonospora cubensis*), Δόση 100 κ.εκ./στρέμμα [80-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού], Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. | Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6<sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών [BBCH 16-89].

**ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Υ+Θ):** Για **οίδιο** (*Erysiphe cichoseae*), Δόση 80 κ.εκ./στρέμμα [80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού], Όγκος ψεκ. υγρού 50-120 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6<sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών [BBCH 16-89].

**ΣΚΟΡΔΟ:** Για **Σκωρίωση** (*Puccinia allii*), Δόση 80 κ.εκ./ στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 20-50 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 4<sup>ου</sup> φύλλου έως το στάδιο όπου τα φύλλα του 50% των φυτών έχουν ηλιασθεί [BBCH 14-48].

**ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΞΗΡΟ:** Για **Περωνόσπορο** (*Peronospora destructor*), Δόση 80 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 20-50 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 4<sup>ου</sup> φύλλου έως το στάδιο όπου τα φύλλα του 50% των φυτών έχουν ηλιασθεί [BBCH 14-48].

**ΦΡΑΟΥΛΑ (Υ):** Για **οίδιο** (*Podosphaera macularis*), Δόση 80 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 50-80 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος από την εμφάνιση των πρώτων ταξάνιδων έως τη δεύτερη συγκομιδή που οι περισσότεροι καρποί έχουν λάβει το τυπικό χρώμα [BBCH 51-89].

**ΚΑΡΟΤΟ (Υ):** Για **οίδιο** (*Erysiphe* sp.) και **Αλτερνάρια** (*Alternaria dauci*), Δόση 80-100 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από την εμφάνιση του 6<sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου έως ότου η ρίζα φθάσει στο τυπικό της μέγεθος [BBCH 16-49].

**ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΛΑ:** Για **Κερκόσπορο** (*Cercospora beticola*) και **οίδιο** (*Erysiphe communis*), Δόση 40-80 κ.εκ./στρέμμα [100-200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού], Όγκος ψεκ. υγρού 40 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος από την πλήρη ανάπτυξη του φυλλώματος έως ότου η ρίζα λάβει το τελικό της μέγεθος [BBCH 39-49].

Υ: Υπαιθρο, Θ: Θερμοκήπιο.

**Παρατηρήσεις:**

1. Εφαρμογή στην υψηλότερη δόση σε μεγαλύτερη πίεση προσβολής.  
2. Όταν ο κίνδυνος προσβολής είναι μικρός έως μέτριος να χρησιμοποιείται η χαμηλή δόση ανά στρέμμα [75 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα] ενώ όταν είναι υψηλός να χρησιμοποιείται η υψηλή δόση ανά στρέμμα [100 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα].

3. Η υψηλή δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται με το μεγαλύτερο όγκο ψεκαστικού υγρού και η χαμηλή δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται με το μεγαλύτερο όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα [100 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα].

\* **ΧΗΣ: Χρήση Ήσσονος Σημείας:** Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στη καλλιέργεια της μελιτζάνας από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στη καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές απουσίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο | Μεσοδιάστημα εφαρμογών:**  
ΑΜΠΕΛΙ, ΑΓΚΙΝΑΡΑ, ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ (Υ+Θ), ΑΓΓΟΥΡΙ (Υ+Θ), ΠΕΠΟΝΙ (Υ+Θ), ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Υ+Θ): 3 | 10 ημέρες.  
ΣΠΑΡΑΓΓΙ: 2 | 10 ημέρες, ΠΙΠΕΡΙΑ (Υ+Θ): 2 | 7 ημέρες, ΤΟΜΑΤΑ (Υ), ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ\*(Θ), ΣΚΟΡΔΟ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΞΗΡΟ, ΦΡΑΟΥΛΑ (Υ), ΚΑΡΟΤΟ (Υ): 3 | 7 ημέρες, ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΛΑ: 2 | 21 ημέρες.