

CONTROL GR

lambda-cyhalothrin
(λάμδα-σιαλοθρίν)
Κοκκώδες (GR)

Εγγυημένη σύνθεση: lambda-cyhalothrin 0.4 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: μέχρι 99.59 % β/β

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο,
ευρέως φάσματος, δρα δι' επαφής και
δια στομάχου με προληπτική και
κατασταλτική δράση, για τον έλεγχο
μυζητικών και μασητικών εντόμων
σε διάφορες καλλιέργειες.



Κάτοχος της άδειας:
SIPCAM OXON S.p.A.
Via Sempione, 195,
20016 Pero (MI), Ιταλία

Υπεύθυνος για την τελική
διάθεση στην αγορά:
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32,
Τ.Κ. 19400 Κορωπί
Τηλ.: 210 5223 834
Fax: 210 5223 139
E-mail: info@sipcam.gr



ΠΡΟΣΟΧΗ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14768/05.02.2021



Διανομή-Συσκευασία:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431 • E-mail: ellagret@ellagret.gr
www.ellagret.gr

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Φοράτε ολοσωμ φάρμα εργασίας και κατάλληλα γάντια κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτισης και κατάλληλα γάντια κατά την εφαρμογή του σκευάσματος. Να εφαρμόζεται μόνο με τρακτέρ.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Γενικές πληροφορίες:
Απομακρύνετε αμέσως τα ενδύματα που μολύνθηκαν με το προϊόν.
Ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή σε καθαρό αέρα. Εάν απαιτείται, παρέχετε τεχνητή αναπνοή. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν τα συμπτώματα επιμένουν. Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων βάλτε τον ασθενή σε σταθερή πλάγια θέση για τη μεταφορά.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε καλά με νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό διατηρώντας ανοικτά τα βλέφαρα για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Εάν τα συμπτώματα επιμένουν συμβουλευτείτε γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Περιέχει νάφθα (αρωματικό διαλύτης πετρελαίου).

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία lambda-cyhalothrin, ένα εντομοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 3Α κατά IRAC.

- Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.

- Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς.

- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κατανομή του στο έδαφος στα σημεία εφαρμογής του.

- Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με το σκεύασμα. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις πυρεθρίνες.

- Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών / στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

- Να μην εφαρμόζεται όταν φυσάει.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.



ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Prod. Date)
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ (Batch No)

ΒΛΕΠΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ

Τρόπος δράσης: Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na⁺ στους νευράζοντες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.
Τρόπος εφαρμογής: Αν' ευθείας εφαρμογή στο έδαφος.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ, ΣΟΡΓΟ, ΚΕΧΡΙ: α) **Αγρότιδες** (Καραφατμέ, Κοφτοσκοούλκα), Μπλολόνθη, Σιδηροσκοούλκα: 1.0-1.5 Χλμ/στρ. Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς.

β) **Προνύμφες Διαβρώτικα:** 1.2-1.5 Χλμ/στρ. Στα 5-8 φύλλα κατά το αυλάκωμα κατά μήκος των σειρών.

ΓΛΥΚΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΒΑΜΒΑΚΙ, ΗΛΙΑΘΟΣ, ΚΑΡΟΤΟ, ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟ, ΣΠΟΡΟΙ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ, ΣΠΟΡΟΙ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ, ΣΟΓΙΑ: **Αγρότιδες** (Καραφατμέ, Κοφτοσκοούλκα), Μπλολόνθη, Σιδηροσκοούλκα, **Προνύμφες Διαβρώτικα:** 1.0-1.5 Χλμ/στρ. Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς.

ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΚΑΠΝΟΣ, ΚΑΛΛΟΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ: **Αγρότιδες** (Καραφατμέ, Κοφτοσκοούλκα), Μπλολόνθη, Σιδηροσκοούλκα, **Προνύμφες Διαβρώτικα:** 1.0-1.5 Χλμ/στρ. Κατά τη φύτευση στο βάθος φύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης.

ΠΑΤΑΤΑ: **Αγρότιδες** (Καραφατμέ, Κοφτοσκοούλκα), Μπλολόνθη, Σιδηροσκοούλκα, **Προνύμφες Διαβρώτικα:** 1.0-1.5 Χλμ/στρ. α) Κατά τη φύτευση στο βάθος φύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης. β) Στα 4-6 φύλλα κατά το αυλάκωμα/παράκωμα.

ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΗ, ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ΜΑΡΟΥΛΙΑ & ΣΑΛΑΤΙΚΑ (Μαρούλια, Ρόκα, Λυκοτρίβολο, Σκαρόλες/Αντίδια, Κάρδαμο, Γαιοκάρδαμο, Κόκκινο σινάπι, Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης), ΣΠΑΝΑΚΙ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ (Σπανάκι, Ανδράκλα, Σέσκουλα/Φύλλα τεύτλων (Υ), ΑΝΘΟΚΡΑΜΒΕΣ (Μπρόκολα, Κουνουπίδια), ΚΕΦΑΛΟΤΕΣ ΚΡΑΜΒΕΣ (Λαχανάκια Βρυξελλών, Λάχανα): **Αγρότιδες** (Καραφατμέ, Κοφτοσκοούλκα), Μπλολόνθη, Σιδηροσκοούλκα, **Προνύμφες Διαβρώτικα:** 1.0-1.5 Χλμ/στρ. Κατά την μεταφύτευση στο βάθος μεταφύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης.

ΦΥΤΩΡΙΑ ΟΠΙΟΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΡΑ ΔΕΝΔΡΑ: **Αγρότιδες** (Καραφατμέ, Κοφτοσκοούλκα), Μπλολόνθη, Σιδηροσκοούλκα, **Προνύμφες Διαβρώτικα:** 1.0-1.5 Χλμ/στρ. Κατά τη φύτευση στο βάθος φύτευσης.

Από τις ανωτέρω στις ετήσιες καλλιέργειες όταν αυτές προορίζονται για σποροπαραγωγή: Η δοσολογία και η χρήση όπως αναφέρεται για την κάθε ετήσια καλλιέργεια ανωτέρω.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Αραβόσιτος, Σόργο, Κεχρί, Γλυκό Καλαμπόκι: 2 εφαρμογές ανά 45 ημέρες, Πατάτα: 2 εφαρμογές ανά 30 ημέρες, Λοιπές καλλιέργειες: 1 εφαρμογή.

Τελειώσα επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Για όλες τις καλλιέργειες του φάσματος δράσης: μη εφαρμοσίμο.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας (σάκουλες, σακίδια) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Το κενό υλικό συσκευασίας δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

Συνδυαστικότητα: —

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του καλά κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

5 Kg