

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

•Μην τρώτε, πίνετε ή καννίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτική ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. •Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενου αμέσως μετά τον ψεκασμό, να φοράτε βαμβακερό μακρύ παντελόνι, κερκιδωμένο ποκάμισο και κάλτσες. •Απόθετε τον περιεχόμενο/ περίεκτη σύμφωνα με την ενδεικτική μαρκαρίωση.

ΠΡΑΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΑ

Σε περίπτωση απώλειας ζωτικής μείωσης ισχυρίσασθε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε από το δοχείο, το Δελτίο Δοσολογίας Ασφάλειας ή την ετικέτα. Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης, Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης, Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Μετά την επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με καθαρό νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα ρούχα πριν την ξαφροδότηση. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, Επιπλέοντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φρονιές επαφής, εφαρμόστε τους, εκτός εάν είναι ειδικά. Συστάεται να ξεπλύνετε. Εάν δεν υπάρχει ο οφθαλμικός ερεθισμός, Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση εισπνοής, Σε περίπτωση απώλειας λόγω εισπνοής απομακρυνθείτε το δωμάτιο σε καθαρό αέρα και αφήστε το να ψεφισθεί. Εφαρμόστε τεχνική αναπνοής εάν παρουσιαστεί δυσκολία κατά την αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό. Ανάδοχο. Συμμετοχική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τα συσκευασία του.

Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών, να αφήνετε αμείκτα ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων σε καλλιέργειες πυρηνόκαρπων.

Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

Φυτοτοξικότητα. Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Για τις χρήσεις στα ανθοκομικά φυτά σε περίπτωση ποικίλων ελαστικά διαδομένων ή πρόσφατα αποξημαμένων στη χώρα, να κάνει δοκιμές μικρής έκτασης πριν επεκτείνετε την εφαρμογή σε ευρεία κλίμακα.

Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτογείας ή περιβαλλοντικής υπό τις οποίες το σκευασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκαταστεί: Το σκευασμα περιέχει την δραστική ουσία penconazole η οποία ανήκει στην ομάδα 3 κατά FRAC. *Στο αμύγδαλο και στο μηλίτιδο η εφαρμογή του πρέπει να αναβάλλεται με μικροκλίμα διαφορετικό τρόπο δράσης και οι επεμβάσεις με το σκευασμα να μην ξεκινούν τις τρεις (3) από καλλιεργητικό περιόδο, στις υπόλοιπες καλλιέργειες (πυρηνόκαρπα, φρούλα, ακνίδια, πιπεριά, τομάτα, μελιτζάνα και καλλωπιστικά) οι επεμβάσεις με το σκευασμα να μην ξεκινούν τις δύο (2) από καλλιεργητικό περιόδο. *Για την αποφυγή ανεπιθύων ανεπιθύων, να μην ξεκινούν οι ψεκασμοί με μικροκλίμα DMts το 50% του συνολικού επιπέδου. *Στις περιπτώσεις πολύ υψηλών προδοχών ή σε πολύ καθυστερημένες θεραπευτικές εφαρμογές, να εφαρμόζονται αναλυτικές μικροκλίμα διαφορετικών ομοιών ή μείγματα μικροκλίμα με διαφορετικό τρόπο δράσης. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσδεσης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στις οποίες εφαρμόζεται το σκευασμα:** Η είσοδος επιτρέπεται όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό διάλυμα στις φυτικές επιφάνειες των καλλιεργειών. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Μήλα, Αχλάδια, Κιούδια, Βερκοκία, Ροδακίνα, Νεκταρίνα, Αγκινάρα, Αμύγδα επιπέδου, Καπνός, Λάχανο, Αμύγδα επιπέδου, 21 ημέρες. Φρούλας, Αγούρι, Κολοκύνθη, Κολοκύθα, Πεπόνι, Κολοκύθα, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Σπύροδο, Βατόμουρο, 3 ημέρες. Ανθοκομικά, δεν ορίζεται.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλομίσθου.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού / διαλύματος εφαρμογής: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση, προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευασματός αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδέουση. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Το κενό μέγα συσκευασίας (φιάλη, φιάλες) ξεπλύνετε υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται φυλάκιό ξεπλύνετε τα νερά του ξεπλύνματος το ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό και αφού καταγραφούν προηγουμένως με τριτύμια και τα κολλάει με οκία για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποθιθέντα όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: ---
Χρονική στερότητα του σκευασματός - Συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσρό, ξηρό και καλά αερισμένο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ALANDIN 100EC

Penconazole (χημική ουσία) 100EC
Γαλλοκαταπολιμη υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση:
Penconazole 10% B/0
Βοηθητικές ουσίες 89.36% B/0

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του αμύγδαλο σε μηλίτιδο, πυρηνόκαρπα, αμύγδαλο, λαχανικά, καρνά, ανθοκομικά και άλλες καλλιέργειες.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προσρίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Υπάρχει να προκαλέσει βλάβες στο έμβρυο. * Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνια επιπτώσεις.



Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 61033/ 26.04.2021
ΥΠ. Ρ900-R0XT-600P-GG10
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: Syngenta Hellas Μονοπροσώπων ΑΕΒΕ, Α. Ανθούσης,
Ανθούση Αττικής 49, Τηλ.: 210 666412-13 • www.syngenta.gr
0ΕΤ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796949-3



Διανομέας:
ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
Θέση Εμπροσθοδού, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431 • Email: ellagret@ellagret.gr
www.ellagret.gr

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ
400 κ.εκ.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ.
Μήλα, Αχλάδια, Κιούδια. Για *Diobla (Podospheara leucotricha)* 25-50 κ.εκ. σκευασμα/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευασμα/στρέμμα [max]. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-140 λίτρα/στρέμμα. ΒΒCH 71-78. Από το στάδιο οραματισμένων καρπών διαμέτρου 10mm έως το στάδιο καρπών με διάμετρο 80% του τελικού μεγέθους. ** Δοση σκευασματός 0,25 κ.η/λ. LWA. Έως 3 εφαρμογές με 12-14 ημέρες μεσοδιάστη. **Ροδακίνα, Νεκταρίνα, Βερκοκία:** Για *Diobla (Podospheara radicata)*, *Podospheara panosa*, *Sphaerotheca panosa* 35-50 κ.εκ. σκευασμα/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 75 κ.εκ. σκευασμα/στρέμμα [max]. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80-150 λίτρα/στρέμμα. ΒΒCH 71-89. Από το στάδιο του οραματισμού στα σταφύλια έως το στάδιο ωριμότητας των καρπών. Έως 2 εφαρμογές με 12-14 ημέρες μεσοδιάστη. **Αμύγδαλο:** Για *Diobla (Erysiphe necator)* 30 κ.εκ. σκευασμα/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30 κ.εκ. σκευασμα/στρέμμα [max]. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. ΒΒCH 51-81. Από την έναρξη της επιμήκυνσης του σπυρίου σπυρίου έως το κλίμακα του πάνω μέρους του 10-20% των ανθοκομικών (μετά το στάδιο της συγκομιδής για νωπά καταπολιμη). Έως 2 εφαρμογές με 10-12 ημέρες μεσοδιάστη. **Φρούλα:** Για *Diobla (Podospheara aphanis)* 50 κ.εκ. σκευασμα/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευασμα/στρέμμα [max]. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. ΒΒCH 41-89. Έναρξη ανάπτυξης σταλόων (οριζοτί, περίπου 2cm) έως τη συγκομιδή που οι περισσότεροι καρποί έχουν χρωματιστεί. Έως 2 εφαρμογές με 10-14 ημέρες μεσοδιάστη. **Αγούρι, Καρπούζι, Πεπόνι, Κολοκύθα (εργού - Βερκοκίτη):** Για *Diobla (Sphaerotheca fuliginea)*, *Erysiphe cichoracearum* 35-50 κ.εκ. σκευασμα/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευασμα/στρέμμα [max]. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-120 λίτρα/στρέμμα. ΒΒCH 51-89. Από την εμφάνιση των πρώτων θηλυκών ανθέων στο κύριο βλαστό έως την πλήρη ωριμότητα των καρπών. Έως 2 εφαρμογές με 10-14 ημέρες μεσοδιάστη. **Κολοκύθα (εργού - Βερκοκίτη):** Για *Diobla (Sphaerotheca fuliginea)*, *Erysiphe cichoracearum* 35-50 κ.εκ. σκευασμα/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευασμα/στρέμμα [max]. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-120 λίτρα/στρέμμα. ΒΒCH 51-79. Από την εμφάνιση των πρώτων θηλυκών ανθέων στο κύριο βλαστό έως την πλήρη ωριμότητα των καρπών. Έως 2 εφαρμογές με 10-14 ημέρες μεσοδιάστη. **Πιπεριά (Αγούρι, Βερκοκίτη):** Για *Diobla (Levellilla taurica)* 35-50 κ.εκ. σκευασμα/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευασμα/στρέμμα [max]. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. ΒΒCH 55-89. Από την εμφάνιση του κλειστού άνθους έως το στάδιο της τυπικής πλήρους ωριμότητας των καρπών. Έως 2 εφαρμογές με 10-12 ημέρες μεσοδιάστη. **Μελιτζάνα (Αγούρι - Βερκοκίτη):** Για *Diobla (Levellilla taurica)* 35-50 κ.εκ. σκευασμα/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευασμα/στρέμμα [max]. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. ΒΒCH 51-89. Από την εμφάνιση του κλειστού άνθους έως το στάδιο της τυπικής πλήρους ωριμότητας των καρπών. Έως 2 εφαρμογές με 10-12 ημέρες μεσοδιάστη. **Τομάτο (Αγούρι - Βερκοκίτη):** Για *Diobla (Levellilla taurica)* 35-50 κ.εκ. σκευασμα/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευασμα/στρέμμα [max]. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. ΒΒCH 21-89. Από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως το στάδιο της τυπικής πλήρους ωριμότητας των καρπών. Έως 2 εφαρμογές με 10-12 ημέρες μεσοδιάστη. **Καπνός (Αγούρι - Βερκοκίτη):** Για *Diobla (Erysiphe cichoracearum)* 35-50 κ.εκ. σκευασμα/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευασμα/στρέμμα [max]. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-100 λίτρα/στρέμμα. ΒΒCH 20-99. Έως 2 εφαρμογές με 10-14 ημέρες μεσοδιάστη. **Ανθοκομικά (Αγούρι, Βερκοκίτη):** Τριαντάφυλλο για *Sphaerotheca panosa*, *Phragmidium sp.* Μηλίτιδο για *Erysiphe sp.* Νότιο για *Sphaerotheca panosa*, *Phragmidium sp.* **Κιούδια:** Για *Diobla (Erysiphe cichoracearum)* 35-50 κ.εκ. σκευασμα/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ. σκευασμα/στρέμμα [max]. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. ΒΒCH 13-89. Με την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού (εργού) σπυρίου. Έως 2 εφαρμογές με 7-12 ημέρες μεσοδιάστη. **Παπαρτσής:** ** ΗΑ LWA: 10.000 ml έκταση επιφανείας κομής. *Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που προορίζονται για μεταποίηση (τομάτα, φρούλα).

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Prod. Date) | ΒΛΕΠΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΑΣ (Batch No)

