sivar gold®

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- **Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

- **Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.**
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή στον αγρό.
- Φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμειξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή στο θερμοκήπιο.
- Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια.
- Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)
- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να μην εφαρμόζετε σε αποστραγγιζόμενα εδάφη σε καλλιέργεια πατάτας και αμπελιού.
- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα: - μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων για την καλλιέργεια τομάτας, μελιτζάνας, πατάτας και αμπελιού (πρώιμη/όψιμη και όψιμη/όψιμη εφαρμογή) - μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια της ροδακινιάς.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν μολυνθεί και πλύνετέ τα πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά. Πλύνετε το δέρμα και τα σημεία που έχουν μολυνθεί με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν είναι απαραίτητο εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777
UFI: 7R40-R07V-T00P-6646

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΙΩΡΗΜΑ (SC)

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

μείγμα δύο δραστικών ουσιών (potassium phosphonates + azoxystrobin) με προληπτική και διασυστηματική δράση.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

POTASSIUM PHOSPHONATES 25,5% β/ο

AZOXYSTROBIN 6,25% β/ο

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 36,4% β/β

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΥπΑΑΤ): 61049 / 22-11-2021

Περιεχόμενο (Content): 1 ΛΙΤΡΟ (LT)

Κάτοχος της έγκρισης-Παρασκευαστής σκευάσματος:
LAINCO S.A., Polígono Industrial Can Jardí, Avda. de Bizet, 8-12, 08191 Rubí, Barcelona, SPAIN (Ισπανία).
www.lainco.es

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ ΑΕ, Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα

Διανομή: ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431
Email: ellagret@ellagret.gr
www.ellagret.gr

Ημερομηνία Παραγωγής (Prod. Date): Βλέπε συσκευασία (see pack)

Αριθμός Παρτίδας (Lot No.): Βλέπε συσκευασία (see pack)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Μυκητοκτόνο μείγμα δύο δραστικών ουσιών (δ.ο.) (potassium phosphonates + azoxystrobin) με προληπτική και διασυστηματική δράση. Η δ.ο. potassium phosphonates δρα σε πολλαπλές θέσεις. Επιβραδύνει την ανάπτυξη των παθογόνων, παρεμποδίζει την παραγωγή σπορίων και αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό του μύκητα ενισχύοντας τη φυσική άμυνα των φυτών. Η δ.ο. azoxystrobin είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο με μερική διελασματική δράση που παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων, ελέγχοντας ένα μεγάλο εύρος μυκήτων.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Γενική δόση (όλες οι καλλιέργειες): 300 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (300 κ.εκ./στρ.) με όγκο ψεκ. υγρού 30-100 λίτρα/στρ.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

για **Σήψη Λαιμού (*Phytophthora* sp.)** με 1η εφαρμογή το φθινόπωρο από την πλήρη ανάπτυξη των βλαστών με πράσινο φύλλωμα έως την έναρξη αποχρωματισμού των φύλλων (BBCH 91-92), 2η εφαρμογή την άνοιξη από την έναρξη έως το τέλος της άνθησης (BBCH 60-69) και 3η εφαρμογή το καλοκαίρι από την καρπόδεση έως την έναρξη του χρωματισμού των καρπών (πριν τη συγκομιδή μέχρι το PHI (τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή)) (BBCH 70-81). Μέχρι 3 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο.

ΑΜΠΕΛΙ (οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες σταφυλιών):

για **Περονόσπορο (*Plasmopara viticola*)** με 1 εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο από την πλήρη εμφάνιση των ταξιανθιών (BBCH 53).

ΤΟΜΑΤΑ-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου):

για **Περονόσπορο (*Plasmopara viticola*)** με εφαρμογές από την εμφάνιση του 1ου πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 11-89). Μέχρι 3 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημέρες.

ΠΑΤΑΤΑ:

για **Περονόσπορο (*Plasmopara viticola*)** με εφαρμογές από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως την έναρξη του κιτρινίσματος των φύλλων (BBCH 11-91). Μέχρι 3 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημέρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο υπό ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -- ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Να μην συνδυάζεται με διαφυλλικά λιπάσματα τα οποία περιέχουν άζωτο (νιτρικό και αμμωνιακό) ή με ελαιούχα σκευάσματα.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

- Το σκεύασμα περιέχει τα μυκητοκτόνα potassium phosphonates που ανήκει στην ομάδα P07 κατά FRAC και azoxystrobin που ανήκει στην ομάδα 11 κατά FRAC.
- Να εφαρμόζονται μυκητοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Ροδακινιά, Αμπέλι, Πατάτα: 15 ημέρες, Τομάτα (υπαίθρου & θερμοκηπίου), Μελιτζάνα (υπαίθρου & θερμοκηπίου): 0 ημέρες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.