ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Βιομηχανία - Εμπόριο
Προϊόντων Φυτοπροστασίας και Αγροεφοδίων

Τεχνικές Πληροφορίες Προϊόντων
2022

Έκδοση 2/2022, Μάρτιος, 2022
ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
Θέση Ξηροπήγαδο, Μάνδρα Αττικής, Τ.Θ.58, Τ.Κ. 196 00
Τ: 210 5550431, 210 5559001-2 | F: 210 5556100
W: www.ellagret.gr | Email: ellagret@ellagret.gr

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Βιομηχανία - Εμπόριο
Προϊόντων Φυτοπροστασίας και Αγροεφοδίων

Τεχνικές Πληροφορίες Προϊόντων

(Εκδ. 2/2022, Μάρτιος, 2022)

Σημείωση
Έχει καταβληθεί κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί ότι οι τεχνικές πληροφορίες (φάσμα δράσης, PHI, αριθμός εφαρμογών, κτλ.) που αναφέρονται στο παρόν τεχνικό εγχειρίδιο, είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες έως και την ημερομηνία έκδοσή του. Θα πρέπει να επισημανθεί, ωστόσο, ότι οι πληροφορίες αυτές, έχουν ενημερωτικό και μόνο χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση/ χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. Η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τυχόν απαιτήσεις ή απώλειες που προκύπτουν από το γεγονός ότι κάποιος στηρίχθηκε αποκλειστικά και μόνο στο περιεχόμενο του παρόντος. Πριν από τη χρήση του κάθε προϊόντος, συμβουλευτείτε την ετικέτα του.

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Ομαδοποίηση Καλλιεργειών

Για τους σκοπούς του παρόντος, ακολουθείται η παρακάτω ομαδοποίηση των καλλιεργειών:

Ομάδα	Είδη
ΑΚΡΟΔΡΥΑ:	Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Καστανιά, Φιστικιά, Φουντουκιά
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ:	Αρώνια, Βασιλικός, Γιασεμί, Γλυκάνισος, Δάφνη, Δενδρολίβανο, Δίκταμο, Δυόσμος, Θυμάρι, Κάππαρη, Κορίανδρος, Κρόκος, Κύμινο, Λεβάντα, Μαντζουράνα, Μάραθος, Μελισσόχορτο, Μέντα, Ρίγανη, Σάλβια, Τριανταφυλλιά (για αρωματοποιία), Τσάι βουνού, Ύσσωπος, Φασκόμηλο, Χαμομήλι.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ:	Βαμβάκι, Ελαιοκράμβη, Ζαχαρότευτλα, Ηλίανθος, Καπνός, Λινάρι, Σόγια
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:	Γκρέιπφρουτ, Γλυκό Λάιμ, Κιτριά, Κλημεντίνη, Κουμκουάτ, Λάιμ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Νεραντζιά, Περγαμόντο, Πορτοκαλιά, Φράπα
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ/ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ:	Αγγελική, Αλθέα, Γαρυφαλλιά, Γλαδιόλος, Καλεντούλα, Κυκλάμινο, Μπιγκόνια, Ντάλια, Πελαργόνιο, Ποτεντίλα, Τουλίπα, Τριανταφυλλιά, Χρυσάνθεμο, Japanese spindle tree
ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΙ ΘΑΜΝΟΙ:	Βατόμουρα, Μύρτιλλα, Σμέουρα
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ:	Αγγούρι, Κολοκύθι, Κολοκύθα, Καρπούζι, Πεπόνι
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ:	Μηδική, Κτηνοτροφικά τεύτλα, Τριφύλλι
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:	Αγκινάρα, Άνηθος, Αντίδι, Αντράκλα, Ασκαλώνιο, Γογγύλι, Γουλί, Γαιοκάρδαμο, Καρότο, Κεφαλωτές Κράμβες, Κόκκινο σινάπι, Κουνουπίδι, Κρεμμύδι, Λαγόχορτο, Λαχανίδες, Λάχανο, Λυκοτρίβολο, Μαϊντανός, Μαρούλι, Μπάμια, Μπρόκολο, Παντζάρι, Παστινάκι, Πράσο, Ραδίκι, Ραπάνι, Ρέβα, Ρόκα, Σέλερι, Σέλινο, Σελινόριζα (ραπανοσέλινο), Σέσκουλο, Σινάπι, Σκαρόλα, Σκόρδο, Σπανάκι, Σπαράγγι, Χρένο
ΜΗΛΟΕΙΔΗ:	Αχλαδιά, Αχλαδομηλιά, Κυδωνιά, Μηλιά, Μουσμουλιά
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:	Βερικοκιά, Βυσσινιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Κορομηλιά, Ροδακινιά
ΣΙΤΗΡΑ:	Αραβόσιτος, Γλυκό καλαμπόκι, Βρώμη, Κεχρί, Κριθάρι, Όλυρα (*Triticum spelta*), Ρύζι, Σίκαλη, Σιτάρι, Σόργο, Τριτικάλε
ΣΟΛΑΝΩΔΗ:	Μελιτζάνα, Πατάτα, Πιπεριά, Τομάτα
ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ ΦΥΤΑ:	Αβοκάντο, Λωτός, Μάνγκο, Παπάγια
ΨΥΧΑΝΘΗ:	Αρακάς, Αραχίδα, Κουκιά, Λούπινο, Μπιζέλι, Ρεβίθι, Φασόλι, Φακή

Παραπομπές Πινάκων / Συντομογραφίες / Επεξηγήσεις:

(α) **Θ:**	Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, **Υ:** Υπαίθρια Καλλιέργεια
(β) **MAE|ME:**	Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) | Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)
(γ) **PHI:**	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σε ημέρες)
(δ) **M/E:**	Μη εφαρμόσιμο
(ε) **ΔΟ:**	Το PHI δεν ορίζεται (λόγω του χρόνου εφαρμογής)
ΧΗΣ:	**Χρήση Ήσσονος Σημασίας:** Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες για τις οποίες έχει χορηγηθεί χρήση ήσσονος σημασίας, καθώς και η αποτελεσματικότητα κατά των εχθρών/ασθενειών ήσσονος σημασίας. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή/και τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.
BIO	Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 834/2007 (ΕΕ L 189) και 889/2008 (ΕΕ L 250), όπως κάθε φορά ισχύουν.

Μορφές Σκευασμάτων

AB	Ετοιμόχρηστο δόλωμα με κόκκους σιτηρών	Grain Bait
BAIT	Δόλωμα	Bait
CS	Μικροκάψουλες σε Εναιώρημα	Capsule Suspension
DP	Σκόνη Επίπασης	Dustable Powder
EC	Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο	Emulsifiable Concentrate
EW	Γαλάκτωμα της μορφής λάδι σε νερό	Emulsion in Water
GB	Κοκκώδες Δόλωμα	Granule Bait
GE	Δισκία (καπνογόνο)	Gas generating product
GEL	Παχύρευστο υγρό (γέλη)	Gel
GR	Κοκκώδες	Granule
OD	Ελαιώδες Εναιώρημα	Oil Dispersion
PEL	Πελλέτα, σφαιρίδιο	Pellets
RB	Ετοιμόχρηστο δόλωμα	Ready to use Bait
SC	Πυκνό (Συμπυκνωμένο) Εναιώρημα	Suspension Concentrate
SE	Γαλακτώδες Αιώρημα	Suspo-Emulsion
SL	Πυκνό Διάλυμα	Soluble Concentrate
TB	Ταμπλέτες, δισκία	Tablet
TRAP	Παγίδα	Trap
WG	Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι ή Βρέξιμοι Κόκκοι	Water dispersible Granules
WP	Βρέξιμη Σκόνη	Wettable Powder

Ευρετήριο

Εντομοκτόνα 11

CONTROL 0,4 GR (lambda-cyhalothrin 0,4%) 11
DELMUS 2,5 EC (deltamethrin 2,5%) 11
EFALVAC 1,5 GR (tefluthrin 1,5%) 12
IMIDAN® 50 WP (phosmet 50%) 12
KITROFEN ULTRA 100 EC (pyriproxyfen 10%) 12
LAOTTA 1,8 EC (abamectin 1,8%) 12
MATEUS® 10 CS (Zeon tech) (lambda cyhalothrin 9,43%) 13
PHANTOM 2,5 EC (deltamethrin 2,5%) 13
REBEL 100 EW (cypermethrin 10%) 14
REVENGE 200 SL (acetamiprid 20%) 14
REVOLVER 1,8 EC (abamectin 1,8%) 15
SCORPION EC (παραφινικό λάδι 96,9% / CAS No 64742-46-7) 15
SERVATRAY (hydrolysed proteins 11% + ammonium acetate 6%) 15
SHOOTER 200 SL (flupyradifurone 20%) 16
SWEEP MAX 500 EC (cypermethrin 50%) 16

Υποκαπνιστικά 17

PHOSTEK® 57 TB (aluminium phosphide 57%) 17
PHOSTEK® PELLETS (aluminium phosphide 57%) 17
PHOSTEK® SACHETS (aluminium phosphide 57%) 17

Μυκητοκτόνα 18

ALANDIN 100 EC (penconazole 10%) 18
ARMETIL COURE 8/40 WP (metalaxyl 8% + copper oxychloride 40%) 18
AZOFIN® 250 SC (azoxystrobin 25%) 18
BOTREFIN® PLUS 37,5/25 WG (cyprodinil 37,5% + fludioxonil 25%) 18
CABRIO® DUO 4/7,2 EC (pyraclostrobin 4% + dimethomorph 7,2%) 19
CABRIO® TEAM 6,7/12 WG (pyraclostrobin 6,7% + dimethomorph 12%) 19
COLLIS® 20/10 SC (boscalid 20% + kresoxim-methyl 10%) 19
COMRADE 20/8 SC (azoxystrobin 20% + cyproconazole 8%) 19
DEMON 70 WG (dithianon 70%) 19
DIFENOFIN® 250 EC (difenoconazole 25%) 19
DIPROSPERO SC (dimethomorph 9% + propamocarb HCl 50%) 20
DYNASTY 20/12,5 SC (azoxystrobin 20% + difenoconazole 12,5%) 20
ELLATHION DP (Micronized) (sulphur 96%) 20
FLUAZINOVA® 500 SC (fluazinam 50%) 20
FOLLOW 80 WG (folpet 80%) 20
FRAME 80 WG (sulphur 80%) 20
LAGOON 25 EW (tebuconazole 25%) 21
METMAN 25 WP (metalaxyl 25%) 21
MORGAN 80 WG (captan 80%) 21
ORVEGO® 30/22,5 SC (ametoctradin 30% + dimethomorph 22,5%) 22
PENCOL 10 EC (penconazole 10%) 22
PIRGUS 80 WG (fosetyl-Al 80%) 22
PROMESS 72,2 SL (propamocarb hydrochloride 72,2%) 23
PROXANIL DUO SC (cymoxanil 5% + propamocarb HCl 40%) 23
RIBBON 12 EC (myclobutanil 12%) 23
SCALA® 40 SC (pyrimethanil 40%) 23
SIVAR 25 SC (azoxystrobin 25%) 24
SIVAR GOLD 25,5/6,25 SC (potassium phosphonates 25,5% + azoxystrobin 6,25%) 24
URANSER SL (potassium phosphonate 51,57%) 24
WETTASUL DP (Micronized) (sulphur 96%) 24

Χαλκούχα Μυκητοκτόνα 25

BORDO 20 WG (Μεταλλικός χαλκός 20%, σε μορφή βορδιγάλειου πολτού) 25
BORDO 20 WP (Μεταλλικός χαλκός 20%, σε μορφή βορδιγάλειου πολτού) 25
COURE FLOW 38 SC (Μεταλλικός χαλκός 38%, σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού) 25
CUPRICO 50 WP (Μεταλλικός χαλκός 50%, σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού) 26
CURENOX 50 WG (Μεταλλικός χαλκός 50%, σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού) 26
HYDROPLUS NEW 40 WG (Μεταλλικός χαλκός 40%, σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού) .. 27
ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP (Μεταλλικός χαλκός 50%, σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού) 27
ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP (Μεταλλικός χαλκός 50%, σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού) 27

Ζιζανιοκτόνα 29

ABILEST® 455 CS (pendimethalin 45,5%) 29
BUZIN 70 WG (metribuzin 70% β/β) 29
DICASH 48 SL (dicamba 48%, ως άλας dimethylammonium) 29
DIQUELL 20 SL (diquat 20%) 29
ETERNITY 31,25/18,75 SE (S-metolachlor 31,25% + terbuthylazine 18,75%) 30
FENHEX 24 EC (oxyfluorfen 24%) 30
FLUTON 50 SC (fluometuron 50%) 30
FOCUS® 10 EC (cycloxydim 10%) 30
GENOXONE® ZX (triclopyr 10,36% + 2,4-D 9,3%) 31
HELSTAR 6,9 EW (fenoxaprop-p-ethyl 6,9%) 31
IFESTOS TF 36 SL (glyphosate 36%) 31
IPIGLYCE NEW 36 SL (glyphosate 36%) 32
KEYNERON GREEN 36 SL (glyphosate 36%) 32
LUPO 365 CS (pendimethalin 36,5%) 32
MAZA 4 SL (imazamox 4%) 33
MESOLON 10 SC (mesotrione 10%) 33
MODETT® 25/28 SE (terbuthylazine 25% + dimethenamid-p 28%) 33
NICOSH 4 OD (nicosulfuron 4%) 33
NIMBLE® 50/25 WG (thifensulfuron methyl 50% + tribenuron methyl 25%) 33
PENDINOVA® 330 EC (pendimethalin 33%) 34
QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC (quizalofop-p-ethyl 5%) 34
RENOX® 40 SL (MCPA οξύ 40%) 35
RiNiDi WG (rimsulfuron 2,3% + nicosulfuron 9,2% + dicamba 55%, υπό μορφή άλατος νατρίου) 35
SANAPHEN 600 EC (2,4-D οξύ 60%, υπό μορφή 2,4-D 2-αίθυλο έξυλο εστέρας (EHE): 90,5%) 35
SELAS 24 EC (clethodim 24%) 35
SELLOTRON 25/32 SC (fluometuron 25% + pendimethalin 32%) 35
TERRIFIC 96 EC (S-metolachlor 96%) 36
VERITY 750 SL (MCPA οξύ 75%, υπό μορφή άλατος διμεθυλαμίνης 91,85%) 36
YAMBO 18/18 SL (glyphosate 18% + MCPA 18%, υπό μορφής άλατος ισοπροπυλαμίνης) . 36

Βιοκτόνα (Εντομοκτόνα) 37

AXXEPEL 100 EW (cypermethrin 10%) 37
BUGSPOT 0,9 DP (tetramethrin 0,9 %) 37
ELLASECT® GEL (imidacloprid 2,15%) 37
ELLASECT® ANTS GEL (imidacloprid 0,0098%) 37

Βιοκτόνα (Τρωκτικοκτόνα) 37

BONITOP NEXT PASTA FLUO (difenacoum 0,0029%) 37
KILLER-NEO WHEAT (brodifacoum 0,0029%) 37

Ειδικά Προϊόντα, Φυτορρυθμιστικές Ουσίες 38

BLUE SHADE 38
COMO PLUS L. (ethoxylated isodecyl alcohol 15%) 38
HEDIX PRO 5 SL (mepiquat chloride 5%) 38

IANOS 48 SL (ethephon 48%) 38
MERIDIEN 5 GB (metaldehyde 5%) 38
VAPAM FORTE (metam sodium 51% β/ο) 38

Συγκεντρωτικός Πίνακας Προϊόντων 39

(με εγκεκριμένες χρήσεις ανά καλλιέργεια/ στόχο και PHI)

Αβοκάντο 39
Αγγούρι 39
Αγγούρι (Θ) 39
Αγγούρι (Υ) 40
Αγκινάρα 40
Αγκινάρα (Υ) 40
Αγροί 40
Ακαλλιέργητες εκτάσεις 41
Ακτινίδιο 41
Αμπέλι 41
Αμπέλι (επιτραπέζιο) 41
Αμπέλι (οινοποιήσιμο) 42
Αμυγδαλιά 43
Άνηθος (Θ) 43
Ανθοκομικά φυτά 44
Αντίδι 44
Αντίδι (Υ) 44
Αποθηκευμένα προϊόντα (τρόφιμα, ζωοτροφές), Αποθηκευτικοί χώροι (κενοί), Μέσα μεταφοράς προϊόντων, Ξυλεία, Σιλό 44
Αντράκλα 44
Αραβόσιτος 44
Αρακάς 45
Αρακάς (Θ) 45
Αρακάς (Υ) 45
Αραχίδα 45
Αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια 45
Αρωματικά φυτά 45
Αρωματικά φυτά (Υ) 46
Ασκαλώνιο (εσαλότ) 46
Αχλαδιά 46
Αχλαδομηλιά 47
Βαμβάκι 47
Βατόμουρα 48
Βερικοκιά 48
Βρώμη 49
Βυσσινιά 49
Γαιοκάρδαμο 49
Γαρυφαλλιά 49
Γκαζόν (γρασίδι) 49
Γκρέιπφρουτ 50
Γλυκό καλαμπόκι 50
Γλυκό λάιμ 50
Γογγύλι 51
Γουλί 51
Δαμασκηνιά 51
Δασικά είδη σε φυτώριο 51
Δενδρώνες 52
Ελαιοκράμβη 52
Ελιά 52
Ζαχαρότευτλα 53

Ηλίανθος 53
Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης) 53
Καλλιεργούμενοι αγροί 54
Καλλωπιστικά 54
Καλλωπιστικά (Θ) 54
Καλλωπιστικά βολβώδη (Θ) 54
Καλλωπιστικά (Υ) 54
Καλλωπιστικά (φυτώρια) 55
Καπνά και κατεργασμένα προϊόντα αυτών 55
Καπνός 55
Καπνοσπορεία (Θ) 55
Κάρδαμο 56
Καρότο 56
Καρότο (Θ) 56
Καρότο (Υ) 56
Καρπούζι 56
Καρπούζι (Θ) 57
Καρπούζι (Υ) 57
Καρυδιά 57
Καστανιά 58
Κερασιά 58
Κεχρί 59
Κιτριά 59
Κιχώριο 59
Κολοκύθα 59
Κολοκύθα (Θ) 59
Κολοκύθα (Υ) 60
Κολοκύθι 60
Κολοκύθι (Θ) 60
Κολοκύθι (Υ) 60
Κορομηλιά 61
Κουκιά 61
Κουμκουάτ 61
Κουνουπίδι 61
Κουνουπίδι (Θ) 62
Κουνουπίδι (Υ) 62
Κρεμμυδάκι (φρέσκο) 62
Κρεμμύδι 62
Κρεμμύδι (Υ) 63
Κριθάρι 63
Κτηνοτροφικά τεύτλα 63
Κυδωνιά 63
Κυκλάμινο (Θ+Υ) 64
Λαγόχορτο (Scorzonera) 64
Λάιμ (lime, λιμετία) 64
Λαχανάκι Βρυξελλών 64
Λαχανάκι Βρυξελλών (Θ+Υ) 64
Λαχανικά (Θ+Υ) 65
Λάχανο 65
Λάχανο (Θ) 65
Λάχανο (Υ) 65
Λάχανο (Κινέζικο) 65
Λάχανο (Κόκκινο, Λευκό) 66
Λαχανόκηποι 66
Λεμονιά 66
Λεύκη (και δενδρύλλια σε φυτώρια) 67

Λούπινο 67
Λυκίσκος 67
Λυκοτρίβολο 67
Λυκοτρίβολο (Υ) 67
Λωτός 67
Μαϊντανός 67
Μαϊντανός (Θ) 67
Μαϊντανός (Υ) 68
Μάνγκο 68
Μανιτάρια 68
Μανταρινιά 68
Μαρούλι 69
Μαρούλι (Θ) 69
Μαρούλι (Υ) 69
Μαρούλι και λοιπά σαλατικά 70
Μαρούλι και λοιπά σαλατικά (Υ) 70
Μελιτζάνα 70
Μελιτζάνα (Θ) 70
Μελιτζάνα (Υ) 70
Μηδική 71
Μηλιά 71
Μόνιμοι βοσκότοποι και λιβάδια με αγρωστώδη 72
Μουσμουλιά 72
Μπιζέλι 73
Μπιζέλι (ξηρό, όσπρια) 73
Μπιζέλι με λοβό 73
Μπιζέλι με λοβό (Θ) 73
Μπιζέλι με λοβό (Υ) 73
Μπρόκολο 73
Μπρόκολο (Θ) 74
Μπρόκολο (Υ) 74
Μύρτιλλα 74
Νεραντζιά 74
Όλες οι καλλιέργειες 74
Όλυρα (*Triticum spelta*) 74
Παντζάρι 75
Παπάγια 75
Παστινάκι 75
Πατάτα 75
Πεπόνι 76
Πεπόνι (Θ) 76
Πεπόνι (Υ) 76
Περγαμόντο 77
Πεύκα (αστικών και περιαστικών περιοχών) 77
Πιπεριά 77
Πιπεριά (Θ) 78
Πιπεριά (Υ) 78
Πορτοκαλιά 79
Πράσο 79
Προσκολλητικό - επιφανειοδραστικό 80
Ραδίκι 80
Ραπάνι 80
Ρέβα 80
Ρεβίθι 80
Ροδακινιά 81
Ροδιά 82

Ρόκα 82
Ρύζι 82
Σέλερι 82
Σέλινο 82
Σελινόριζα (ραπανοσέλινο) 82
Σέσκουλο 83
Σίκαλη 83
Σινάπι 83
Σιτάρι 83
Σιτάρι (μαλακό, σκληρό) 84
Σκαρόλα 84
Σκαρόλα (Υ) 84
Σκαρόλα (Θ) 84
Σκόρδο 84
Σκόρδο (Υ) 84
Σμέουρα 84
Σμέουρα (Θ) 85
Σόγια 85
Σόργο 85
Σπανάκι 85
Σπαράγγι 85
Σπορεία 86
Σπόροι ελαιοκράμβης 86
Σπόροι παπαρούνας 86
Τομάτα 86
Τομάτα (Θ) 86
Τομάτα (Υ) 87
Τριανταφυλλιά 88
Τριτικάλε 88
Φακή 88
Φασόλι 89
Φασόλι με λοβό 89
Φασόλι με λοβό (Θ) 89
Φασόλι με λοβό (Υ) 89
Φιστικιά 89
Φοινικοειδή 90
Φουντουκιά 90
Φράουλα 90
Φράουλα (Θ) 90
Φράουλα (Υ) 91
Φράπα 91
Φύλλα τεύτλων (Υ) 91
Φυτώρια 91
Φυτώρια οπωροφόρων δένδρων και νεαρά δέντρα 91
Χρένο 92

ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΡΕΨΗΣ - ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Μείγματα μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων, Βιοδιεγέρτες, Προϊόντα εξειδικευμένης θρέψης 93

ADIMEL®+ 93
BIOCUAJE® 93
BIOVIDA 93
BoMo FORTE 93
CalMag LIQUID 94
CUPRAZUFRE 95
FIXER 95

HUMIBOR 95
HUMICAL 95
IRON FORTE EDDHA 6% 95
KELTERRA L 95
K-VITRUM® 96
MAS-RAIZ+ 96
NEKAMIL STAR 96
NUTRIMAN N-24 97
OLIVO PLUS 97
QUALIFUN® 97
SERGOMAX® L90 ECO 98
SERGOMIL® ECO 98
SERVAFORT® 98
SERVANITRO STAR® 98
SERVIMEC 5-10-43 + 1%MgO + 0,2%B + Micros 99
SIDEFUN® 99
SUPERB UREA 99
TANISER® 100
VERDEZIN Fe 100
ZIMAGBOR PM 101
ZINBOR PM 101

Βιοδιεγέρτες με βάση Εκχύλισμα Φυκιών του είδους *Ascophyllum nodosum* 101

MAXICROP® 101
MAXICROP® B 102
MAXICROP® Fe 103
MAXICROP® N 103

Βιοδιεγέρτες με βάση Χουμικά - Φουλβικά οξέα και Θείο 104

ORGANOSUL 20S 104
ORGANOSUL NS 104
TRIUMPHALIS 105

Υδατοδιαλυτά, Κρυσταλλικά Λιπάσματα 106

Maxi Plant 20-20-20 + TE 106
Maxi Plant 15-30-15 + TE 106
Maxi Plant 30-10-10 + TE 106
Maxi Plant 12-9-39 + TE 106

Εντομοκτόνα

Προϊόν Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Καλλιέργειες[α]	ΜΑΕ | ΜΕ[β]	PHI[γ,δ,ε] (ημέρες)

CONTROL 0,4 GR (lambda-cyhalothrin 0,4%)

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, ευρέως φάσματος, δρα διά επαφής και δια στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση, για τον έλεγχο μυζητικών και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Βαμβάκι, Ζαχαρότευτλα, Ηλίανθος, Καπνός, Σόγια, Σπόροι ελαιοκράμβης, Σπόροι παπαρούνας	1	Μ/Ε
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ	1	Μ/Ε
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Ανθοκράμβες: Κουνουπίδια, Μπρόκολα. Κεφαλωτές κράμβες: Λάχανα, Λαχανάκια Βρυξελλών. Μαρούλια & σαλατικά: Γαιοκάρδαμο, Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης), Κάρδαμο, Κόκκινο σινάπι, Λυκοτρίβολο, Μαρούλια, Ρόκα, Σκαρόλες/ Αντίδια. Σπανάκι & παρεμφερή: Ανδράκλα, Σέσκουλα/ Φύλλα τεύτλων (Υ), Σπανάκι	1	Μ/Ε
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Καρότο	1	Μ/Ε
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ: Αγγούρι, Καρπούζι, Κολοκύθα, Κολοκύθι, Πεπόνι	1	Μ/Ε
ΣΙΤΗΡΑ: Αραβόσιτος, Γλυκό καλαμπόκι, Κεχρί, Σόργο	2|45	Μ/Ε
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Μελιτζάνα, Πιπεριά, Τομάτα	1	Μ/Ε
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα	2|30	Μ/Ε
Φυτώρια οπωροφόρων δένδρων και νεαρά δέντρα	1	Μ/Ε
Από τις ανωτέρω ετήσιες καλλιέργειες όταν αυτές προορίζονται για σποροπαραγωγή: Η δοσολογία και η χρήση όπως αναφέρεται για την κάθε ετήσια καλλιέργεια ανωτέρω.	-	-

DELMUS 2,5 EC (deltamethrin 2,5%)

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων. Το deltamethrin δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Καστανιά, Φιστικιά, Φουντουκιά	2|14	30
Αμπέλι	3|14	7
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Βαμβάκι	2|14	30
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Ζαχαρότευτλα	1	30
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Καπνός	3|7	7
Ελιά	1	7
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Γκρέιπφρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Νεραντζιά, Πορτοκαλιά	1	30
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (Θ+Υ)	3|7	Μ/Ε
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Αγκινάρα, Μαρούλι (Υ)	3|7	3
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Ρόκα	2|14	3
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Κουνουπίδι, Λάχανο (εκτός από το κινέζικο), Μαϊντανός, Μπρόκολο, Φύλλα σέλινου	2|14	7
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο	3|14	7
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Παντζάρι	1	30
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ+Υ): Αγγουράκι, Αγγούρι, Καρπούζι, Κολοκύθι, Πεπόνι	3|7	3
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ: Μηδική	2|14	14
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μηλιά, Μουσμουλιά	2|14	7
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, Βυσσινιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Ροδακινιά	1	7
ΣΙΤΗΡΑ: Αραβόσιτος	3|7-14 (Διαβρώτικα), 3|14-21 (Λοιποί εχθροί)	30
ΣΙΤΗΡΑ: Βρώμη, Κριθάρι, Σίκαλη, Σιτάρι	1	30
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ+Υ): Μελιτζάνα, Πιπεριά, Τομάτα	4|7 (Θ), 3|14 (Υ)	3
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα	3|14	7
Φράουλα (Θ+Υ)	3|14	3
ΨΥΧΑΝΘΗ: Μπιζέλι φρέσκο (αρακάς)	2|14	7
ΨΥΧΑΝΘΗ (όσπρια): Κουκιά, Ρεβίθι, Φακή, Φασόλι	2|14	7

Προϊόν Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Καλλιέργειες[α]	ΜΑΕ | ΜΕ[β]	PHI[γ,δ,ε] (ημέρες)

EFALVAC 1,5 GR (tefluthrin 1,5%)

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο. Καταπολεμά έντομα εδάφους. Παρεμποδίζει τη λειτουργία των διαύλων ιόντων νατρίου (sodium channel modulator) προκαλώντας παρατεταμένο άνοιγμα αυτών που οδηγεί σε υπερευαισθησία του νευρικού συστήματος, διακοπή της διατροφής, παράλυση και τελικά το θάνατο του εντόμου. Δρα δι' επαφής μέσω της απορρόφησής του από την επιδερμίδα, αλλά έχει και κάποια δράση δια του στομάχου. Δεν είναι διασυστηματικό αλλά έχει δράση με ατμούς. Έχει γρήγορη αρχική δράση (knockdown effect) και αρκετή υπολειμματική διάρκεια. Επιπλέον, λόγω των ατμών που δημιουργούνται στην εδαφική ζώνη, τα έντομα απομακρύνονται και δεν πλησιάζουν τα φυτά στη γραμμή εφαρμογής.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Βαμβάκι, Ζαχαρότευτλα, Ηλίανθος, Καπνός	1	ΔΟ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Γογγύλι, Γουλί, Καρότο, Παντζάρι	1	ΔΟ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Ραπανάκια	1	21
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Σέλερι	1	110
ΣΙΤΗΡΑ: Αραβόσιτος, Γλυκό Καλαμπόκι	1*	ΔΟ
ΣΙΤΗΡΑ: Σόργο	1 εφαρμογή ανά 3 χρόνια	ΔΟ
ΨΥΧΑΝΘΗ: Μπιζέλια (με λοβό), Φασολάκια (με λοβό)	1	ΔΟ

** Μία (1) εφαρμογή ανά καλ. περίοδο για Αγρότιδα, Σιδηροσκώληκες και Σύμφυλα και μία (1) εφαρμογή ανά 3 χρόνια για Διαβρώτικα.*

IMIDAN® 50 WP (phosmet 50%)

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μασητικών και μυζητικών εντόμων.

Ελιά	2|10	21
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Γκρέιπφρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά	1	14
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Αχλαδομηλιά, Κυδωνιά, Μηλιά	2|20	28
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Ροδακινιά	2|10	14

KITROFEN ULTRA 100 EC (pyriproxyfen 10%)

Εντομοκτόνο - ρυθμιστής ανάπτυξης, μιμητικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων. Επιδρά μέσω επαφής και κατάποσης στη μορφογένεση, την αναπαραγωγή και την εμβρυογένεση των εντόμων, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους (ωά, προνύμφη, νύμφη, ακμαίο), παρεμποδίζοντας την ομαλή εξέλιξη και ενηλικίωσή τους.

ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Αμυγδαλιά*, Καρυδιά*, Καστανιά*, Φιστικιά*, Φουντουκιά*	1 (πριν την άνθηση)	ΔΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Βαμβάκι	1	ΔΟ
Ελιά	1	ΔΟ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Γκρέιπφρουτ, Λάιμ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά	1	30
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ): Αγγούρι	2|10-15**	3
Λωτός*	1 (πριν την άνθηση)	ΔΟ
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Αχλαδομηλιά*, Κυδωνιά*, Μηλιά, Μουσμουλιά*	1 (πριν την άνθηση)	ΔΟ
Πεύκα (αστικών και περιαστικών περιοχών)	1***	Μ/Ε
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, Βυσσινιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Ροδακινιά	1 (πριν την άνθηση)	ΔΟ
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ): Μελιτζάνα*, Τομάτα	2|10	3
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ): Πιπεριά	2|10-15**	3

** ΧΗΣ*

*** Μεσοδιάστημα επεμβάσεων 10 ημέρες όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη των 25°C και 15 ημέρες όταν είναι μικρότερη.*

**** Με την προϋπόθεση ότι την ίδια περίοδο δεν θα χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό άλλο ΦΠ. Για τη χρήση σε πεύκα ισχύουν ειδικές οδηγίες/ απαγορεύσεις/ περιορισμοί (βλ. ετικέτα).*

LAOTTA 1,8 EC (abamectin 1,8%)

► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

Εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής κατά των κινητών μορφών εντόμων και ακάρεων. Προκαλεί παράλυση στα έντομα με αποτέλεσμα το θάνατό τους από ασιτία, σε διάστημα 3-5 ημερών από τον ψεκασμό.

Αμπέλι (επιτραπέζιες* και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	1	10
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Γκρέιπφρουτ, Κιτρολεμονιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Νεραντζιά, Περγαμόντο, Πορτοκαλιά, Φράπα	1-3|7	10

** Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα στις ποικιλίες Σουλτανίνα και Κορινθιακή Σταφίδα.*

Προϊόν Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Καλλιέργειες[α]	ΜΑΕ | ΜΕ[β]	PHI[γ,δ,ε] (ημέρες)

LAOTTA 1,8 EC (abamectin 1,8%)

► Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υ): Μαρούλι υπαίθρου, Άλλα σαλατικά υπαίθρου: Λυκοτρίβολο, Σκαρόλες (πικρίδα)/ πλατύφυλλα αντίδια, Νεαρά φύλλα και μίσχοι των καλλιεργειών (συμπεριλαμβανομένης της κράμβης) που συγκομίζονται μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου.	1-3 | 7	7
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ: Αγγουράκι (Θ), Αγγούρι (Θ), Καρπούζι (Θ+Υ), Κολοκύθα (Θ+Υ), Κολοκύθι (Θ), Πεπόνι (Θ+Υ)	1-2 | 7	3 (Θ), 5 (Υ)
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Μηλιά	1-2 | 15	3
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Ροδακινιά	1	14
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ+Υ): Μελιτζάνα, Τομάτα	1-3 | 7	3
Φράουλα (Θ)	1-2 | 7	3

MATEUS® 10 CS (Zeon tech) (lambda cyhalothrin 9,43%)

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο ευρέως φάσματος. Δρα δι' επαφής και δια στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση για την αντιμετώπιση μυζητικών καθώς και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες.

ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Καστανιά	2 | 14	14
Αμπέλι	2 | 14	7
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Βαμβάκι	2 | 14	14
Ελιά	2 | 14	7
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Λάχανο	2 | 14	7
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Μπρόκολο	2 | 14	10
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ+Υ): Αγγούρι, Κολοκύθι	2 | 14	3
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Μηλιά	2 | 14	7
Όλες οι καλλιέργειες (καταπολέμηση ακρίδων)*	-	Μ/Ε
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Ροδακινιά	2 | 14	7
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ+Υ): Μελιτζάνα, Πιπεριά, Τομάτα	2 | 14	3
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα	2 | 14	7
Φοινικοειδή**	2 | -	Μ/Ε
ΨΥΧΑΝΘΗ: Φακή	2 | 10	3

** Συλλογική καταπολέμηση με επίβλεψη και ευθύνη του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Νομ. Αυτοδιοικήσεων.*
*** Ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις/ απαγορεύσεις/ περιορισμοί χρήσης (βλ. ετικέτα).*

PHANTOM 2,5 EC (deltamethrin 2,5%)

► Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής - στομάχου κατά μυζητικών και μασητικών εντόμων. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

Αμπέλι	3 | 14	7
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Βαμβάκι	2 | 14	30
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Ελαιοκράμβη	1	ΔΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Ζαχαρότευτλα	1	30
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Καπνός	3 | 7	7
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Σόγια	2 | 14	ΔΟ
Ελιά	1	7
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Γκρέιπφρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Νεραντζιά, Πορτοκαλιά	1	30
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (Θ+Υ, φυτώρια)	3 | 7	Μ/Ε
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Αγκινάρα, Μαρούλι (Υ)	3 | 7	3
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Καρότο, Κρεμμύδι, Πράσο	3 | 14	7
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Λάχανο, Σέλινο (φύλλα)	2 | 14	7
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Ρόκα	2 | 14	3
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Σπαράγγι	2 | 7	ΔΟ

Προϊόν Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Καλλιέργειες[α]	ΜΑΕ | ΜΕ[β]	PHI[γ,δ,ε] (ημέρες)

PHANTOM 2,5 EC (deltamethrin 2,5%)

► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ+Υ): Αγγούρι	3|7	3
Μανιτάρια	1	3
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Μηλιά	1-2|14	7
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Ροδακινιά	1	7
ΣΙΤΗΡΑ: Αραβόσιτος	3|7-14	30
ΣΙΤΗΡΑ: Κριθάρι, Σιτάρι	1-2|21	30
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ): Μελιτζάνα, Τομάτα	3|7	3
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ): Πιπεριά	4|7	3
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Υ): Μελιτζάνα, Πιπεριά, Τομάτα	3|14	3
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα	3|14	7
Φράουλα	3|14	3
ΨΥΧΑΝΘΗ: Κουκιά (όσπρια), Φασόλι (όσπρια)	2|14	ΔΟ
ΨΥΧΑΝΘΗ: Μπιζέλι	2|14	7

REBEL 100 EW (cypermethrin 10%)

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων. Επίσης ασκεί αντιτροφική δράση.

Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	2|-	14
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Βαμβάκι	1	14
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Ελαιοκράμβη	2|-	28
Γκαζόν (Γρασίδι)	2|-	Μ/Ε
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ	2|-	Μ/Ε
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Γογγύλι, Κινέζικο λάχανο, Κουνουπίδι, Λαχανάκια βρυξελλών, Λάχανο, Μπρόκολο	2|-	7
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Σελινόριζα	2|-	14
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ: Μηδική	2|-	14
ΣΙΤΗΡΑ: Κριθάρι, Σιτάρι	2|-	21
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα	2|-	14
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ+Υ): Τομάτα	2|-	3 (Θ), 7 (Υ)

REVENGE 200 SL (acetamiprid 20%)

► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον κυρίως μυζητικών εντόμων καθώς και μασητικών εντόμων σε πολλές καλλιέργειες. Το acetamiprid ανήκει στην ομάδα των νεονικοτινοειδών και δρα δεσμεύοντας τους μετασυναπτικούς (νικοτινικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα του εντόμου.

Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	1	7
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Βαμβάκι	2|20	14
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Ελαιοκράμβη	2|7	20
Ελιά	2|14	7
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Γκρέιπφρουτ, Πορτοκαλιά	2|30	60*
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Κουμκουάτ, Λάιμ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Φράπα	2|30	30*
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Μαρούλι	1	7
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Σκαρόλες και λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf): Γαιοκάρδαμο, Κάρδαμο, Κόκκινο σινάπι, Ρόκα	1	10
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υ): Κουνουπίδι, Λάχανο, Μπρόκολο	1	14
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Μηλιά	2|8 (Καρπόκαψα), 2|20 (Λοιποί εχθροί)	14
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Ροδακινιά	2|20	14

** Στα Εσπεριδοειδή το PHI είναι 14 ημέρες όταν χρησιμοποιείται η δόση των 70 κ.εκ./στρ. Όταν χρησιμοποιείται η δόση των 150 κ.εκ./στρ., το PHI διαμορφώνεται, ανάλογα με το καλλιεργούμενο είδος, όπως παραπάνω.*

Προϊόν Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Καλλιέργειες[α]	ΜΑΕ | ΜΕ[β]	PHI[γ,δ,ε] (ημέρες)

REVENGE 200 SL (acetamiprid 20%)

► Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Κερασιά	2 | 14	3
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ+Υ): Μελιτζάνα, Τομάτα	2 | 20	3 (Θ), 7 (Υ)
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα	2 | 7	7
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ+Υ): Πιπεριά	2 | 20	7

REVOLVER 1,8 EC (abamectin 1,8%)

Εντομοκτόνο - ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής. Προκαλεί παράλυση στα έντομα με αποτέλεσμα το θάνατό τους από ασιτία.

ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Καρυδιά	1	60
Αμπέλι	2 | 14-21	28
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά	3 | 10	10
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (Θ) (φυτά-βολβοί και βολβώδη ανθικά φυτά-δένδρα, θάμνοι και φυτώρια δασικών δένδρων)	4 | 7	Μ/Ε
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Θ): Άνηθος, Μαϊντανός, Μαρούλι	4 | 7	14
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ): Αγγούρι, Κολοκύθι	4 | 7	3
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ+Υ): Καρπούζι, Πεπόνι	3 | 7	3
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μηλιά	2 | 7	28
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, Ροδακινιά	2 | 14	14
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Δαμασκηνιά	1	28
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Υ): Μελιτζάνα, Πιπεριά	3 | 7	3
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Μελιτζάνα (Θ), Πιπεριά (Θ), Τομάτα (Θ+Υ)	4 | 7	3

SCORPION EC (παραφινικό λάδι 96,9% / CAS No 64742-46-7)

BIO

Έχει εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο δράση. Χρησιμοποιείται ενάντια σε τετρανύχους, κοκκοειδή και αφίδες. Δρα με φυσικό τρόπο δημιουργώντας ένα φιλμ το οποίο προκαλεί ασφυξία των εντόμων στόχων (ακμαίων, προνυμφών και ωών).

Ακτινιδιά*	1	Μ/Ε
ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Αμυγδαλιά*, Καρυδιά*, Φιστικιά*	1-2 | 2 min	Μ/Ε
Αμπέλι	1	Μ/Ε
Ελιά*	1-2 | 14 min	Μ/Ε
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Γκρέιπφρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Φράπα	2 (με μία επιπλέον φθινοπωρινή εφαρμογή για *Aleurothrixus flocossus*) | 60	Μ/Ε
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Μηλιά	2 | 60	Μ/Ε
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Ροδακινιά	2 | 60	Μ/Ε
Ροδιά*	1-2 | 2 min	Μ/Ε

** ΧΗΣ*

SERVATRAY (hydrolysed proteins 11% + ammonium acetate 6%)

BIO

Εντομοελκυστικό για την αντιμετώπιση της μύγας της Μεσογείου, Ceratitis capitata σε εσπεριδοειδή και λωτό, με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης. Τα ενήλικα άτομα του εντόμου έλκονται από το προϊόν που περιέχεται στις παγίδες που τοποθετούνται στα δέντρα. Μόλις εισέλθουν στην παγίδα από την οπή παραμένουν παγιδευμένα σε αυτήν.

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Γκρέιπφρουτ, Γλυκό λάιμ, Κιτριά, Κουμκουάτ, Λεμονιά, Λιμεττία (λάιμ), Μανταρινιά, Νεραντζιά, Περγαμόντο, Πορτοκαλιά, Φράπα	1	Μ/Ε
ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ ΦΥΤΑ: Λωτός	1	Μ/Ε

Προϊόν Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Καλλιέργειες[α]	**ΜΑΕ | ΜΕ**[β]	**PHI**[γ,δ,ε] (ημέρες)

SHOOTER 200 SL (flupyradifurone 20%)

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μυζητικών και μασητικών εντόμων (Αφίδες, Αλευρώδεις, Τζιτζικάκια, Οπλοκάμπη, Φυλλοξήρα, Ψευδόκοκκο, Κοκκοειδή) σε υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

Αμπέλι	1	14
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Καπνός	1	Μ/Ε
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (Θ): Καλλωπιστικά Βολβώδη, Ανθοκομικά και Πολυετή Καλλωπιστικά, Φυτώρια Δένδρων	4|7	Μ/Ε
ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΙ ΘΑΜΝΟΙ (Θ): Σμέουρο/ Κόκκινο Βατόμουρο (Raspberry), Μαύρο Βατόμουρο (Blackberry)	2|10	3
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υ): Μαρούλι	1	3
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ+Υ): Αγγούρι, Καρπούζι, Κολοκύθα, Κολοκύθι	2|10 (Θ), 1 (Υ)	3
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Μηλιά	1 εφαρμογή κάθε 2 έτη	14
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ+Υ): Μελιτζάνα, Πιπεριά, Τομάτα	2|10 (Θ), 1 (Υ)	3
Φράουλα (Θ)	2|10	3

SWEEP MAX 500 EC (cypermethrin 50%)

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων. Επίσης ασκεί αντιτροφική δράση.

Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	1	21
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Βαμβάκι	2|10	21
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Ελαιοκράμβη	2|14	21
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Ζαχαρότευτλα, Καπνός	2|10	14
Δασικά είδη σε φυτώρια	2|10	Μ/Ε
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ	2|10	Μ/Ε
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Αγκινάρα, Ασκαλώνιο, Καρότο, Κουνουπίδι, Κρεμμύδι, Λαγόχορτο (Scorzonera), Λάχανο, Μαϊντανός (ρίζες), Μπρόκολο, Παστινάκι, Ραπάνι, Ραπανοσέλινο, Σκόρδο	2|10	3
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Γουλί, Ρέβα, Σέσκουλο	2|10	14
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Σινάπι	2|14	21
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Υ): Καρπούζι, Κολοκύθα, Πεπόνι	2|10	3
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ: Κτηνοτροφικά τεύτλα	2|10	14
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ: Μηδική	2|10	7
Λεύκη (και δενδρύλλια σε φυτώρια)	2|10	Μ/Ε
ΣΙΤΗΡΑ: Βρώμη, Κριθάρι, Όλυρα (*Triticum spelta*), Σίκαλη, Σιτάρι	2|14	28
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Μελιτζάνα (Υ), Πατάτα, Τομάτα (Υ)	2|10	3
ΨΥΧΑΝΘΗ (Υ): Μπιζέλι με λοβό, Φασόλι με λοβό	2|10	3

Υποκαπνιστικά

Προϊόν	Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Καλλιέργειες[α]

PHOSTEK® 57 TB (aluminium phosphide 57%)

Η φωσφίνη που εκλύεται είναι ένα πολύ τοξικό αέριο που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση με υποκαπνισμό όλων των σταδίων των εντόμων και ακάρεων των αποθηκευμένων προϊόντων (στα κινούμενα στάδιά τους), καθώς και των τρωκτικών στους αγρούς.

Αποθηκευμένα προϊόντα:
- Αποξηραμένα φρούτα (σύκα, δαμάσκηνα, σταφίδες κ.ά), Αφεψήματα (κακάο, καφές, τσάι, κ.ά.), Μπαχαρικά (πιπέρι, μοσχοκάρυδο, γαρύφαλλο, κανέλλα, κ.ά.) και Φαρμακευτικά φυτά από τα οποία πολλά χρησιμοποιούνται και σαν αφεψήματα (χαμομήλι, μέντα, λεβάντα, φασκόμηλο, φλισκούνι κ.ά.),
- Βαμβάκι μέταξας, μαλλιών, δερμάτων και χαλιών,
- Ελαιοπλακούντες και λοιπές ζωοτροφές,
- Ελαιούχοι σπόροι (αραχίδα, κ.ά.),
- Καπνά και κατεργασμένα προϊόντα αυτών,
- Ξηροί καρποί (αμύγδαλα, καρύδια, φιστίκια, φουντούκια, κ.ά.),
- Ξυλεία γενικά,
- Όσπρια (φασόλια, φακή, ρεβίθια, μπιζέλια, αρακάς, κουκιά, κ.ά.),
- Προϊόντα άλεσης και μεταποίησης σιτηρών (άλευρα, πίτυρα, ζυμαρικά, μπισκότα, γαλέτες, παξιμάδια, βύνη, κ.ά.),
- Σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη, αραβόσιτος, σόργο, ρύζι και κεχρί),
- Σκόνη γάλακτος, πατατάλευρο και προϊόντα σοκολατοποιΐας,
- Κενοί σάκοι μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων,
- Κενοί χώροι αποθήκευσης και επεξεργασίας προϊόντων,
- Μέσα μεταφοράς των ανωτέρω προϊόντων,

Τρωκτικά στους αγρούς (μόνο εφόσον προκαλούν ζημίες σε καλλιέργειες).

PHOSTEK® PELLETS (aluminium phosphide 57%)

Η φωσφίνη που εκλύεται είναι ένα πολύ τοξικό αέριο που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση με υποκαπνισμό των τρωκτικών και όλων των εντόμων και ακάρεων (στα κινούμενα στάδιά τους) των αποθηκευμένων προϊόντων, καθώς και των τρωκτικών στους αγρούς.

Αποθηκευμένα προϊόντα:
- Αποξηραμένα φρούτα (σύκα, δαμάσκηνα, σταφίδες κ.ά), Αφεψήματα (κακάο, καφές, τσάι, κ.ά.), Μπαχαρικά (πιπέρι, μοσχοκάρυδο, γαρύφαλλο, κανέλλα, κ.ά.) και Φαρμακευτικά φυτά από τα οποία πολλά χρησιμοποιούνται και σαν αφεψήματα (χαμομήλι, μέντα, λεβάντα, φασκόμηλο, φλισκούνι κ.ά.),
- Βαμβάκι μέταξας, μαλλιών, δερμάτων και χαλιών,
- Ελαιοπλακούντες και λοιπές ζωοτροφές,
- Ελαιούχοι σπόροι (αραχίδα, κ.ά.),
- Καπνά και κατεργασμένα προϊόντα αυτών,
- Ξηροί καρποί (αμύγδαλα, καρύδια, φιστίκια, φουντούκια, κ.ά.),
- Ξυλεία γενικά,
- Όσπρια (φασόλια, φακή, ρεβίθια, μπιζέλια, αρακάς, κουκιά, κ.ά.),
- Προϊόντα άλεσης και μεταποίησης σιτηρών (άλευρα, πίτυρα, ζυμαρικά, μπισκότα, γαλέτες, παξιμάδια, βύνη, κ.ά.),
- Σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη, αραβόσιτος, σόργο, ρύζι και κεχρί),
- Σκόνη γάλακτος, πατατάλευρο και προϊόντα σοκολατοποιΐας,
- Κενοί σάκοι μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων,
- Κενοί χώροι αποθήκευσης και επεξεργασίας προϊόντων,
- Μέσα μεταφοράς των ανωτέρω προϊόντων,

Τρωκτικά στους αγρούς (μόνο εφόσον προκαλούν ζημίες σε καλλιέργειες).

PHOSTEK® SACHETS (aluminium phosphide 57%)

Η φωσφίνη που εκλύεται είναι ένα πολύ τοξικό αέριο που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση με υποκαπνισμό όλων των σταδίων των εντόμων και ακάρεων (στα κινούμενα στάδιά τους) των αποθηκευμένων προϊόντων.

Αποθηκευμένα προϊόντα:
- Αποξηραμένα φρούτα (σύκα, δαμάσκηνα, σταφίδες κ.ά), Αφεψήματα (κακάο, καφές, τσάι, κ.ά.), Μπαχαρικά (πιπέρι, μοσχοκάρυδο, γαρύφαλλο, κανέλλα, κ.ά.) και Φαρμακευτικά φυτά από τα οποία πολλά χρησιμοποιούνται και σαν αφεψήματα (χαμομήλι, μέντα, λεβάντα, φασκόμηλο, φλισκούνι κ.ά.),
- Βαμβάκι μέταξας, μαλλιών, δερμάτων και χαλιών,
- Ελαιοπλακούντες και λοιπές ζωοτροφές,
- Ελαιούχοι σπόροι (αραχίδα, κ.ά.),
- Καπνά και κατεργασμένα προϊόντα αυτών,
- Ξηροί καρποί (αμύγδαλα, καρύδια, φιστίκια, φουντούκια, κ.ά.),
- Ξυλεία γενικά,
- Όσπρια (φασόλια, φακή, ρεβίθια, μπιζέλια, αρακάς, κουκιά, κ.ά.),
- Προϊόντα άλεσης και μεταποίησης σιτηρών (άλευρα, πίτυρα, ζυμαρικά, μπισκότα, γαλέτες, παξιμάδια, βύνη, κ.ά.),
- Σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη, αραβόσιτος, σόργο, ρύζι και κεχρί),
- Σκόνη γάλακτος, πατατάλευρο και προϊόντα σοκολατοποιΐας,
- Κενοί σάκοι μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων,
- Κενοί χώροι αποθήκευσης και επεξεργασίας προϊόντων,
- Μέσα μεταφοράς των ανωτέρω προϊόντων.

Μυκητοκτόνα

Προϊόν Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Καλλιέργειες[α]	ΜΑΕ | ΜΕ[β]	PHI[γ,δ,ε] (ημέρες)

ALANDIN 100 EC (penconazole 10%)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του ωιδίου σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, αμπέλι, λαχανικά, καπνό, ανθοκομικά και άλλες καλλιέργειες.

Αμπέλι	3|10-14	Επιτραπέζιο: 14, Οινοποιήσιμο: 21
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Καπνός	2|10-14	14
ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ (Θ+Υ): Αγγελική, Αλθέα, Γαρυφαλλιά, Καλεντούλα, Μπιγκόνια, Ντάλια, Πελαργόνιο, Ποτεντίλα, Τριανταφυλλιά, Χρυσάνθεμο, Japanese spindle tree	2|7-12	Μ/Ε
ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΙ ΘΑΜΝΟΙ: Βατόμουρα, Σμέουρα	1	3
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Αγκινάρα	2|10-12	14
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ+Υ): Αγγούρι, Καρπούζι, Κολοκύθα, Κολοκυθάκι, Πεπόνι	2|10-14	3
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μηλιά	3|12-14	14
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, Νεκταρίνια, Ροδακινιά	2|12-14	14
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ+Υ): Μελιτζάνα, Πιπεριά, Τομάτα*	2|10-12	3
Φράουλα* (Θ+Υ)	2|10-14	3

** Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που προορίζονται για μεταποίηση.*

ARMETIL COURE 8/40 WP (metalaxyl 8% + copper oxychloride 40%)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση.

Αμπέλι	4|-	Στο τέλος της ανθοφορίας
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα	2|10-14	28

AZOFIN® 250 SC (azoxystrobin 25%)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση. Η δ.ο. azoxystrobin ανήκει στην ομάδα των στρομπιλουρινών και δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων, ελέγχοντας έτσι ένα μεγάλο εύρος μυκήτων. Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο σύμπλοκο III της αναπνευστικής αλυσίδας.

Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο)	3|10	21
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Ζαχαρότευτλα	2|21	30
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Αγκινάρα	3|10	7
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υ): Καρότο, Κρεμμύδι ξηρό, Σκόρδο	3|7	14
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Σπαράγγι	2|10	Μ/Ε
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ+Υ): Αγγούρι, Καρπούζι, Κολοκυθάκι, Πεπόνι	3|10	3
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ): Μελιτζάνα*, Τομάτα	3|7	3
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ+Υ): Πιπεριά	2|7	3
Φράουλα (Υ)	3|7	3

** ΧΗΣ*

BOTREFIN® PLUS 37,5/25 WG (cyprodinil 37,5% + fludioxonil 25%)

Μείγμα δύο μυκητοκτόνων ενός επαφής (fludioxonil) και ενός διασυστηματικού (cyprodinil) με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Τα φαινυλοπυρρολικά (fludioxonil) προκαλούν βλάβες στις κυτταρικές μεμβράνες των μυκήτων. Οι ανιλινοπυριμιδίνες (cyprodinil), παρεμποδίζουν την απέκκριση λυτικών ενζύμων από τα παθογόνα.

Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	1	21 (Οινοπ.), 7 (Επιτραπ.)
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ+Υ): Αγγούρι	3|7-10	3
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Δαμασκηνιά	3|7-10	7
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ): Τομάτα, Μελιτζάνα	3|7-10	3
Φράουλα (Θ+Υ)	2|10 (Θ), 1 (Υ)	1 (Θ), 2 (Υ)

Προϊόν Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Καλλιέργειες[α]	ΜΑΕ | ΜΕ[β]	PHI[γ,δ,ε] (ημέρες)

CABRIO® DUO 4/7,2 EC (pyraclostrobin 4% + dimethomorph 7,2%)

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση ασθενειών που οφείλονται σε παθογόνα της ομάδας Ωομυκήτων (περονόσποροι) και Ασκομυκήτων (ωίδια).Το pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου III της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει αποπλαστική και διελασματική κίνηση, ενώ το dimethomorph δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος και εμφανίζει επίσης διελασματική κίνηση.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (Υ): Βασιλικός, Δενδρολίβανο, Θυμάρι	3|7-10	7
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υ): Αγκινάρα*	3|7-10	3
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υ): Κουνουπίδι, Μπρόκολο	3|10-12	7
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υ): Κρεμμύδι, Λυκοτρίβολο, Μαρούλι, Σκόρδο	3|7-8	7
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υ): Λάχανο	3|10-12	3
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υ): Μαϊντανός	3|7-10	7
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ): Αγγούρι, Κολοκύθι	3|7-8	1
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Υ): Καρπούζι, Πεπόνι	3|7	3
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα	3|10	3
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ+Υ): Τομάτα	3|7-8	3

**ΧΗΣ*

CABRIO® TEAM 6,7/12 WG (pyraclostrobin 6,7% + dimethomorph 12%)

Νέο Προϊόν

Μυκητοκτόνο μίγμα της δ.ο. pyraclostrobin που ανήκει στην ομάδα των QoIs (μεθοξυκαρβαμιδικά) και της δ.ο. dimethomorph που ανήκει στην ομάδα των μορφολινικών για καταπολέμηση του ωιδίου και του περονοσπόρου στο αμπέλι. Το pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου III της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει αποπλαστική και διελασματική κίνηση, ενώ το dimethomorph δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος και εμφανίζει επίσης διελασματική κίνηση.

Αμπέλι	3|12-14	Επιτραπέζιο: 48, Οινοποιήσιμο: 35

COLLIS® 20/10 SC (boscalid 20% + kresoxim-methyl 10%)

Το Collis® 20/10 SC είναι μυκητοκτόνο μίγμα δύο δραστικών συστατικών, Kresoxim-methyl και Boscalid, με παρόμοιο τρόπο δράσης για την καταπολέμηση του ωιδίου. Το Collis® 20/10 SC παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση εμφανίζοντας προληπτική και θεραπευτική δράση.

Αμπέλι	3|10-14	35
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ+Υ): Αγγούρι, Κολοκύθι	3|7-10	3
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Υ): Καρπούζι, Πεπόνι	3|10-14	3

COMRADE 20/8 SC (azoxystrobin 20% + cyproconazole 8%)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο μίγμα δύο δραστικών συστατικών, το Cyproconazole μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση και το Azoxystrobin μυκητοκτόνο με αντισποροgόνο δράση. Απορροφάται από τις ρίζες και από το φύλλωμα των καλλιεργειών και αναστέλλει την μιτοχονδριακή αναπνοή, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της βλάστησης και της παραγωγής σπορίων καθώς και την αναστολή ανάπτυξης μυκηλίου του μύκητα.

ΣΙΤΗΡΑ: Βρώμη, Σίκαλη, Σιτάρι, Τριτικάλε	2|21	42

DEMON 70 WG (dithianon 70%)

Αναμένε-ται

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και ειδικά για το φουζικλάδιο θεραπευτική δράση.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Μηλιά	6|-	42

DIFENOFIN® 250 EC (difenoconazole 25%)

Νέο Προϊόν

Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Περιέχει το δραστικό συστατικό difenoconazole (τριαζόλη) που κινείται διελασματικά και έχει προληπτική δράση. Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του συνίσταται στην παρεμπόδιση της απομεθυλίωσης του C14 κατά την διαδικασία βιοσύνθεσης της εργοστερόλης. Καταπολεμά διάφορες μυκητολογικές ασθένειες σε Μηλιά, Σπαράγγι και Ζαχαρότευτλα.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Ζαχαρότευτλα	3|21	21
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Σπαράγγι	3|14	ΔΟ
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά	3|10	14

Προϊόν Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Καλλιέργειες[α]	ΜΑΕ | ΜΕ[β]	PHI[γ,δ,ε] (ημέρες)

DIPROSPERO SC (dimethomorph 9% + propamocarb HCl 50%)

Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση του περονόσπορου στην πατάτα. Το dimethomorph ανήκει στην ομάδα αμιδίων του κινναμικού οξέος (CCA) και παρεμποδίζει το σχηματισμό του κυτταρικού τοιχώματος. Είναι τοπικά διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντισποριογόνο δράση. Το propamocarb HCl ανήκει στα καρβαμιδικά και παρεμποδίζει την βιοσύνθεση λιπιδίων και λιπαρών οξέων. Δρα ως πολλαπλός αναστολέας. Είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση. Απορροφάται από τις ρίζες και τα φύλλα και κινείται ακροπεταλικά.

ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα	5|7	14

DYNASTY 20/12,5 SC (azoxystrobin 20% + difenoconazole 12,5%)

Νέο Προϊόν

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Το azoxystrobin ανήκει στην ομάδα των στρομπιλουρινών, είναι προστατευτικό με μερική διελασματική δράση και παρεμποδίσει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων. Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο σύμπλοκο III της αναπνευστικής αλυσίδας. Το difenoconazole είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο, που ανήκει στην ομάδα των τριαζολών. Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του συνιστάται στην παρεμπόδιση της απομεθυλίωσης του C14 κατά τη διαδικασία βιοσύνθεσης της εργοστερόλης.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Ζαχαρότευτλα	2|21	21
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Αγκινάρα	2|8-10	7
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Καρότο	3|14	14
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Κρεμμύδι	2|14	14
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Μελιτζάνα	3|8-10	3
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Τομάτα	2-3*|8-10	3

** Μέγιστο δύο (2) εφαρμογές ανά καλ. περίοδο για Περονόσπορο και τρεις (3) εφαρμογές για Αλτερνάρια και Ωίδιο.*

ELLATHION DP (Micronized) (sulphur 96%)

BIO

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	5|5-10	ΔΟ
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ: Τριανταφυλλιά	3|10-15	Μ/Ε
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Υ): Καρπούζι, Πεπόνι	3|10	ΔΟ
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Υ): Τομάτα	3|10	ΔΟ

FLUAZINOVA® 500 SC (fluazinam 50%)

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση. Το fluazinam παρεμποδίζει την παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα των παθογόνων με δράση στη λειτουργία της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης.

ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα	10|7-10	7

FOLLOW 80 WG (folpet 80%)

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση, κατά ευρέος φάσματος μυκητολογικών ασθενειών. Δρα σε πολλαπλά σημεία. Το δραστικό συστατικό folpet ανήκει στην ομάδα των φθαλιμιδίων και παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων των μυκήτων και την ανάπτυξη του μυκηλίου, μέσω πολλαπλής δράσης σε υποκυτταρικό επίπεδο (αναστέλλει την αναπνοή, επηρεάζει τη διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης και την κυτταροδιαίρεση).

Αμπέλι (οινοποιήσιμα σταφύλια)	8|10-14	28
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ): Τομάτα	3|7	7

FRAME 80 WG (sulphur 80%)

BIO

► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Αμυγδαλιά	8|7	ΔΟ
ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Φουντουκιά	2-8|7	ΔΟ
Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	8|10	ΔΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Ζαχαρότευτλα	2|14 (ωίδιο), 3|- (τετράνυχος)	Μ/Ε
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Ηλίανθος	2|7	ΔΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Καπνός	8|7	ΔΟ

Προϊόν Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Καλλιέργειες[α]	ΜΑΕ | ΜΕ[β]	PHI[γ,δ,ε] (ημέρες)

FRAME 80 WG (sulphur 80%)

BIO

► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Σόγια	2|14	ΔΟ
ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ: Λεύκα (φυτώριο)	3|7	Μ/Ε
Ελιά (ποικιλία πράσινη ελιά Χαλκιδικής)	2|30	90
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ	8|7	ΔΟ
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ: Τριανταφυλλιά	8|7	Μ/Ε
ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΙ ΘΑΜΝΟΙ: Βατόμουρα, Μύρτιλλα, Σμέουρα	6|14	ΔΟ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Αγκινάρα, Αντίδι κατσαρό, Καρότο (Θ+Υ), Κιχώριο, Κρεμμύδι, Λαγόχορτο, Λυκοτρίβολο, Μαρούλι και λοιπά σαλατικά, Παντζάρι, Παστινάκι, Ραδίκι, Ραπάνι, Σκαρόλα, Σκόρδο, Σπανάκι	8|7-10	ΔΟ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Θ+Υ): Κουνουπίδι, Λαχανάκι Βρυξελλών, Λάχανο, Μπρόκολο	8|7-15	ΔΟ
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ+Υ): Αγγουράκι, Αγγούρι, Καρπούζι, Κολοκυθάκι, Κολοκύθα, Πεπόνι	8|7-10	ΔΟ
Λυκίσκος	8|7	ΔΟ
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Μηλιά	8|7	ΔΟ
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Ροδακινιά	8|7	ΔΟ
ΣΙΤΗΡΑ: Βρώμη, Κριθάρι, Σίκαλη, Σιτάρι	2|14	ΔΟ
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ+Υ): Μελιτζάνα, Πιπεριά, Τομάτα	8|7-10	ΔΟ
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα	8|7	ΔΟ
ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ ΦΥΤΑ: Αβοκάντο, Λωτός, Μάνγκο, Παπάγια	8|7	ΔΟ
ΦΡΑΟΥΛΑ (Θ+Υ)	8|10-14	ΔΟ
ΨΥΧΑΝΘΗ: Μπιζέλι (αρακάς) (Θ+Υ) (φρέσκο με λοβό και χωρίς λοβό), Μπιζέλι ξηρό όσπριο (αρακάς, ρεβίθι), Φασόλι ξηρό (όσπριο), Φασόλι (Θ+Υ) (φρέσκο με λοβό και χωρίς λοβό)	8|7-10	ΔΟ

LAGOON 25 EW (tebuconazole 25%)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζολών) με προληπτική και θεραπευτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors - DMIs).

Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	2|14-21	14
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Σπαράγγι	1	ΔΟ
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Ροδακινιά	1	7
ΣΙΤΗΡΑ: Βρώμη, Κριθάρι, Σίκαλη, Σιτάρι, Triticale	1	28

METMAN 25 WP (metalaxyl 25%)

Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Το metalaxyl είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο που αναστέλλει την ανάπτυξη του παθογόνου και το σχηματισμό σπορίων παρεμποδίζοντας την πρωτεϊνική σύνθεση των μυκήτων. Η πρόσληψη της δραστικής είναι ταχεία μετά την εφαρμογή και η ακροπεταλική κυρίως κίνηση επιτρέπει την προστασία της νεαρής βλάστησης.

Αμπέλι* (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	2|21	14
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Γκρέιπφρουτ, Πορτοκαλιά	1-3**|14	14
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υ): Μαρούλι, Σκαρόλες (πικρίδα)/ Πλατύφυλλα αντίδια	3|10	14
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Μελιτζάνα (Θ+Υ), Πατάτα, Τομάτα (Θ+Υ)	3|10	14
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ): Πιπεριά	2|14	14
Φράουλα (Θ)	1	14

* *Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.*

** Μία (*1*) *εφαρμογή για στάγδην άρδευση και μέγιστο τρεις (3) εφαρμογές για ψεκασμό.*

MORGAN 80 WG (captan 80%)

► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Δρα σε πολλαπλά σημεία.

ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Αμυγδαλιά*, Καρυδιά*, Καστανιά*, Φιστικιά* (κελυφωτό φιστίκι)	4|7-14	ΔΟ

* *ΧΗΣ*

Προϊόν Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Καλλιέργειες[α]	ΜΑΕ | ΜΕ[β]	PHI[γ,δ,ε] (ημέρες)

MORGAN 80 WG (captan 80%)

► Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Αχλαδομηλιά, Κυδωνιά, Μηλιά	6-10**|7-14	28
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, Κερασιά	2|7-14	21
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Δαμασκηνιά, Ροδακινιά	4|7-14	21
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Υ): Τομάτα	4|7-14	21

*** Συνολικά 10 εφαρμογές σε εδάφη με PH<7,5 και μέχρι 6 εφαρμογές για εδάφη με PH>7,5.*

ORVEGO® 30/22,5 SC (ametoctradin 30% + dimethomorph 22,5%)

Νέο Προϊόν

Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση ασθενειών που οφείλονται σε παθογόνα της ομάδας των Ωομυκήτων (περονόσποροι). Είναι μίγμα δύο δραστικών ουσιών του ametoctradin, μυκητοκτόνου επαφής με προληπτική δράση και του dimethomorph διασυστηματικού μυκητοκτόνου με προληπτική και θεραπευτική δράση το οποίο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος των ωομυκήτων.

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Θ+Υ): Μαρούλι	2|7-10	7
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ: Αγγούρι (Θ+Υ), Κολοκυθάκι (Θ+Υ), Πεπόνι (Υ)	2|7-10	3
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα	3|5-10	7
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ+Υ): Τομάτα	3|7-10	3

PENCOL 10 EC (penconazole 10%)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Ανήκει στην ομάδα των Τριαζολών (DIMs) και δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση της εργοστερόλης.

Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	3|7-14	14
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ με εδώδιμο φλοιό (Θ+Υ): Αγγούρι, Κολοκυθάκι	3|7-14 (Θ), 2|10 (Υ)	3
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ με εδώδιμο φλοιό (Θ+Υ): Αγγουράκι (gherkin)	3|7-14 (Θ), 2|7-14 (Υ)	3
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ με εδώδιμο φλοιό (Θ+Υ): Καρπούζι, Κολοκύθα, Πεπόνι	3|7-14	3
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Μηλιά	3|7-14	14
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, Ροδακινιά	3|7-14	14
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ): Τομάτα	3|7-14	3

PIRGUS 80 WG (fosetyl-Al 80%)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Παρουσιάζει συμπλαστική και αποπλαστική κίνηση. Δρα παρεμποδίζοντας την βλάστηση των σπορίων του μύκητα και ταυτόχρονα ενισχύει τους μηχανισμούς άμυνας των φυτών.

Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	3|10	28
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Γκρέιπφρουτ, Κιτριά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Νεραντζιά, Περγαμόντο, Πορτοκαλιά, Φράπα	3|30	14
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ* (Θ+Υ)	1-3[1]|30, 1-2[2]|30	Μ/Ε
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Θ+Υ): Μαρούλι	4|10	15
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ+Υ): Αγγούρι	4|10	3
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ+Υ): Κολοκυθάκι, Κολοκύθι	1-3|8-10	3
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ+Υ): Καρπούζι, Κολοκύθα, Πεπόνι	1-2|8-10	3
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Αχλαδομηλιά, Κυδωνιά, Μηλιά, Μουσμουλιά	2-3[3]|30	15
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ+Υ): Τομάτα	4|10	3
Φράουλα (Θ+Υ)	1-3[4]|8-10	14

* Στα καλλωπιστικά φυτά *πριν την εφαρμογή του σκευάσματος να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.*

[1] Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος | [2] Ριζοπότισμα

[3] Μέγιστο δύο (2) εφαρμογές για βακτηρίωση και τρεις (3) εφαρμογές για φυτόφθορα λαιμού και ριζών.

[4] Μέγιστο μία (1) εφαρμογή για εμβάπτιση ριζώματος πριν τη φύτευση και 1-3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8-10 ημέρες για προληπτικούς ψεκασμούς έως την άνθηση (BBCH 12-59).

Προϊόν Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Καλλιέργειες[α]	MAE | ME[β]	PHI[γ,δ,ε] (ημέρες)

PROMESS 72,2 SL (propamocarb hydrochloride 72,2%)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Απορροφούμενο από τις ρίζες μεταφέρεται στα φύλλα. Στις εφαρμογές φυλλώματος εμφανίζει τοπικά διασυστηματική δράση.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ (Εφαρμογή στο έδαφος): Καπνός	1	21
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (Θ+Υ) (Εφαρμογή στο έδαφος)	-	Μ/Ε
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ+Υ) (Εφαρμογή στο έδαφος): Αγγούρι	1	21
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ) (Εφαρμογή στο φύλλωμα): Αγγούρι	3|8-10	3
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ+Υ) (Εφαρμογή στο φύλλωμα): Πεπόνι	3|8-10	7
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Εφαρμογή στο φύλλωμα): Πατάτα	3|10-14	15
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ+Υ) (Εφαρμογή στο έδαφος): Πιπεριά, Τομάτα	1	21

PROXANIL DUO SC (cymoxanil 5% + propamocarb HCl 40%)

Μυκητοκτόνο για τον έλεγχο του περονόσπορου (Phytopthora infestans) στην πατάτα και την τομάτα, με προστατευτική, θεραπευτική και αντισποριογόνο δράση. Το cymoxanil έχει προστατευτική και θεραπευτική δράση. Είναι τοπικά διασυστηματικό μυκητοκτόνο και παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων. Το propamocarb hydrochloride είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο που παρεμποδίζει τη μυκηλιακή ανάπτυξη καθώς και την παραγωγή και βλάστηση των σπορίων του μύκητα.

ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα	6|7	14
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ+Υ): Τομάτα	3|7-10	3

RIBBON 12 EC (myclobutanil 12%)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

Αμπέλι	3|-	21
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ: Γαρυφαλλιά	5|-	Μ/Ε
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ: Τριανταφυλλιά	5|7-14	Μ/Ε
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ: Αγγούρι, Καρπούζι, Κολοκύθι, Πεπόνι	5|7-10	7
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Μηλιά, Μουσμουλιά	4|-	21
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Ροδακινιά	3|-	21

SCALA® 40 SC (pyrimethanil 40%)

Νέο Προϊόν

Μυκητοκτόνο επαφής με διελασματική κίνηση. Περιέχει pyrimethanil, το οποίο ανήκει στην χημική ομάδα των ανιλινοπυριμιδινών, με δράση κυρίως κατά του βοτρύτη του αμπελιού και των άλλων κηπευτικών καλλιεργειών, του φουζικλαδίου της μηλιάς και της αχλαδιάς, των μετασυλλεκτικών ασθενειών των μηλοειδών, της φαιάς σήψης στην αμυγδαλιά και του καμαροσπορίου στη φιστικιά. Η βιολογική δράση του Scala® 40 SC στους ευαίσθητους παθογόνους μύκητες εντοπίζεται στην παρεμπόδιση της έκκρισης υδρολυτικών ενζύμων από τους μύκητες που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία προσβολής των φυτών. Χάρη σε αυτόν τον μηχανισμό δράσης, το Scala® 40 SC είναι αποτελεσματικό κατά στελεχών μυκήτων που δεν είναι επαρκώς ευαίσθητα σε άλλα βοτρυδιοκτόνα. Όσον αφορά στο φουζικλάδιο, η δράση του είναι τόσο προληπτική όσο θεραπευτική (ακόμη και 2-3 ημέρες μετά την προσβολή).

ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Αμυγδαλιά*, Φιστικιά*	2|7	30
Αμπέλι (οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο)	1 (οινοποιήσιμο), 3|14 (επιτραπέζιο)	21
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (Θ+Υ): Κυκλάμινο	4|7-10	Μ/Ε
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Καρότο (Υ), Μαρούλι (Θ+Υ), Σκαρόλα (Θ+Υ)	2|10-14	14
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υ): Κρεμμύδι	3|10	14
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ με εδώδιμο φλοιό (Θ): Αγγουράκι, Αγγούρι, Κολοκυθάκι	3|10-14	3
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Μηλιά	4|7-10 (φουζικλάδιο), 3|10 (προστασία από μετασυλλεκτικές ασθένειες)	7
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Μελιτζάνα (Θ+Υ), Πιπεριά (Θ), Τομάτα (Θ+Υ)	3|10-14	3
Φράουλα (Θ+Υ)	2|7-14 (Θ), 3|7-14 (Υ)	3
ΨΥΧΑΝΘΗ (Θ): Φασολάκι	2|10-14	14

** ΧΗΣ*

Προϊόν Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Καλλιέργειες[α]	ΜΑΕ | ΜΕ[β]	PHI[γ,δ,ε] (ημέρες)

SIVAR 25 SC (azoxystrobin 25%)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση. Έχει και διελασματική κίνηση. Τρόπος δράσης: αναστολή της μιτοχονδριακής αναπνοής, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της βλάστησης και παραγωγής σπορίων και την αναστολή ανάπτυξης μυκηλίου του μύκητα.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ): Αγγουράκι, Αγγούρι, Καρπούζι, Κολοκύθα, Κολοκυθάκι, Πεπόνι	3|10	3
ΣΙΤΗΡΑ: Ρύζι	1	28
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ): Τομάτα	2|10	3

SIVAR GOLD 25,5/6,25 SC (potassium phosphonates 25,5% + azoxystrobin 6,25%)

Νέο Προϊόν

Μυκητοκτόνο μείγμα δύο δραστικών ουσιών (potassium phosphonates + azoxystrobin) με προληπτική και διασυστηματική δράση. Η δ.ο. potassium phosphonates δρα σε πολλαπλές θέσεις. Επιβραδύνει την ανάπτυξη των παθογόνων, παρεμποδίζει την παραγωγή σπορίων και αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό του μύκητα ενισχύοντας τη φυσική άμυνα των φυτών. Η δ.ο. azoxystrobin είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο με μερική διελασματική δράση που παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων, ελέγχοντας ένα μεγάλο εύρος μυκήτων.

Αμπέλι (οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες σταφυλιών)	1	15
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Ροδακινιά	3|-	15
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ+Υ): Μελιτζάνα, Τομάτα	3|10	0
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα	3|10	15

URANSER SL (potassium phosphonate 51,57%)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική δράση. Δρα σε πολλαπλές θέσεις (multi-site contact group M1). Μετά την εφαρμογή, δρα σε δύο στάδια: Επιβραδύνει την ανάπτυξη των παθογόνων, παρεμποδίζει την παραγωγή σπορίων και αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό του μύκητα ενισχύοντας την φυσική άμυνα των φυτών.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Ροδακινιά	3|14	14

WETTASUL DP (Micronized) (sulphur 96%)

BIO

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση για την καταπολέμηση του ωιδίου στο αμπέλι.

Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	4|5-10	5

Χαλκούχα Μυκητοκτόνα

Προϊόν Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Καλλιέργειες[α]	ΜΑΕ | ΜΕ[β]	PHI[γ,δ,ε] (ημέρες)
BORDO 20 WG (Μεταλλικός χαλκός 20%, σε μορφή βορδιγάλειου πολτού) BIO		
Ανόργανο μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση.		
ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Αμυγδαλιά, Καρυδιά	3 | -	28
Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	3 | -	21
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Ζαχαρότευτλα	4 | -	21
Ελιά	2 | -	21
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Γκρέιπφρουτ, Κιτριά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Νεραντζιά, Πορτοκαλιά, Φράπα	2 | -	21
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ	3 | -	Μ/Ε
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Κουνουπίδι, Κρεμμύδι, Λάχανο, Μαρούλι, Πράσο, Σέλινο, Σπανάκι	4 | -	7
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ: Αγγούρι, Καρπούζι, Κολοκύθι, Πεπόνι	4 | -	7
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά	2 | -	ΔΟ
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, Βυσσινιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Ροδακινιά	2 | -	ΔΟ
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα	3 | -	21
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πιπεριά	4 | -	7
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ+Υ): Τομάτα	3 | -	7 (Θ), 10 (Υ)
ΨΥΧΑΝΘΗ: Φασόλι	4 | -	7
BORDO 20 WP (Μεταλλικός χαλκός 20%, σε μορφή βορδιγάλειου πολτού) BIO		
Ανόργανο μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση.		
ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Αμυγδαλιά, Καρυδιά	3 | -	28
Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	3 | -	21
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Ζαχαρότευτλα	4 | -	21
Ελιά	2 | -	21
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Γκρέιπφρουτ, Κιτριά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Νεραντζιά, Πορτοκαλιά, Φράπα	2 | -	21
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ	3 | -	Μ/Ε
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Κουνουπίδι, Κρεμμύδι, Λάχανο, Μαρούλι, Πράσο, Σέλινο, Σπανάκι	4 | -	7
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ: Αγγούρι, Καρπούζι, Κολοκύθι, Πεπόνι	4 | -	7
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά	2 | -	ΔΟ
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, Βυσσινιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Ροδακινιά	2 | -	ΔΟ
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα	3 | -	21
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πιπεριά	4 | -	7
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ+Υ): Τομάτα	3 | -	7 (Θ), 10 (Υ)
ΨΥΧΑΝΘΗ: Φασόλι	4 | -	7
COURE FLOW 38 SC (Μεταλλικός χαλκός 38%, σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού) BIO		► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*
Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.		
ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φουντουκιά	3 | -	28
ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Φιστικιά	4 | -	28
Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	3 | -	21
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Ζαχαρότευτλα	3 | 10-14	21
Ελιά	2 | -	21

Προϊόν Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Καλλιέργειες[α]	ΜΑΕ | ΜΕ[β]	PHI[γ,δ,ε] (ημέρες)

COURE FLOW 38 SC (Μεταλλικός χαλκός 38%, σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού) BIO

► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Γκρέιπφρουτ, Κιτριά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Νεραντζιά, Πορτοκαλιά	2 | -	21
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ	2 | 7-10	Μ/Ε
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Αγκινάρα, Καρότο, Κουνουπίδι, Κρεμμύδι, Λάχανο, Μαρούλι, Πράσο, Ραδίκι, Ραπάνι, Σέλινο, Σπανάκι	3 | 7-14	7
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μηλιά	3 | -	ΔΟ
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Ροδακινιά	4 | -	ΔΟ
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα	2 | 7-10	21
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πιπεριά	3 | 7-14	7
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ+Υ): Τομάτα	2 | -	7 (Θ), 10 (Υ)
ΨΥΧΑΝΘΗ: Μπιζέλι, Φασόλι	3 | 7-14	7

CUPRICO 50 WP (Μεταλλικός χαλκός 50%, σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού) BIO

Μυκητοκτόνο - βακτηριοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Αμυγδαλιά, Καρυδιά	3 | -	28
ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Φιστικιά	4 | -	28
ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Φουντουκιά	2 | -	28
Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	3 | -	21
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Ζαχαρότευτλα	4 | 10-14	21
Ελιά	2 | -	21
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Γκρέιπφρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά	2 | -	21
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Σέλινο	3 | 7-10	7
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ+Υ): Αγγούρι, Καρπούζι, Κολοκύθι, Πεπόνι	4 | 10-14	7
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Μηλιά	3 | -	ΔΟ
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά	3 | -	ΔΟ
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Δαμασκηνιά, Κερασιά, Ροδακινιά	4 | -	ΔΟ
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα	4 | 10-14	21
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πιπεριά (Θ+Υ), Τομάτα (Θ)	3 | 7-14	7
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Υ): Τομάτα	3 | 10-14	10
ΨΥΧΑΝΘΗ: Αραχίδα	3 | 7-10	21
ΨΥΧΑΝΘΗ: Φασόλι	3 | 7-14	7

CURENOX 50 WG (Μεταλλικός χαλκός 50%, σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού) BIO

► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φουντουκιά	3 | -	28
ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Φιστικιά	4 | -	28
Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	3 | 10	21
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Ζαχαρότευτλα	3 | 10-14	21
Ελιά	2 | -	21
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Γκρέιπφρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Νεραντζιά, Πορτοκαλιά	2 | -	21
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ	2 | 7-10	Μ/Ε
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Καρότο, Κουνουπίδι, Κρεμμύδι, Λάχανο, Μαρούλι, Πράσο, Σέλινο	3 | 7-14	7
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Μηλιά	3 | -	ΔΟ
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Ροδακινιά	4 | -	ΔΟ
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα	2 | 7-10	21

Προϊόν Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Καλλιέργειες[α]	ΜΑΕ | ΜΕ[β]	PHI[γ,δ,ε] (ημέρες)

CURENOX 50 WG (Μεταλλικός χαλκός 50%, σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού)

BIO

► Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πιπεριά	3 | 7-14	7
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ+Υ): Τομάτα	2 | -	7 (Θ), 10 (Υ)
ΨΥΧΑΝΘΗ: Μπιζέλι, Φασόλι	3 | 7-14	7

HYDROPLUS NEW 40 WG (Μεταλλικός χαλκός 40%, σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού)

BIO

Μυκητοκτόνο - βακτηριοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Αμυγδαλιά, Φιστικιά	3 | -	28
ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Καρυδιά	3 | 10	28
ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Φουντουκιά	2 | -	28
Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	3 | -	21
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Ζαχαρότευτλα	4 | 10-14	21
Ελιά	2 | -	21
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Γκρέιπφρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά	3 | -	21
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Καρότο	4 | 7-10	7
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Σέλινο	3 | 7-10	7
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ+Υ): Αγγούρι, Καρπούζι, Κολοκύθι, Πεπόνι	4 | 10-14	7
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Μηλιά	3 | -	ΔΟ
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά	3 | -	ΔΟ
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Δαμασκηνιά, Κερασιά, Ροδακινιά	4 | -	ΔΟ
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα	4 | 10-14	21
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πιπεριά (Θ+Υ), Τομάτα (Θ)	3 | 7-14	7
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Υ): Τομάτα	3 | 7-14	10
ΨΥΧΑΝΘΗ: Αραχίδα	3 | 7-10	21
ΨΥΧΑΝΘΗ: Φασόλι	3 | 7-14	7

ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP (Μεταλλικός χαλκός 50%, σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού)

BIO

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	3 | -	21
Ελιά	2 | -	21
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Γκρέιπφρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά	2 | -	21
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Αγκινάρα, Καρότο, Κουνουπίδι, Κρεμμύδι, Λάχανο, Μαρούλι, Πράσο, Ραδίκι, Ραπάνι, Σέλινο, Σπανάκι	3 | 7-14	7
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ: Αγγούρι, Καρπούζι, Κολοκύθι, Πεπόνι	3 | 7-14	7
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Κυδώνια, Μηλιά	3 | -	ΔΟ
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Ροδακινιά	4 | -	ΔΟ
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα	2 | 7-10	21
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πιπεριά	3 | 7-14	7
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ+Υ): Τομάτα	2 | -	7 (Θ), 10 (Υ)
ΨΥΧΑΝΘΗ: Μπιζέλι, Φασόλι	3 | 7-14	7

d

ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP (Μεταλλικός χαλκός 50%, σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού)

BIO

► Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φουντουκιά	3 | -	28

Προϊόν Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Καλλιέργειες[α]	ΜΑΕ | ΜΕ[β]	PHI[γ,δ,ε] (ημέρες)

ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP (Μεταλλικός χαλκός 50%, σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού)

BIO

► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Φιστικιά	4 | -	28
Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	3 | -	21
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Ζαχαρότευτλα	3 | 10-14	21
Ελιά	2 | -	21
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Γκρέιπφρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Νεραντζιά, Πορτοκαλιά	2 | -	21
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ	2 | 7-10	Μ/Ε
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Καρότο, Κουνουπίδι, Κρεμμύδι, Λάχανο, Μαρούλι, Πράσο, Σέλινο	3 | 7-14	7
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Μηλιά	3 | -	ΔΟ
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Ροδακινιά	4 | -	ΔΟ
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα	2 | 7-10	21
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πιπεριά	3 | 7-14	7
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ+Υ): Τομάτα	2 | -	7 (Θ), 10 (Υ)
ΨΥΧΑΝΘΗ: Μπιζέλι, Φασόλι	3 | 7-14	7

Ζιζανιοκτόνα

Προϊόν **Φάσμα** (καταπολεμούμενα ζιζάνια)	**Φάσμα** (καλλιέργειες[α])		**ΜΑΕ**| **ΜΕ**[β]	**PHI**[γ,δ,ε] (ημέρες)

ABILEST® 455 CS (pendimethalin 45,5%)

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων. Στο βιοχημικό επίπεδο επηρεάζει τη λειτουργία της μίτωσης με παρεμπόδιση του σχηματισμού των μικροσωληνίσκων της μιτωτικής ατράκτου.

Αγρωστώδη Ζιζάνια: Αγριοβρώμη*, Αιματόχορτο, Μουχρίτσα, Σετάρια πράσινη, Σετάρια σπονδυλωτή. **Πλατύφυλλα Ζιζάνια**: Αγριοβαμβακιά*, Αγριοπιπεριά, Αναγαλλίς, Αντράκλα (ή Γλιστρίδα), Βερόνικα, Βλήτο πλαγιαστό, Βλήτο τραχύ, Ζωχός, Ηλιοτρόπιο κοινό, Καπνόχορτο*, Κολλητσίδα*, Κουφάγκαθο, Λουβουδιά, Μαρτιάκος, Παπαρούνα κοινή, Πολύγωνο αναρριχώμενο, Πολυκόμπι, Ρανούγκουλος*, Ραπανίδα*, Σινάπι άγριο, Στελλάρια, Στύφνος, Τριβόλι. ** Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια*	Αμπέλι	1	ΔΟ
	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Βαμβάκι, Ηλίανθος, Καπνός, Σόγια	1	ΔΟ
	ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Γκρέιπφρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Φράπα	1	ΔΟ
	ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (φυτώρια, δένδρα)	1	ΔΟ
	ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Αγκινάρα, Καρότο, Κουνουπίδι, Κρεμμύδι, Λάχανο, Μαρούλι, Μπρόκολο, Σκόρδο	1	ΔΟ
	ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Μηλιά	1	ΔΟ
	ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, Ροδακινιά	1	ΔΟ
	ΣΙΤΗΡΑ: Αραβόσιτος, Κριθάρι, Σίκαλη, Σιτάρι, Τριτικάλε	1	ΔΟ
	ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα, Τομάτα	1	ΔΟ
	Φράουλα	1	ΔΟ
	ΨΥΧΑΝΘΗ: Κουκιά (όσπρια ξηρά), Μπιζέλι, Μπιζέλι (όσπρια ξηρά)	1	ΔΟ

BUZIN 70 WG (metribuzin 70% β/β)

Νέο Προϊόν

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε πατάτα, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά. Δρα παρεμποδίζοντας τη λειτουργία του φωτοσυστήματος ΙΙ της φωτοσύνθεσης. Απορροφάται από τις ρίζες και το φύλλωμα των ζιζανίων και μεταφέρεται προς το πάνω μέρος του φυτού.

Καταπολεμούμενα ζιζάνια: **Προφυτρωτική εφαρμογή**: Πολύ ευαίσθητα: Σκαρολάχανο. Ευαίσθητα: Βλήτο, Λουβουδιά, Μουχρίτσα, Πολυκόμπι. Μετρίως ευαίσθητα: Αγριοντοματιά ή Στύφνος. **Μεταφυτρωτική εφαρμογή**: Πολύ ευαίσθητα: Σκαρολάχανο. Ευαίσθητα: Λουβουδιά, Μουχρίτσα, Πολυκόμπι. Μετρίως ευαίσθητα: Αγριοντοματιά ή Στύφνος, Βλήτο.	ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα*	1	60

** Η εφαρμογή του σκευάσματος συνιστάται σε ποικιλίες πατάτας που δεν είναι ευαίσθητες στο Metribuzin.*

DICASH 48 SL (dicamba 48%, ως άλας dimethylammonium)

Εκλεκτικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες και μεταφέρεται σε όλο το φυτό. Δρα αναστέλλοντας την ανάπτυξη των ζιζανίων.

Πλατύφυλλα Ζιζάνια: Αγριοβαμβακιά*, Αγριοπιπεριά*, Βλήτο τραχύ*, Κίρσιο**, Λουβουδιά*, Περικοκλάδα**, Περικοκλάδα (μεγάλη)*, Στύφνος**, Τάτουλας**. **Ευαίσθητα ζιζάνια* ***Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια*	ΣΙΤΗΡΑ: Αραβόσιτος	1	ΔΟ

DIQUELL 20 SL (diquat 20%)

Χρησιμοποιείται σαν αποφυλλωτικό στην καλλιέργεια της πατάτας με σκοπό να διευκολυνθεί η συγκομιδή.

Αποξήρανση στελεχών πριν τη συγκομιδή (Πατάτα)*	ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα*	1	10

**Κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά (άρθρο 53 του Καν. 1107/2009/ΕΚ).*

Προϊόν **Φάσμα** (καταπολεμούμενα ζιζάνια)	**Φάσμα** (καλλιέργειες[α])		**ΜΑΕ | ΜΕ**[β] **PHI**[γ,δ,ε] (ημέρες)

ETERNITY 31,25/18,75 SE (S-metolachlor 31,25% + terbuthylazine 18,75%)

Νέο Προϊόν

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Το S-metolachlor απορροφάται κυρίως από το στέλεχος και το κολεόπτιλο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια παρεμποδίζεται η διαίρεση των κυττάρων και η ανάπτυξη βλαστών και ριζών. Το terbuthylazine δρα ως παρεμποδιστής του φωτοσυστήματος ΙΙ της φωτοσύνθεσης.

Προσπαρτική ή Προφυτρωτική εφαρμογή:
Ευαίσθητα*:
Αγριοντοματιά, Αιματόχορτο, Βλήτα, Γλυστρίδα, Λουβουδιά, Μουχρίτσα, Πολυκόμπι, Σετάρια, Τάτουλας.

Μετρίως ευαίσθητα*:
Αγριοβαμβακιά.

Μεταφυτρωτική εφαρμογή:
Ευαίσθητα**:
Αγριοντοματιά, Βλήτο, Γλυστρίδα, Μουχρίτσα, Σετάρια.

Μετρίως ευαίσθητα**:
Αγριοβαμβακιά, Αιματόχορτο, Λουβουδιά, Πολυκόμπι, Σετάρια, Τάτουλας.

ΣΙΤΗΡΑ: Αραβόσιτος	1 εφαρμογή κάθε 3 χρόνια	ΔΟ

FENHEX 24 EC (oxyfluorfen 24%)

Νέο Προϊόν

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων, μεταφυτρωτικά. Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης.

Ευαίσθητα ζιζάνια (>85%):
Άγρια ρόκα, Αγριοβρώμη, Αντράκλα, Λουβουδιά, Περιπλοκάδα.

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια (70-85%):
Καλεντούλα, Οξαλίδα, Τριβόλι.

Αμπέλι (Οινοποιήσιμα, Επιτραπέζια)	1	180
Ελιά	1	21 (7)*
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Γκρέιπφρουτ, Κιτριά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά	1	21
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Αχλαδομηλιά, Κυδωνιά, Μηλιά, Μουσμουλιά	1	180
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, Βυσσινιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Κορομηλιά, Ροδακινιά	1	180

** 21 ημέρες παρουσία ελιών στο έδαφος, 7 ημέρες χωρίς παρουσία ελιών στο έδαφος.*

FLUTON 50 SC (fluometuron 50%)

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στο βαμβάκι. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από το φύλλωμα και δρα διασυστηματικά παρεμποδίζοντας τη φωτοσύνθεση.

Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Ευαίσθητα ζιζάνια: Άγριο σινάπι, Αγριομελιτζάνα, Αγριοντοματιά, Αγριοπιπεριά, Αντράκλα (ή Γλιστρίδα), Βλήτα, Λάπαθο, Λουβουδιά, Μαρτιάκος, Πολυκόμπι, Χαμομήλι.

Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοβαμβακιά, Μουχρίτσα, Σετάρια, Τάτουλας.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Βαμβάκι	1	ΔΟ (προφυτρωτικά αμέσως μετά τη σπορά, BBCH 00-09)

FOCUS® 10 EC (cycloxydim 10%)

► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

Εκλεκτικό, διασυστηματικό, μεταφυτευτικό ζιζανιοκτόνο, το οποίο καταπολεμά ετήσια και πολυετή ζιζάνια. Το FOCUS® 10 EC περιέχει το δραστικό συστατικό cycloxydim, που ανήκει στη χημική ομάδα των κυκλοεξανοδιονών. Το cycloxydim απορροφάται από τα φύλλα και παρεμποδίζει το σχηματισμό των μεριστωματικών ιστών των ευαίσθητων ζιζανίων. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει την καρβοξυλάση του ακετυλοσυνενζύμου Α στη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων.

Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 200 κ.εκ./στρέμμα:

α. ευαίσθητα:

Άγρια είδη κριθαριού (*Hordeum* spp.) και βρώμης (*Avena* spp.), Αιματόχορτο, Βέλιουρας, Βρόμος, Λεπτόχλοα, Μουχρίτσα, Πάνικο, Σετάρια, Φάλαρη, Φέστουκα, φυτά-εθελοντές σιταριού, κριθαριού και βρώμης.

β. μετρίως ευαίσθητα:

Αλεπονουρά, Πολύανθη ήρα.

Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες, σταφίδα)	1	42
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ	1	28
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Βαμβάκι, Ελαιοκράμβη, Ζαχαρότευτλα, Ηλίανθος	1	ΔΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Σόγια	1	56
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Αντράκλα, Ασκαλώνιο, Κρεμμύδι, Λευκό Λάχανο, Σκόρδο, Σπανάκι	1	28
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Γαιοκάρδαμο, Κάρδαμο, Κόκκινο Σινάπι, Λυκοτρίβολο, Μαρούλι, Σκαρόλα	1	21

Προϊόν **Φάσμα** (καταπολεμούμενα ζιζάνια)	**Φάσμα** (καλλιέργειες[α])	ΜΑΕ | ΜΕ[β]	PHI[γ,δ,ε] (ημέρες)

FOCUS® 10 EC (cycloxydim 10%)

► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 400 κ.εκ./στρέμμα: **α. ευαίσθητα:** Κόκκινο ρύζι. **β. μετρίως ευαίσθητα**: Αγριάδα. **Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 500 κ.εκ./στρέμμα:** **α. μετρίως ευαίσθητα:** Αγρόπυρο.	ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Γογγύλι, Λαγόχορτο, Παντζάρι, Παστινάκι, Σελινόριζα, Χρένο	1	ΔΟ
	ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Καρότο, Ραπανάκι	1	35
	ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Λαχανάκια Βρυξελλών, Πράσο, Φρέσκο κρεμμυδάκι, Φυλλώδεις κράμβες (Κινέζικο λάχανο, Κόκκινο λάχανο)	1	42
	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ: Κτηνοτροφικό τεύτλο	1	ΔΟ
	ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Μηλιά, Κυδωνιά	1	28
	ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Μελιτζάνα, Τομάτα	1	42
	ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα	1	56
	ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πιπεριά	1	21
	ΨΥΧΑΝΘΗ: Λούπινο, Μπιζέλι (ξερό), Φακή, Ρεβίθι, Φασόλι (ξερό)	1	56
	ΨΥΧΑΝΘΗ: Φασόλι (φρέσκο με λοβό)	1	28

GENOXONE® ZX (triclopyr 10,36% + 2,4-D 9,3%)

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για θάμνους, βάτα/ πουρνάρια, ξυλώδη φυτά και άλλα πλατύφυλλα ζιζάνια.

Ακαλλιέργητες εκτάσεις: Βάτα, Θάμνοι, Ξυλώδης βλάστηση, Πουρνάρια **Πλατύφυλλα Ζιζάνια:** *Geum urbanum**, Αγριοράδικο**, Γεράνιο*, Επιλόβιο*, Κίρσιο*, Τσουκνίδα* Αποξήρανση κούτσουρων, κομμένων κορμών. **Ευαίσθητα ζιζάνια* ***Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια*	Ακαλλιέργητες εκτάσεις	1	Μ/Ε

HELSTAR 6,9 EW (fenoxaprop-p-ethyl 6,9%)

Μεταφυτρωτικό, διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι και κριθάρι. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και τον βλαστό και μεταφέρεται στις ρίζες και στα ριζώματα. Μετά την εφαρμογή οι νεότεροι ιστοί των φύλλων γίνονται χλωρωτικοί (κίτρινοι) ή νεκρωτικοί (καφέ) και τα φύλλα αποσχίζονται εύκολα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η νέκρωση των ζιζανίων.

Ευαίσθητα ζιζάνια: **Αγρωστώδη Ζιζάνια:** Αγριοβρώμη, Αλεπονουρά, Ανεμόχορτο, Σετάρια, Τραχεία λειβαδοπόα.	ΣΙΤΗΡΑ: Κριθάρι, Σιτάρι (σκληρό και μαλακό)	1	ΔΟ

IFESTOS TF 36 SL (glyphosate 36%)

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάγχης του καπνού. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

Αγρωστώδη Ζιζάνια: Αγριάδα, Βέλιουρας, Κύπερη **Πλατύφυλλα Ζιζάνια:** Αντράκλα (ή Γλιστρίδα), Μολόχα, Περικοκλάδα, Πολυκόμπι, Τσουκνίδα, Φτέρη. **Ξυλώδη Ζιζάνια:** Βάτα, Ξυλώδεις θάμνοι. **Παρασιτικά Ζιζάνια:** Οροβάγχη. **Υδροχαρή Ζιζάνια** (σε αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια).	Αγροί (μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά)	1	Μ/Ε
	Ακαλλιέργητες εκτάσεις	1-2 | -	Μ/Ε
	ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Αμυγδαλιά	1-2 | -	7
	Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	1-2 | -	7
	Αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια	1	Μ/Ε
	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Βαμβάκι	1	7
	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Καπνός	2 | -	7
	Ελιά	1-2 | -	7
	ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Γκρέιπφρουτ, Κιτριά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά	1-2 | -	7
	ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Μηλιά	1-2 | -	7
	ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά	1-2 | -	7

Προϊόν **Φάσμα** (καταπολεμούμενα ζιζάνια)	**Φάσμα** (καλλιέργειες[α])	ΜΑΕ | ΜΕ[β]	PHI[γ,δ,ε] (ημέρες)

IPIGLYCE NEW 36 SL (glyphosate 36%)

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάγχης του καπνού. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

Προϊόν **Φάσμα** (καταπολεμούμενα ζιζάνια)	**Φάσμα** (καλλιέργειες[α])	ΜΑΕ | ΜΕ[β]	PHI[γ,δ,ε] (ημέρες)
Αγρωστώδη Ζιζάνια: Αγριάδα, Βέλιουρας, Κύπερη. **Πλατύφυλλα Ζιζάνια:** Αντράκλα (ή Γλιστρίδα), Κίρσιο, Μολόχα, Περικοκλάδα, Πολυκόμπι, Τσουκνίδα, Φτέρη. **Ξυλώδη Ζιζάνια:** Βάτα, Ξυλώδεις θάμνοι. **Παρασιτικά Ζιζάνια:** Οροβάγχη. **Υδροχαρή Ζιζάνια** (σε αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια).	Αγροί (μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά)	1	Μ/Ε
	Ακαλλιέργητες εκτάσεις	1-2 | -	Μ/Ε
	ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Αμυγδαλιά	1-2 | -	7
	Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	1-2 | -	7
	Αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια	1	Μ/Ε
	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Βαμβάκι	1	7
	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Καπνός	2 | -	7
	Ελιά	1-2 | -	7
	ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Γκρέιπφρουτ, Κιτριά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά	1-2 | -	7
	ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλάδια, Μηλιά	1-2 | -	7
	ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά	1-2 | -	7

KEYNERON GREEN 36 SL (glyphosate 36%)

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάγχης του καπνού. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

Προϊόν **Φάσμα** (καταπολεμούμενα ζιζάνια)	**Φάσμα** (καλλιέργειες[α])	ΜΑΕ | ΜΕ[β]	PHI[γ,δ,ε] (ημέρες)
Αγρωστώδη Ζιζάνια: Αγριάδα, Βέλιουρας, Κύπερη. **Πλατύφυλλα Ζιζάνια:** Αντράκλα (ή Γλιστρίδα), Κίρσιο, Μολόχα, Περικοκλάδα, Πολυκόμπι, Τσουκνίδα, Φτέρη. **Ξυλώδη Ζιζάνια:** Βάτα, Ξυλώδεις θάμνοι. **Παρασιτικά Ζιζάνια:** Οροβάγχη. **Υδροχαρή Ζιζάνια** (σε αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια).	Αγροί (μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά)	1	Μ/Ε
	Ακαλλιέργητες εκτάσεις	1-2 | -	Μ/Ε
	ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Αμυγδαλιά	1-2 | -	7
	Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	1-2 | -	7
	Αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια	1	Μ/Ε
	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Βαμβάκι	1	7
	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Καπνός	2 | -	7
	Ελιά	1-2 | -	7
	ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Γκρέιπφρουτ, Κιτριά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά	1-2 | -	7
	ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλάδια, Μηλιά	1-2 | -	7
	ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά	1-2 | -	7

LUPO 365 CS (pendimethalin 36,5%)

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Στο βιοχημικό επίπεδο επηρεάζει τη λειτουργία της μίτωσης με παρεμπόδιση του σχηματισμού των μικροσωληνίσκων της μιτωτικής ατράκτου.

Προϊόν **Φάσμα** (καταπολεμούμενα ζιζάνια)	**Φάσμα** (καλλιέργειες[α])	ΜΑΕ | ΜΕ[β]	PHI[γ,δ,ε] (ημέρες)
Αγρωστώδη Ζιζάνια: Αιματόχορτο, Αλεπονουρά, Κοινή πόα, Μουχρίτσα, Πάνικο διχοτομικό, Σετάρια πράσινη, Σετάρια σπονδυλωτή. **Πλατύφυλλα Ζιζάνια**: Αγριοντοματιά ή στύφνος, Αγριοπανσές (κοινός), Αγριοπιπεριά, Αναγαλλίδα, Αναρριχώμενο πολύγονο, Αντράκλα, Βερόνικα, Βλήτο (πλαγιαστό), Βλήτο (τραχύ), Γαλατσίδες, Ζωχός, Καρδαμίνα, Καψέλλα, Λαπάτσα, Λουβουδιά, Πολυκόμπι, Στάχυς, Στελλάρια, Τσουκνίδα (μικρή).	ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φουντουκιά	1	ΔΟ
	Αμπέλι	1	ΔΟ
	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Βαμβάκι, Ηλίανθος, Καπνός, Σόγια	1	ΔΟ
	ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά	1	ΔΟ
	ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ	1	ΔΟ
	ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Καρότο, Κρεμμύδι, Μαρούλι, Σκόρδο	1	ΔΟ
	ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Μηλιά	1	ΔΟ
	ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, Κερασιά, Νεκταρινιά, Ροδακινιά	1	ΔΟ
	ΣΙΤΗΡΑ: Αραβόσιτος, Σιτάρι	1	ΔΟ
	ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα, Πιπεριά, Τομάτα	1	ΔΟ
	ΨΥΧΑΝΘΗ: Αρακάς, Φασολάκια νωπά, Φασόλι	1	ΔΟ

Προϊόν **Φάσμα** (καταπολεμούμενα ζιζάνια)	**Φάσμα** (καλλιέργειες[α])	**ΜΑΕ | ΜΕ**[β]	**PHI**[γ,δ,ε] (ημέρες)

MAZA 4 SL (imazamox 4%)

Νέο Προϊόν

Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό, ζιζανιοκτόνο με δράση από το φύλλωμα και το έδαφος για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων σε υβρίδια/ποικιλίες Ηλίανθου, τα οποία είναι ανθεκτικά σε ιμιδαζολινονικά ζιζανιοκτόνα. Το imazamox (ομάδα ιμιδαζολινονών) αναστέλλει τη δράση της συνθετάσης του ακετογαλακτικού (ALS).

Πλατύφυλλα ζιζάνια Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοβαμβακιά, Βλήτα, Σκαρολάχανο. Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Λουβουδιά.	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Ηλίανθος*	1	ΔΟ

** Χρησιμοποιείται μόνο σε υβρίδια/ ποικιλίες ηλίανθου τα οποία είναι ανθεκτικά σε ιμιδαζολινονικά ζιζανιοκτόνα.*

MESOLON 10 SC (mesotrione 10%)

Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων στον Αραβόσιτο. Απορροφάται κυρίως και ταχέως από τα φύλλα. Τα ζιζανιοκτόνα της ομάδας των τρικετονών παρεμποδίζουν τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών με δράση στο ένζυμο 4-HPPD.

1) **Ευαίσθητα ζιζάνια** (στη δόση των 75 κ.εκ./ στρέμμα): Άγριο βλήτο, Αγριοβαμβακιά, Αγριομελιτζάνα, Αγριοντοματιά, Λουβουδιά, Τάτουλας, Τραχύ βλήτο 2) Στη δόση των 150 κ.εκ./ στρέμμα περιορίζει την ανάπτυξη ετησίων αγρωστωδών ζιζανίων και κύπερης. 3) Μουχρίτσα (στη δόση των 150 κ.εκ./ στρέμμα).	ΣΙΤΗΡΑ: Αραβόσιτος	1	Τελευταία εφαρμογή στο στάδιο των 9 φύλλων (BBCH 19)

MODETT® 25/28 SE (terbuthylazine 25% + dimethenamid-p 28%)

Ζιζανιοκτόνο μίγμα της δραστικής ουσίας dimethenamid-p που ανήκει στην ομάδα των χλωροακεταμιδίων και της δραστικής ουσίας terbuthylazine που ανήκει στην ομάδα των χλωροτριαζινών. Εφαρμόζεται προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή μετασπαρτικά-προφυτρωτικά για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων.

Ετήσια Πλατύφυλλα Ζιζάνια: Αγριοβαμβακιά, Αγριομελιτζάνα, Αγριοντοματιά, Αγριοπιπεριά, Αλμυρίδι, Αναγαλλίς, Αντράκλα (ή Γλιστρίδα), Βερόνικα, Βλήτα, Γκαλινσονγκα, Ιπομέα, Καπνόχορτο, Κολλητσίδα, Λαπάτσα, Λουβουδιά, Μαρτιάκος, Παπαρούνα κοινή, Πολύγωνο αναρριχώμενο, Πολυκόμπι, Σινάπι άγριο, Σκαρολάχανο, Στελλάρια, Τάτουλας, Χαμομήλι, *Acalypha virginica*, *Bidens tripartita*, *Chenopodium ficifolium*, *Galium palustre.* **Ετήσια Αγρωστώδη Ζιζάνια**: Αιματόχορτο, Μουχρίτσα, Πάνικο (κεχρί), Σετάριες.	ΣΙΤΗΡΑ: Αραβόσιτος	1 εφαρμογή ανά 3 χρόνια στον ίδιο αγρό	ΔΟ

NICOSH 4 OD (nicosulfuron 4%)

Διασυστηματικό και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες αραβοσίτου. Το nicosulfuron δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξειγαλακτικού.

Αγρωστώδη Ζιζάνια: Βέλιουρας (από σπόρο, από ρίζωμα), Μουχρίτσα, Σετάριες. **Πλατύφυλλα Ζιζάνια**: Βλήτα, Τάτουλας.	ΣΙΤΗΡΑ: Αραβόσιτος	1-2* | 7-14	ΔΟ

** Όταν έχουμε σταδιακή εμφάνιση των ζιζανίων στο χρόνο, συνιστώνται δύο (2) εφαρμογές σε μεσοδιάστημα 7-14 ημερών, ως εξής: 1η εφαρμογή με δόση 100 κ.εκ./ στρέμμα και 2η εφαρμογή με δόση 50 κ.εκ./ στρέμμα.*

NIMBLE® 50/25 WG (thifensulfuron methyl 50% + tribenuron methyl 25%)

► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

Εκλεκτικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των σουλφονυλουριών για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι, κριθάρι. Απορροφάται από το φύλλωμα και από τη ρίζα των ζιζανίων. Το NIMBLE® 50/25 WG είναι μίγμα δύο δραστικών συστατικών (tribenuron methyl και thifensulfuron methyl) που δρουν αναστέλλοντας το ένζυμο ακετογαλακτική συνθετάση (ALS). Η καταστροφή των ζιζανίων επέρχεται μετά από 1 έως 3 εβδομάδες από την εφαρμογή.

Πλατύφυλλα Ζιζάνια: Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοαρακάς, Αγριοκρέμμυδο, Αγριοπανσές, Αγριοπιπεριά, Άδωνης, Ανθεμίδα, Αντράκλα (ή Γλιστρίδα), Βλήτα, Γεράνιο, Καψέλλα, Λάμιο πορφυρό,	ΣΙΤΗΡΑ: Κριθάρι, Σιτάρι (μαλακό και σκληρό)	1	ΔΟ

Προϊόν **Φάσμα** (καταπολεμούμενα ζιζάνια)	**Φάσμα** (καλλιέργειες[α])	ΜΑΕ | ΜΕ[β]	PHI[γ,δ,ε] (ημέρες)

NIMBLE® 50/25 WG (thifensulfuron methyl 50% + tribenuron methyl 25%)

► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

Λάπαθο, Λουβουδιά, Μπιφόρα, Μύαγρο, Παπαρούνα κοινή, Πολύγωνο αναρριχώμενο, Πολυκόμπι, Ρανούγκουλος, Ράπιστρο, Σινάπι άγριο, Στελλάρια, Χαμομήλι. Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια (να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη δόση): Αγριομαργαρίτα, Βερόνικα, Καπνόχορτο, Κενταύριο, Κίρσιο, Μυρώνι, Περικοκλάδα, Περικοκλάδα μεγάλη.			

PENDINOVA® 330 EC (pendimethalin 33%)

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων κατά το φύτρωμά τους, σε διάφορες καλλιέργειες. Στο βιοχημικό επίπεδο επηρεάζει την λειτουργία της μίτωσης με παρεμπόδιση του σχηματισμού των μικροσωληνίσκων της μιτωτικής ατράκτου.

Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια): Ευαίσθητα: Αλεπονουρά, Μουχρίτσα, Πόα κοινή, Σετάρια. Μετρίως ευαίσθητα: Ήρα. **Πλατύφυλλα Ζιζάνια (ετήσια):** Ευαίσθητα: Αγριομαργαρίτα, Αγριοπιπεριά, Αντράκλα (ή Γλιστρίδα), Βερόνικα, Βλήτο πλαγιαστό, Βλήτο τραχύ, Ζωχός, Κολλητσίδα, Λουβουδιά, Παπαρούνα κοινή, Πολυκόμπι, Στύφνος.	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Βαμβάκι, Ηλίανθος, Καπνός, Σόγια	1	ΔΟ
	ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Αγκινάρα, Κρεμμύδι, Σκόρδο	1	ΔΟ
	ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Καρότο	1	140
	ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Κουνουπίδι, Λάχανο	1	90
	ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Μαρούλι	1	75 (εφαρμογή πριν τη μεταφύτευση)
	ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Σπαράγγι	1	28
	ΣΙΤΗΡΑ: Αραβόσιτος, Σιτάρι	1	ΔΟ
	ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα, Πιπεριά, Τομάτα	1	ΔΟ
	ΨΥΧΑΝΘΗ: Αρακάς, Αραχίδα, Κουκιά (όσπρια), Μπιζέλι, Μπιζέλι (όσπρια), Ρεβίθι (όσπρια), Φασόλι, Φασόλι (όσπρια)	1	ΔΟ

QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC (quizalofop-p-ethyl 5%)

Διασυστηματικό, Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων.

Αγρωστώδη Ζιζάνια (Ετήσια): Αιματόχορτο, Αλεπονουρά, Ανεμόχορτο, Βέλιουρας από σπόρο, Βρόμος, Δακτυλίδες, Ελευσίνη, Ήρες, Κριθάρια, Μουχρίτσα, Πάνικο (κεχρί), Πόα κοινή, Σετάρια, Σιτάρια, Φάλαρη. **Αγρωστώδη Ζιζάνια (Πολυετή):** Αγριάδα, Αγρόπυρο, Άγρωστις, Βέλιουρας από ριζώματα, Πάσπαλο.	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Βαμβάκι	1	80
	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Ζαχαρότευτλα, Σόγια	1	60
	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Ηλίανθος, Καπνός	1	35
	ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ	1	Μ/Ε
	ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Καρότο, Μαρούλι, Σπανάκι	1	21
	ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Λάχανο	1	56
	ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Κρεμμύδι, Σέλινο	1	70
	ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Ραδίκι, Σκόρδο	1	49
	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ: Μηδική	1	21
	ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ: Κολοκύθι	1	7
	ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ: Πεπόνι	1	56
	ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά	1	35
	ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Ροδακινιά	1	35
	ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα	1	35
	ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πιπεριά, Τομάτα	1	56
	Φράουλα	1	35
	ΨΥΧΑΝΘΗ: Αρακάς	1	70
	ΨΥΧΑΝΘΗ: Κουκιά, Ρεβίθι, Φακή	1	21
	ΨΥΧΑΝΘΗ: Μπιζέλι	1	49
	ΨΥΧΑΝΘΗ: Φασόλι	1	35

Προϊόν **Φάσμα** (καταπολεμούμενα ζιζάνια)	**Φάσμα** (καλλιέργειες[α])	ΜΑΕ | ΜΕ[β]	PHI[γ,δ,ε] (ημέρες)

RENOX® 40 SL (MCPA οξύ 40%)

Μεταφυτρωτικό, διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των φαινοξυαλκανοϊκών για την καταπολέμηση ετήσιων και ορισμένων πολυετών πλατύφυλλων ζιζανίων. Απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων, μετακινείται διασυστηματικά μέσα στους φυτικούς ιστούς δια μέσου συμπλάστη και αποπλάστη και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς όπου ανατρέπει τον κανονικό ρυθμό αύξησης των κυττάρων. Προκαλεί επιναστία και ασύμμετρη ανάπτυξη των φυτών με χαρακτηριστική συστροφή και παραμόρφωση νεαρών φύλλων και βλαστών.

Πλατύφυλλα Ζιζάνια (Ετήσια και ορισμένα Πολυετή):

Ευαίσθητα ζιζάνια: Άγριο γογγύλι, Βλήτο τραχύ, Βούρλο μικρό, Γεράνιο, Δωδεκάνθι, Ζωχός, Καπνόχορτο, Καρδαμίνα, Καψέλλα, Λάμιο πορφυρό, Λουβουδιά, Λουβουδιά πολύσπερμη, Μαρτιάκος, Μυρώνι, Παπαρούνα κοινή, Πεντάνευρα, Ρόκα, Σπέργουλα.

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοντοματιά, Αγριοράδικο, Αναγαλλίς, Ανθεμίδα, Βερόνικα, Κεράστιο, Λάπαθα, Κίρσιο, Περικοκλάδα, Πικραλίδα, Πολυκόμπι, Ρανούγκουλος, Ραπανίδα, Χαμομήλι.

Ακαλλιέργητες εκτάσεις	2 | -	Μ/Ε
Γκαζόν αγρωστωδών	2 | -	Μ/Ε
Μόνιμοι βοσκότοποι και λιβάδια με αγρωστώδη	2 | -	Μ/Ε
ΣΙΤΗΡΑ: Αραβόσιτος, Κριθάρι, Σιτάρι	1	ΔΟ

RiNiDi WG (rimsulfuron 2,3% + nicosulfuron 9,2% + dicamba 55%, υπό μορφή άλατος νατρίου)

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια αραβοσίτου. Μίγμα τριών διασυστηματικών ζιζανιοκτόνων, το rimsulfuron και το nicosulfuron της ομάδας των Σουλφονυλουριών και το dicamba το οποίο ανήκει στα παράγωγα βενζοϊκού οξέος με ορμονική δράση.

Αγρωστώδη ζιζάνια: Βέλιουρας από σπόρο, Μουχρίτσα.

Πλατύφυλλα ζιζάνια: Αγριοπιπεριά, Βλήτο πλαγιαστό, Βλήτο τραχύ, Λουβουδιά, Μαρτιάκος, Στελλάρια, Στύφνος.

ΣΙΤΗΡΑ: Αραβόσιτος	1	ΔΟ

SANAPHEN 600 EC (2,4-D οξύ 60%, υπό μορφή 2,4-D 2-αίθυλο έξυλο εστέρας (EHE): 90,5%)

Εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο των πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια σιταριού, κριθαριού και αραβόσιτου. Σε βιοχημικό επίπεδο το 2,4-D δρα όπως και οι φυσικές αυξίνες, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση στους μεριστωματικούς ιστούς των βλαστών και των ριζών και τελικά τη νέκρωση των φυτών.

Πλατύφυλλα Ζιζάνια:

Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοβαμβακιά, Αγριοντοματιά, Αναγαλλίς, Βλήτο τραχύ, Δωδεκάνθι, Κίρσιο, Λουβουδιά, Μπιφόρα, Παπαρούνα κοινή, Περικοκλάδα, Ραπανίδα, Σινάπι άγριο.

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοπιπεριά, Βερόνικα, Κολλητσίδα μεγαλόκαρπη, Πολυκόμπι, Τάτουλας.

ΣΙΤΗΡΑ: Αραβόσιτος	1	ΔΟ
ΣΙΤΗΡΑ: Κριθάρι, Σιτάρι	1	60

SELAS 24 EC (clethodim 24%)

Εκλεκτικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο με διασυστηματική δράση σε αγρωστώδη ζιζάνια. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων (παρεμποδιστής του ενζύμου καρβοξυλάση του ακετυλο-συνενζύμου Α).

Αγρωστώδη Ζιζάνια (Ετήσια): Αγριοβρώμη, Αλεπονουρά, Μουχρίτσα, Σετάρια.

Αγρωστώδη Ζιζάνια (Πολυετή): Αγριάδα, Βέλιουρας.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Βαμβάκι	1	120
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Ζαχαρότευτλα	1	110
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα	1	60
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Τομάτα	1	30

SELLOTRON 25/32 SC (fluometuron 25% + pendimethalin 32%)

Νέο Προϊόν

Εκλεκτικό προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στο βαμβάκι. Είναι μίγμα δύο δραστικών ουσιών, του fluometuron που ανήκει στην ομάδα των παράγωγων ουρίας και του pendimethalin που ανήκει στην ομάδα των δινιτροανιλινών. Το fluometuron απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από το φύλλωμα και δρα διασυστηματικά παρεμποδίζοντας τη φωτοσύνθεση και το pendimethalin που παρεμποδίζει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων στους μεριστωματικούς ιστούς.

Πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια

Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοντοματιά, Μουχρίτσα.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Βαμβάκι	1	ΔΟ

Προϊόν **Φάσμα** (καταπολεμούμενα ζιζάνια)	**Φάσμα** (καλλιέργειες[α])	ΜΑΕ | ΜΕ[β]	PHI[γ,δ,ε] (ημέρες)

TERRIFIC 96 EC (S-metolachlor 96%)

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και μερικών πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο, στα ζαχαρότευτλα, στο βαμβάκι, στην τομάτα, στην πατάτα, και στον καπνό. Η δ.ο. S-metolachlor, απορροφάται κυρίως από το στέλεχος και το κολεόπτιλο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια παρεμποδίζεται η διαίρεση των κυττάρων και την ανάπτυξη βλαστών και ριζών.

Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα Ζιζάνια:
Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοντοματιά, Αιματόχορτο, Βλήτο, Γλυστρίδα, Ήρα, Καπνόχορτο, Καψέλλα, Μουχρίτσα, Σετάρια, Χαμομήλι.
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοπιπεριά, Κίτρινη κύπερη, Λουβαδιά, Στελλάρια.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Βαμβάκι, Ζαχαρότευτλα, Καπνός	1	ΔΟ
ΣΙΤΗΡΑ: Αραβόσιτος	1	ΔΟ
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Πατάτα, Τομάτα	1	ΔΟ

VERITY 750 SL (MCPA οξύ 75%, υπό μορφή άλατος διμεθυλαμίνης 91,85%)

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των φαινοξυαλκανοϊκών για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε Χειμερινά και Ανοιξιάτικα σιτηρά. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα των ζιζανίων, μετακινείται διασυστηματικά μέσα στους φυτικούς ιστούς δια μέσου συμπλάστη και αποπλάστη και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς όπου ανατρέπει τον κανονικό ρυθμό αύξησης των κυττάρων. Προκαλεί επιναστία και ασύμμετρη ανάπτυξη των φυτών με χαρακτηριστική συστροφή και παραμόρφωση νεαρών φύλλων και βλαστών.

Πλατύφυλλα Ζιζάνια:
Ευαίσθητα ζιζάνια: Αναγαλλίδα, Βερόνικες, Γεράνι, Ζωχός, Καπνόχορτο, Καψέλλα, Κενταύρια, Κολλιτσίδα μεγαλόκαρπη, Λάμιο, Λάπαθο, Λουβουδιά, Μαρτιάκος, Παπαρούνα κοινή, Περικοκλάδα, Ραπανίδα, Σπέργουλα, Στελλάρια, Χαμομήλι.
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Ανθεμίδα, Καρδαμίνα, Κεράστιο, Κίρσιο, Πικρίς, Πολυκόμπι.

ΣΙΤΗΡΑ (χειμερινά και ανοιξιάτικα): Βρώμη, Κριθάρι, Σίκαλη, Σιτάρι	1	ΔΟ

YAMBO 18/18 SL (glyphosate 18% + MCPA 18%, υπό μορφής άλατος ισοπροπυλαμίνης)

Νέο Προϊόν

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών και πλατύφυλλων) ζιζανίων. Συνδυασμός ενός μη εκλεκτικού ζιζανιοκτόνου (glyphosate) και ενός ορμονικού (MCPA). Το glyphosate απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων. Το MCPA απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες των πλατύφυλλων ζιζανίων και μετακινείται δια μέσου συμπλάστη και αποπλάστη και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς, αναστέλλοντας την ανάπτυξη των ζιζανίων. Τα συμπτώματα εμφανίζονται 2-4 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Ετησία Αγρωστώδη ζιζάνια:
Αιματόχορτο, Βρόμοι, *Ήρα (Lolium* spp.), Κοινή πόα, Μουχρίτσα, Σετάριες.

Ετήσια Πλατύφυλλα ζιζάνια:
Άγρια ρόκα, Βερόνικα, Βλήτο, Ζωχοί, Ήμερο σινάπι, Καρδαμίνα, Καψέλλα, Κόνυζα, *Erigeron* sp., Μαρτιάκος, Μηδική, Μολόχα, Περικοκλάδα, Ρανούγκουλος, Στελλάρια.

Πολυετή ζιζάνια:
Αγριάδα, Αγριοτρίφυλλο, Αλογοουρά, Μέντα, Οξαλίδα, Πεντάνευρο, Ταραξάκος

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:
Αγριοτρίφυλλο, Ζωχοί.

Ελιά* (ελαιοποιήσιμη και επιτραπέζια)	1-2 | 90	60
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ*: Γκρέιπφρουτ, Κιτρολέμονα, Κουμκουάτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Νεραντζιά, Περγαμόντο, Πορτοκαλιά, Φράπα	1-2 | 90	ΔΟ
ΜΗΛΟΕΙΔΗ*: Αχλαδιά, Αχλαδομηλιά, Κυδωνιά, Μηλιά, Μουσμουλιά	1-2 | 90	ΔΟ
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ*: Βερικοκιά, Βυσσινιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Ροδακινιά	1-2 | 90	ΔΟ

** Άνω των τριών (3) ετών.*

Βιοκτόνα (Εντομοκτόνα)

Προϊόν Περιγραφή	**Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Στόχοι**
AXXEPEL 100 EW (cypermethrin 10%)	
Εντομοκτόνο σκεύασμα επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μυγών και βαδιστικών εντόμων (κατσαρίδες, μυρμήγκια, κοριοί και ψύλλοι) καθώς και για την καταστροφή των σφηκοφωλιών.	Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι: Μύγες, Κατσαρίδες, Μυρμήγκια, Ψύλλοι Κοριοί. Σφηκοφωλιές
BUGSPOT 0,9 DP (tetramethrin 0,9 %)	
Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση ιπτάμενων εντόμων (μύγες, κουνούπια, σκνίπες κλπ) και βαδιστικών εντόμων (μυρμήγκια, κατσαρίδες κλπ).	Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι μη κατοικημένοι: Ιπτάμενα έντομα (κουνούπια, σκνίπες, μύγες, κ.ά.). Βαδιστικά έντομα (μυρμήγκια, κατσαρίδες κ.ά.).
ELLASECT® GEL (imidacloprid 2,15%)	
Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή γέλης (Gel Bait). Για εσωτερικούς χώρους, εφαρμογή σε επιλεγμένα σημεία δόλωσης. Εφαρμογή από **μη επαγγελματίες** και **επαγγελματίες** χρήστες.	*Blattella germanica* (Γερμανική κατσαρίδα) - Νύμφες, ακμαία. *Blatta orientalis* (Ανατολική κατσαρίδα) - Νύμφες, ακμαία.
ELLASECT® ANTS GEL (imidacloprid 0,0098%)	
Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή γέλης (Gel Bait). Εσωτερικοί χώροι/ Εξωτερικοί χώροι με εφαρμογή γύρω από κτίρια στα πιθανά σημεία από τα οποία μπορεί να εισέλθουν μυρμήγκια. Εφαρμογή από **Μη επαγγελματίες** και **Επαγγελματίες** χρήστες.	*Monomorium pharaonis* - Τροπικά μυρμήγκια - Μυρμήγκια του φαραώ - Αυγά, προνύμφες, νύμφες, ακμαία. *Linepithema humile* - Τροπικά μυρμήγκια - Αργεντίνικα μυρμήγκια - Αυγά, προνύμφες, νύμφες, ακμαία.

Βιοκτόνα (Τρωκτικοκτόνα)

Προϊόν Περιγραφή	**Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Στόχοι**
BONITOP NEXT PASTA FLUO (difenacoum 0,0029%)	
Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας (RB) των 10 γραμ. Αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση του οικιακού ποντικού (*Mus musculus*) και του καφέ αρουραίου (*Rattus norvegicus*), για την προστασία αποθηκευμένων προϊόντων/ τροφίμων, την προστασία δημόσιας υγείας και την προστασία υλικών. Εφαρμογή από **Μη επαγγελματίες** και **Επαγγελματίες** χρήστες.	Εσωτερικοί χώροι και εξωτερικοί χώροι - γύρω από κτίρια: Οικιακός ποντικός *(Mus musculus).* Καφέ αρουραίος *(Rattus norvegicus).*
KILLER-NEO WHEAT (brodifacoum 0,0029%)	
Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε σπόρους σιταριού (AB). Αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση του οικιακού ποντικού (*Mus musculus*) και του καφέ αρουραίου (*Rattus norvegicus*), για την προστασία αποθηκευμένων προϊόντων/ τροφίμων, την προστασία δημόσιας υγείας και την προστασία υλικών. Εφαρμογή από **Μη επαγγελματίες** και **Επαγγελματίες** χρήστες.	Εσωτερικοί χώροι και εξωτερικοί χώροι - γύρω από κτίρια: Οικιακός ποντικός *(Mus musculus).* Καφέ αρουραίος *(Rattus norvegicus).*

Ειδικά Προϊόντα, Φυτορρυθμιστικές Ουσίες

Προϊόν Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Καλλιέργειες[α]	**ΜΑΕ | ΜΕ**[β]	**PHI**[γ,δ,ε] (ημέρες)

BLUE SHADE

Προσκολλητικό με οργανική μπλε ουσία. *Το σκεύασμα αποτελείται από οργανική χρωστική ουσία (οργανικό άλας νατρίου), που αναπτύσσεται σε αδρανές βελτιωτικό υπόστρωμα.*

Χρησιμοποιείται κυρίως στις καλλιέργειες αμπελιού, ελιάς, εσπεριδοειδών, οπωροφόρων, κηπευτικών αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη γεωργική καλλιέργεια.	-	Μ/Ε

COMO PLUS L. (ethoxylated isodecyl alcohol 15%)

Προσκολλητικό - Επιφανειοδραστικό. *Το COMO PLUS L. χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της διαβρεκτικής και προσκολλητικής ικανότητας του ψεκαστικού διαλύματος. Ιδιαίτερα συνιστάται η εφαρμογή του σε ψεκαστικά διαλύματα όπου τα χρησιμοποιούμενα φάρμακα δεν έχουν στη σύνθεσή τους διαβρεκτικές ή προσκολλητικές ουσίες, σε ψεκασμούς καλλιεργειών με φύλλα καθώς και σε χειμερινούς ψεκασμούς για να μην ξεπλένεται το γεωργικό φάρμακο από τις βροχές.*

Ανάμειξη στο βυτίο με: Βρέξιμο θειάφι, Διαφυλλικά λιπάσματα, Εντομοκτόνα, Ζιζανιοκτόνα, Οργανικά μυκητοκτόνα, Χαλκούχα μυκητοκτόνα	-	Μ/Ε

HEDIX PRO 5 SL (mepiquat chloride 5%)

Ρυθμιστής ανάπτυξης *του βαμβακιού για την παρεμπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και την πρωίμιση της παραγωγής. Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση του γιββερελλικού οξέος.*

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Βαμβάκι	1-3|14	ΔΟ

IANOS 48 SL (ethephon 48%)

Ρυθμιστής ανάπτυξης *για το άνοιγμα των καψών και την αποφύλλωση στο βαμβάκι. Δρα ελευθερώνοντας αιθυλένιο στους φυτικούς ιστούς.*

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Βαμβάκι	1	7

MERIDIEN 5 GB (metaldehyde 5%)

Κοχλιολειμακοκτόνο *για την καταπολέμηση σαλιγκαριών και γυμνοσαλιάγκων.*

Αγροί καλλιεργούμενοι, Ανθοκομικές καλλιέργειες, Αμπελώνες, Δενδρώνες, Λαχανόκηποι, Σπορεία, Φυτώρια	3|-	Μ/Ε

VAPAM FORTE 51 SL (metam sodium 51% β/ο)

Υγρό Απολυμαντικό Εδάφους. *Απολυμαντικό για την απολύμανση εδάφους, πριν την εγκατάσταση των καλλιεργειών. Καταπολεμά ορισμένους νηματώδεις, μύκητες εδάφους και βλαστάνοντες σπόρους ζιζανίων. Δρα με τους ατμούς ισοθειοκυανικού μεθυλίου που παράγονται κατά τη διάσπασή του στο έδαφος.*

Απολύμανση εδάφους πριν την εγκατάσταση των καλλιεργειών: Λαχανικά και καλλωπιστικά (Υ)	Μία (1) εφαρμογή κάθε τρίτο έτος στο ίδιο έδαφος	Μ/Ε
Απολύμανση εδάφους πριν την εγκατάσταση των καλλιεργειών: Λαχανικά και Καλλωπιστικά (Θ), Σπορεία καπνού σε θερμοκήπιο		

Συγκεντρωτικός Πίνακας Προϊόντων

(με εγκεκριμένες χρήσεις ανά καλλιέργεια/ στόχο και PHI)

Αβοκάντο

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ(β)	PHI(γ,δ,ε)
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	8 | 7	ΔΟ

Αγγούρι

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	PHI
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	M/E
M	**RIBBON 12 EC**	Ωίδιο	5 | 7-10	7
XM	**BORDO 20 WG**	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	4 | -	7
	BORDO 20 WP	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	4 | -	7
	ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP	Περονόσπορος, Φυτόφθορα καρπών	3 | 7-14	7

Αγγούρι (Θ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	3 | 7	3
	KITROFEN ULTRA 100 EC	Αλευρώδεις *(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)*	2 | 10-15*	3
	LAOTTA 1,8 EC	Κίτρινος τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), Λιριόμυζα	1-2 | 7	3
	MATEUS® 10 CS (Zeon Tech)	Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	2 | 14	3
	OXAMYL ASCENZA 10 SL	Νηματώδεις	3 | 20	21
	PHANTOM 2,5 EC	Αφίδες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	3 | 7	3
	REVOLVER 1,8 EC	Θρίπες *(Frankliniella occidentalis, Thrips* sp.*)*, Λιριόμυζα, Τετράνυχος *(Tetranychus urticae)*	4 | 7	3
	SHOOTER 200 SL	Αλευρώδεις, Αφίδες	2|10	3
M	**ALANDIN 100 EC**	Ωίδιο	2|10-14	3
	AZOFIN® 250 SC	Περονόσπορος, Ωίδιο	3 | 10	3
	BOTREFIN® PLUS 37,5/25 WG	Βοτρύτης	3 | 7-10	3
	CABRIO® DUO 4/7,2 EC	Περονόσπορος, Ωίδιο	3 | 7-8	1
	COLLIS® 20/10 SC	Ωίδιο	3 | 7-10	3
	FRAME 80 WG	Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
	ORVEGO® 30/22,5 SC	Περονόσπορος	2|7-10	3
	PENCOL 10 EC	Ωίδιο	3 | 7-14	3
	PIRGUS 80 WG	Περονόσπορος	4 | 10	3
	PROMESS 72,2 SL	Περονόσπορος	3 | 8-10	3 (Εφαρμογή στο φύλλωμα)
		Πύθιο, Φυτόφθορα	1	21 (Εφαρμογή στο έδαφος)
	SCALA® 40 SC	Βοτρύτης	3|10-14	3
	SIVAR 25 SC	Ωίδιο	3 | 10	3
XM	**CUPRICO 50 WP**	Ανθράκωση, Βακτηρίωση (*Erwinia tracheiphila*), Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος	4 | 10-14	7
	HYDROPLUS NEW 40 WG	Ανθράκωση, Βακτηρίωση (*Erwinia tracheiphila*), Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος	4 | 10-14	7

** KITROFEN ULTRA 100 EC: Μεσοδιάστημα επεμβάσεων 10 ημέρες όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη των 25°C και 15 ημέρες όταν είναι μικρότερη.*

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Αγγούρι (Υ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	3 | 7	3
E	**MATEUS® 10 CS (Zeon Tech)**	Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	2 | 14	3
E	**PHANTOM 2,5 EC**	Αφίδες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	3 | 7	3
E	**SHOOTER 200 SL**	Αφίδες	1	3
M	**ALANDIN 100 EC**	Ωίδιο	2|10-14	3
M	**AZOFIN® 250 SC**	Περονόσπορος, Ωίδιο	3 | 10	3
M	**BOTREFIN® PLUS 37,5/25 WG**	Βοτρύτης	3 | 7-10	3
M	**COLLIS® 20/10 SC**	Ωίδιο	3 | 7-10	3
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
M	**ORVEGO® 30/22,5 SC**	Περονόσπορος	2|7-10	3
M	**PENCOL 10 EC**	Ωίδιο	2 | 10*	3
M	**PIRGUS 80 WG**	Περονόσπορος	4 | 10	3
M	**PROMESS 72,2 SL**	Πύθιο, Φυτόφθορα	1	21 (Εφαρμογή στο έδαφος)
XM	**CUPRICO 50 WP**	Ανθράκωση, Βακτηρίωση (*Erwinia tracheiphila*), Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος	4 | 10-14	7
XM	**HYDROPLUS NEW 40 WG**	Ανθράκωση, Βακτηρίωση (*Erwinia tracheiphila*), Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος	4 | 10-14	7

** PENCOL 10 EC: 2 \| 7-14 για το Αγγουράκι gherkin (Υ).*

Αγκινάρα

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Κασσίδα, Σποντόπτερα	3 | 7	3
E	**PHANTOM 2,5 EC**	Αφίδες, Κασσίδα, Σποντόπτερα	3 | 7	3
E	**SWEEP MAX 500 EC**	Αφίδες, Λεπιδόπτερα	2 | 10	3
M	**ALANDIN 100 EC**	Ωίδιο	2|10-12	14
M	**AZOFIN® 250 SC**	Ωίδιο	3 | 10	7
M	**DYNASTY 20/12,5 SC**	Περονόσπορος	2|8-10	7
M	**FRAME 80 WG**	Τετράνυχος, Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
XM	**COURE FLOW 38 SC**	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
XM	**ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP**	Περονόσπορος, Φυτόφθορα καρπών	3 | 7-14	7
Z	**ABILEST 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
Z	**PENDINOVA® 330 EC**	Αγρωστώδη (ετήσια) Ζιζάνια, Πλατύφυλλα (ετήσια) Ζιζάνια	1	ΔΟ

Αγκινάρα (Υ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
M	**CABRIO® DUO 4/7,2 EC**	Περονόσπορος*	3 | 7-10	3

** Χρήση Ήσσονος Σημασίας.*

Αγροί ► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Y	**PHOSTEK® 57 TB**	Τρωκτικά στους αγρούς	-	-
Y	**PHOSTEK® PELLETS**	Τρωκτικά στους αγρούς	-	-
Z	**IFESTOS TF 36 SL**	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια *(Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά)*	1	M/E

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Αγροί ► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
Z	**IPIGLYCE NEW 36 SL**	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια *(Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά)*	1	M/E
	KEYNERON GREEN 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια *(Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά)*	1	M/E

Ακαλλιέργητες εκτάσεις

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
Z	**GENOXONE® ZX**	Βάτα, Θάμνοι, Πουρνάρια, Ξυλώδης βλάστηση, Πλατύφυλλα Ζιζάνια, Αποξήρανση κούτσουρων, κομμένων κορμών.	1	M/E
	IFESTOS TF 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή ζιζάνια, Βάτα, Ξυλώδεις θάμνοι	1-2 | -	M/E
	IPIGLYCE NEW 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή ζιζάνια, Βάτα, Ξυλώδεις θάμνοι	1-2 | -	M/E
	KEYNERON GREEN 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή ζιζάνια, Βάτα, Ξυλώδεις θάμνοι	1-2 | -	M/E
	RENOX® 40 SL	Πλατύφυλλα Ζιζάνια (ετήσια και ορισμένα πολυετή)	2 | -	M/E

Ακτινίδιο

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**SCORPION EC**	Βαμβακάδα (ή Διάσπις)*, Κηροπλάστης*, Κίτρινος τετράνυχος*, Κόκκινος τετράνυχος*, Ψώρα Σαν Ζοζέ*	1	M/E

**Χρήση Ήσσονος Σημασίας.*

Αμπέλι

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Ευδεμίδα, Κοχυλίδα, Τζιτζικάκια	3 | 14	7
	MATEUS® 10 CS (Zeon Tech)	Ευδεμίδα, Κοχυλίδα	2 | 14	7
	PHANTOM 2,5 EC	Αφίδες, Ευδεμίδα, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Κοχυλίδα, Πυραλίδα, Τζιτζικάκια, Τσιγαρολόγος	3 | 14	7
	REVOLVER 1,8 EC	Άκαρι της αμπέλου, Τετράνυχος *(Eotetranychus carpini)*	2 | 14-21	28
	SCORPION EC	Κοκκοειδή, Χειμερινά ωά του Κόκκινου Τετράνυχου	1	M/E
	SHOOTER 200 SL	*Metcalfa pruinosa,* Αφίδες, Κοκκοειδή, Τζιτζικάκια, Φυλλοξήρα, Ψευδόκοκκος	1	14
M	**ARMETIL COURE 8/40 WP**	Περονόσπορος	4 | -	Στο τέλος της ανθοφορίας
	COLLIS® 20/10 SC	Ωίδιο	3 | 10-14	35
	RIBBON 12 EC	Ωίδιο	3 | -	21
Z	**ABILEST 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	LUPO 365 CS	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
ΕΠ	**MERIDIEN 5 GB**	Σαλιγκάρια/ Γυμνοσάλιαγκες (λείμακες, αρίονες)	3 | -	M/E

Αμπέλι (επιτραπέζιο) ► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**LAOTTA 1,8 EC***	Κίτρινος τετράνυχος (*Tetranychus urticae*)	1	10
	REBEL 100 EW	Ευδεμίδα, Κοχυλίδα, Πυραλίδα, Τζιτζικάκια, Τσιγαρολόγος	2 | -	14
	REVENGE 200 SL	Ευδεμίδα, Τζιτζικάκια	1	7
	SWEEP MAX 500 EC	Ευδεμίδα, Κοχυλίδα, Πυραλίδα, Τζιτζικάκια, Τσιγαρολόγος	1	21
M	**ALANDIN 100 EC**	Ωίδιο	3|10-14	14

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Αμπέλι (επιτραπέζιο) ► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
M	**AZOFIN® 250 SC**	Περονόσπορος, Ωίδιο	3 | 10	21
	BOTREFIN® PLUS 37,5/25 WG	Βοτρύτης	1	7
	CABRIO® TEAM 6,7/12 WG	Περονόσπορος, Ωίδιο	3|12-14	48
	ELLATHION DP (Micronized)	Ωίδιο	5 | 5-10	ΔΟ
	FRAME 80 WG	Ερίνωση, Ωίδιο	8 | 10	ΔΟ
	LAGOON 25 EW	Ωίδιο	2 | 14-21	14
	METMAN 25 WP**	Περονόσπορος	2|21	14
	PENCOL 10 EC	Ωίδιο	3 | 7-14	14
	PIRGUS 80 WG	Περονόσπορος	3 | 10	28
	SCALA® 40 SC	Βοτρύτης, Δευτερογενείς προσβολές από *Aspergillus* spp. και *Penicillium* spp.	3|14	21
	SIVAR GOLD 25,5/6,25 SC	Περονόσπορος	1	15
	WETTASUL DP (Micronized)	Ωίδιο	4 | 5-10	5
XM	**BORDO 20 WG**	Ανθράκωση, Περονόσπορος	3 | -	21
	BORDO 20 WP	Ανθράκωση, Περονόσπορος	3 | -	21
	COURE FLOW 38 SC	Ανθράκωση, Περονόσπορος	3 | -	21
	CUPRICO 50 WP	Ανθράκωση, Βακτηριακή νέκρωση, Περονόσπορος	3 | -	21
	CURENOX 50 WG	Περονόσπορος	3 | 10	21
	HYDROPLUS NEW 40 WG	Ανθράκωση, Βακτηριακή νέκρωση, Περονόσπορος	3 | -	21
	ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP	Περονόσπορος	3 | -	21
	ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP	Ανθράκωση, Περονόσπορος	3 | -	21
Z	**FENHEX 24 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	180
	FOCUS® 10 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	42
	IFESTOS TF 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	IPIGLYCE NEW 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	KEYNERON GREEN 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7

** Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα στις ποικιλίες Σουλτανίνα και Κορινθιακή Σταφίδα. | ** Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.*

Αμπέλι (οινοποιήσιμο) ► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**LAOTTA 1,8 EC**	Κίτρινος τετράνυχος (*Tetranychus urticae*)	1	10
	REBEL 100 EW	Ευδεμίδα, Κοχυλίδα, Πυραλίδα, Τζιτζικάκια, Τσιγαρολόγος	2 | -	14
	REVENGE 200 SL	Ευδεμίδα, Τζιτζικάκια	1	7
	SWEEP MAX 500 EC	Ευδεμίδα, Κοχυλίδα, Πυραλίδα, Τζιτζικάκια, Τσιγαρολόγος	1	21
M	**ALANDIN 100 EC**	Ωίδιο	3|10-14	21
	AZOFIN® 250 SC	Περονόσπορος, Ωίδιο	3 | 10	21
	BOTREFIN® PLUS 37,5/25 WG	Βοτρύτης	1	21
	CABRIO® TEAM 6,7/12 WG	Περονόσπορος, Ωίδιο	3|12-14	35
	ELLATHION DP (Micronized)	Ωίδιο	5 | 5-10	ΔΟ
	FOLLOW 80 WG	Βοτρύτης, Μαύρη Σήψη, Περονόσπορος, Φόμοψη	8 | 10-14	28
	FRAME 80 WG	Ερίνωση, Ωίδιο	8 | 10	ΔΟ
	LAGOON 25 EW	Ωίδιο	2 | 14-21	14
	METMAN 25 WP	Περονόσπορος	2|21	14
	PENCOL 10 EC	Ωίδιο	3 | 7-14	14
	PIRGUS 80 WG	Περονόσπορος	3 | 10	28
	SCALA® 40 SC	Βοτρύτης, Δευτερογενείς προσβολές από *Aspergillus* spp. και *Penicillium* spp.	1	21

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Αμπέλι (οινοποιήσιμο) ► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
M	**SIVAR GOLD 25,5/6,25 SC**	Περονόσπορος	1	15
	WETTASUL DP (Micronized)	Ωίδιο	4 | 5-10	5
XM	**BORDO 20 WG**	Ανθράκωση, Περονόσπορος	3 | -	21
	BORDO 20 WP	Ανθράκωση, Περονόσπορος	3 | -	21
	COURE FLOW 38 SC	Ανθράκωση, Περονόσπορος	3 | -	21
	CUPRICO 50 WP	Ανθράκωση, Βακτηριακή νέκρωση, Περονόσπορος	3 | -	21
	CURENOX 50 WG	Περονόσπορος	3 | 10	21
	HYDROPLUS NEW 40 WG	Ανθράκωση, Βακτηριακή νέκρωση, Περονόσπορος	3 | -	21
	ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP	Περονόσπορος	3 | -	21
	ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP	Ανθράκωση, Περονόσπορος	3 | -	21
Z	**FENHEX 24 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	180
	FOCUS® 10 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	42
	IFESTOS TF 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	IPIGLYCE NEW 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	KEYNERON GREEN 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7

Αμυγδαλιά

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Ευρύτομο, Καρπόκαψα	2 | 14	30
	KITROFEN ULTRA 100 EC	Ψώρα Σαν Ζοζέ	1 (πριν την άνθηση)	Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
	SCORPION EC	Ακάρεα*, Αφίδες*, Κηροπλάστης*, Κοκκοειδή*, Λεκάνιο*, Παρλατόρια*, Τετράνυχοι*, Φυλλοδέτες*, Ψώρα (μυτιλόμορφη)*, Ψώρα Σαν Ζοζέ*, Ψώρες (λοιπές)*	1-2 | 2min	M/E
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	8 | 7	ΔΟ
	MORGAN 80 WG	Εξώασκος*, Κλαδοσπορίωση*, Κορύνεο*, Πολυστιγμάτωση*, Φαιά σήψη*, Φουζίκοκκο (ή φόμοψη)*	4 | 7-14	ΔΟ
	SCALA® 40 SC	Φαιά σήψη (*Monilinia laxa*, *Monilinia fructicola*)*	2|7	30
XM	**BORDO 20 WG**	Κορύνεο	3 | -	28
	BORDO 20 WP	Κορύνεο	3 | -	28
	COURE FLOW 38 SC	Πολυστίγμωση (*Polystigma ochraceum*)	3 | -	28
	CUPRICO 50 WP	Εξώασκος, Πολυστίγμωση (*Polystigma ochraceum*)	3 | -	28
	CURENOX 50 WG	Πολυστίγμωση (*Polystigma ochraceum*)	3 | -	28
	HYDROPLUS NEW 40 WG	Εξώασκος, Κορύνεο, Πολυστίγμωση (*Polystigma ochraceum*)	3 | -	28
	ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP	Πολυστίγμωση (*Polystigma ochraceum*)	3 | -	28
Z	**IFESTOS TF 36 SL**	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	IPIGLYCE NEW 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	KEYNERON GREEN 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	LUPO 365 CS	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ

** Χρήση Ήσσονος Σημασίας.*

Άνηθος (Θ)

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**REVOLVER 1,8 EC**	Θρίπας *(Frankliniella occidentalis)*	4 | 7	14

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Ανθοκομικά φυτά

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Μ	**ALANDIN 100 EC***	Ωίδιο	2|7-12	Μ/Ε
ΕΠ	**MERIDIEN 5 GB**	Σαλιγκάρια/ Γυμνοσάλιαγκες (λείμακες, αρίονες)	3 | -	Μ/Ε

** ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ (Θ+Υ): Αγγελική, Αλθέα, Γαρυφαλλιά, Καλεντούλα, Μπιγκόνια, Ντάλια, Πελαργόνιο, Ποτεντίλα, Τριανταφυλλιά, Χρυσάνθεμο, Japanese spindle tree.*

Αντίδι

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Ε	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	Μ/Ε
Μ	**FRAME 80 WG**	Τετράνυχος, Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ

Αντίδι (Υ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Ε	**LAOTTA 1,8 EC**	Λιριόμυζα, Τετράνυχοι	1-3 | 7	7
Μ	**METMAN 25 WP**	Περονόσπορος	3|10	14

Αποθηκευμένα προϊόντα (τρόφιμα, ζωοτροφές), Αποθηκευτικοί χώροι (κενοί), Μέσα μεταφοράς προϊόντων, Ξυλεία, Σιλό

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Υ	**PHOSTEK® 57 TB**	Έντομα και ακάρεα αποθηκευμένων προϊόντων	-	-
	PHOSTEK® PELLETS	Έντομα και ακάρεα αποθηκευμένων προϊόντων, Τρωκτικά αποθηκευμένων προϊόντων	-	-
	PHOSTEK® SACHETS	Έντομα και ακάρεα αποθηκευμένων προϊόντων	-	-

Αντράκλα

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Ε	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	Μ/Ε
Ζ	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	28

Αραβόσιτος ► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Ε	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	2|45	ΔΟ
	DELMUS 2,5 EC	Αφίδες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Πράσινο σκουλήκι, Πυραλίδα, Σεζάμια, Σποντόπτερα	3 | 14-21	30
		Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.)	3 | 7-14	30
	EFALVAC 1,5 GR	Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.), Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.), Σύμφυλα	1	ΔΟ
		Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.)	1 | Ανά 3 χρόνια	ΔΟ
	PHANTOM 2,5 EC	Αφίδες, Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Θρίπες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Πράσινο σκουλήκι, Πυραλίδα, Σεζάμια, Σποντόπτερα	3 | 7-14	30
Ζ	**ABILEST 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	DICASH 48 SL	Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	ETERNITY 31,25/18,75 SE	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1 | Ανά 3 χρόνια	ΔΟ

(1) Κατηγορία: Ε Εντομοκτόνα, Υ Υποκαπνιστικά, Μ Μυκητοκτόνα, ΧΜ Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Ζ Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Αραβόσιτος ▸ *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
Z	**LUPO 365 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	MESOLON 10 SC	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	Τελευταία εφαρμογή στο στάδιο των 9 φύλλων (BBCH 19) της καλλιέργειας
	MODETT® 25/28 SE	Αγρωστώδη (ετήσια) Ζιζάνια, Πλατύφυλλα (ετήσια) Ζιζάνια	1 | Ανά 3 χρόνια	ΔΟ
	NICOSH 4 OD	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1-2 | 7-14	ΔΟ
	PENDINOVA® 330 EC	Αγρωστώδη (ετήσια) Ζιζάνια, Πλατύφυλλα (ετήσια) Ζιζάνια	1	ΔΟ
	RENOX® 40 SL	Πλατύφυλλα Ζιζάνια (ετήσια και ορισμένα πολυετή)	1	ΔΟ
	RINIDI WG	Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	SANAPHEN 600 EC	Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	TERRIFIC 96 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ

Αρακάς

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδα των κουκιών, Αφίδα των μπιζελιών, Θρίπες, Κάμπια των μπιζελιών (*Laspeyresia nigricana*), Κοφτοσκούληκο, Σιτόνα	2 | 14	7
Z	**LUPO 365 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	PENDINOVA® 330 EC	Αγρωστώδη (ετήσια) Ζιζάνια, Πλατύφυλλα (ετήσια) Ζιζάνια	1	ΔΟ
	QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	70

Αρακάς (Θ)

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ

Αρακάς (Υ)

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ

Αραχίδα

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
XM	**CUPRICO 50 WP**	Κερκοσπορίωση	3 | 7-10	21
	HYDROPLUS NEW 40 WG	Κερκοσπορίωση	3 | 7-10	21
Z	**PENDINOVA® 330 EC**	Αγρωστώδη (ετήσια) Ζιζάνια, Πλατύφυλλα (ετήσια) Ζιζάνια	1	ΔΟ

Αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
Z	**IFESTOS TF 36 SL**	Υδροχαρή Ζιζάνια	1	M/E
	IPIGLYCE NEW 36 SL	Υδροχαρή Ζιζάνια	1	M/E
	KEYNERON GREEN 36 SL	Υδροχαρή Ζιζάνια	1	M/E

Αρωματικά φυτά

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
Z	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	28

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Αρωματικά φυτά (Υ)

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
M	**CABRIO® DUO 4/7,2 EC***	Περονόσπορος	3 | 7-10	7

** Βασιλικός, Δενδρολίβανο, Θυμάρι.*

Ασκαλώνιο (εσαλότ)

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**SWEEP MAX 500 EC**	Αγρότιδα ή Καραφατμέ (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Αφίδες, Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Δορυφόρος, Θρίπες, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σκουλήκι του πράσου, Σποντόπτερα, Τζιτζικάκια, Φθοριμαία	2 | 10	3
Z	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	28

Αχλαδιά ► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Καρπόκαψα (*Cydia pomonella*), Φυλλοδέτες, Ψύλλα	2 | 14	7
	IMIDAN® 50 WP	Καρπόκαψα (*Cydia pomonella*)	2 | 20	28
	KITROFEN ULTRA 100 EC	Βαμβακάδα ή Διάσπις, Ψώρα Σαν Ζοζέ	1 (πριν την άνθηση)	Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
	LAOTTA 1,8 EC	Κίτρινος τετράνυχος *(Tetranychus urticae)*, Κόκκινος τετράνυχος *(Panonychus ulmi)*, Ψύλλα	1-2 | 15	3
	MATEUS® 10 CS (Zeon Tech)	Φυλλορύκτες, Ψύλλα	2 | 14	7
	PHANTOM 2,5 EC	Ανθονόμος, Αφίδες, Θρίπες, Καρπόκαψα (*Cydia pomonella*), Κηκιδόμυγες, Μηλολόνθη, Φυλλοδέτες, Ψύλλα	2 | 14	7
		Ψώρα Σαν Ζοζέ	1	7
	REVENGE 200 SL	Αφίδες, Οπλοκάμπη, Φυλλορύκτες	2 | 20	14
		Καρπόκαψα (*Cydia pomonella*)	2 | 8	14
	REVOLVER 1,8 EC	Ακάρεα (*Aculus schlechtendali*, *Aculus* sp., *Eryophyes* spp.), Θρίπες *(Frankliniella occidentalis, Thrips* sp.), Πανόνυγχος *(Panonychus ulmi)*, Τετράνυχος *(Tetranychus urticae)*, Φυλλορύκτες, Ψύλλα	2 | 7	28
	SCORPION EC	Αφίδες, Βαμβακάδα ή Διάσπις, Κοκκοειδή, Ματόψειρα*, Πανόνυγχος, Παρλατόρια, Τετράνυχοι, Φυλλοδέτες, Ψευδόκοκκος*, Ψύλλα, Ψώρα (*Eriococcus lagerstroemiae*)*, Ψώρα (μυτιλόμορφη), Ψώρα (σταχτιά), Ψώρα Σαν Ζοζέ	2 | 60	M/E
	SHOOTER 200 SL	Αφίδες, Οπλοκάμπη	1 εφαρμογή κάθε 2 έτη	14
M	**ALANDIN 100 EC**	Ωίδιο	3|12-14	14
	DEMON 70 WG	Φουζικλάδιο	6|-	42
	FRAME 80 WG	Φουζικλάδιο, Ωίδιο	8 | 7	ΔΟ
	MORGAN 80 WG	Φουζικλάδιο	6-10** | 7-14	28
	PENCOL 10 EC	Ωίδιο	3 | 7-14	14
	PIRGUS 80 WG	Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae*), Φυτόφθορα λαιμού και ριζών	2-3 | 30	15
	RIBBON 12 EC	Φουζικλάδιο	4 | -	21
	SCALA® 40 SC	Μετασυλλεκτικές ασθένειες από *Neofabraea* sp.	3|10	7
		Φουζικλάδιο	4|7-10	7
XM	**COURE FLOW 38 SC**	Βακτηριακό κάψιμο, Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae)*, Σεπτορίωση, Φαιά σήψη, Φουζικλάδιο	3 | -	ΔΟ
	CUPRICO 50 WP	Βακτηριακό κάψιμο, Βακτηρίωση *(Pseudomonas syringae)*, Σεπτορίωση, Φαιά σήψη, Φουζικλάδιο	3 | -	ΔΟ
	CURENOX 50 WG	Βακτηριακό κάψιμο, Βακτηρίωση *(Pseudomonas syringae)*, Σεπτορίωση, Φαιά σήψη, Φουζικλάδιο	3 | -	ΔΟ
	HYDROPLUS NEW 40 WG	Βακτηριακό κάψιμο, Βακτηρίωση *(Pseudomonas syringae)*, Σεπτορίωση, Φαιά σήψη, Φουζικλάδιο	3 | -	ΔΟ

** Χρήση Ήσσονος Σημασίας. | ** Συνολικά 10 εφαρμογές σε εδάφη με PH<7,5 και μέχρι 6 εφαρμογές για εδάφη με PH>7,5.*

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Αχλαδιά ► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
XM	**ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP**	Φουζικλάδιο	3 | -	ΔΟ
XM	**ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP**	Βακτηριακό κάψιμο, Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae*), Σεπτορίωση, Φαιά σήψη, Φουζικλάδιο	3 | -	ΔΟ
Z	**ABILEST 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
Z	**FENHEX 24 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	180
Z	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	28
Z	**LUPO 365 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
Z	**IFESTOS TF 36 SL**	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
Z	**IPIGLYCE NEW 36 SL**	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
Z	**KEYNERON GREEN 36 SL**	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
Z	**YAMBO 18/18 SL*** **	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια), Πολυετή ζιζάνια	1-2 | 90	ΔΟ

*** Άνω των τριών (3) ετών.*

Αχλαδομηλιά

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**IMIDAN® 50 WP**	Καρπόκαψα (*Cydia pomonella*)	2 | 20	28
E	**KITROFEN ULTRA 100 EC**	Βαμβακάδα ή Διάσπις*, Ψώρα Σαν Ζοζέ*	1 (πριν την άνθηση)	Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
M	**MORGAN 80 WG**	Φουζικλάδιο	6-10** | 7-14	28
M	**PIRGUS 80 WG**	Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae*), Φυτόφθορα λαιμού και ριζών	2-3 | 30	15
Z	**FENHEX 24 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	180
Z	**YAMBO 18/18 SL*** **	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια), Πολυετή ζιζάνια	1-2 | 90	ΔΟ

** Χρήση Ήσσονος Σημασίας. | ** Συνολικά 10 εφαρμογές σε εδάφη με PH<7,5 και μέχρι 6 εφαρμογές για εδάφη με PH>7,5. | *** Άνω των τριών (3) ετών.*

Βαμβάκι ► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	M/E
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αλευρώδεις, Αφίδες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Πράσινο σκουλήκι, Ρόδινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τζιτζικάκια	2 | 14	30
E	**EFALVAC 1,5 GR**	Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.), Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	ΔΟ
E	**KITROFEN ULTRA 100 EC**	Αλευρώδης *(Bemisia tabaci)*	1	Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
E	**MATEUS® 10 CS (Zeon Tech)**	Αφίδες, Θρίπες, Πράσινο σκουλήκι, Ρόδινο σκουλήκι	2 | 14	14
E	**PHANTOM 2,5 EC**	Θρίπες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Λύγκος, Πράσινο σκουλήκι, Ρόδινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τζιτζικάκια	2 | 14	30
E	**REBEL 100 EW**	Αγρότιδα ή Καραφατμέ (*Agrotis* spp.), Ακανθώδες σκουλήκι, Αλευρώδεις, Αφίδες, Διπάροψη, Θρίπες, Πράσινο σκουλήκι, Προνύμφες λεπιδοπτέρων, Ρόδινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	1	14
E	**REVENGE 200 SL**	Αφίδες, Καφέ βρωμούσα (*Halyomorpha halys*)*	2 | 20	14
E	**SWEEP MAX 500 EC**	Αγρότιδα ή Καραφατμέ (*Agrotis* spp.), Ακανθώδες σκουλήκι, Αλευρώδεις, Αφίδες, Θρίπες, Πράσινο σκουλήκι, Ρόδινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	2 | 10	21
Z	**ABILEST® 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
Z	**FLUTON 50 SC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
Z	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	ΔΟ
Z	**LUPO 365 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
Z	**IFESTOS TF 36 SL**	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1	7

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Βαμβάκι ► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
Ζ	**IPIGLYCE NEW 36 SL**	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1	7
Ζ	**KEYNERON GREEN 36 SL**	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1	7
Ζ	**PENDINOVA® 330 EC**	Αγρωστώδη (ετήσια) Ζιζάνια, Πλατύφυλλα (ετήσια) Ζιζάνια	1	ΔΟ
Ζ	**QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	80
Ζ	**SELAS 24 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (Ετήσια και πολυετή)	1	120
Ζ	**SELLOTRON 25/32 SC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
Ζ	**TERRIFIC 96 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
ΕΠ	**HEDIX PRO 5 SL**	Ρυθμιστής ανάπτυξης (Παρεμπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και της πρωίμισης της παραγωγής).	1-3 | 14	M/E
ΕΠ	**IANOS 48 SL**	Ρυθμιστής ανάπτυξης (Επιτάχυνση και αύξηση του ανοίγματος των ώριμων καψών προ της συγκομιδής, υποβοήθηση της αποφύλλωσης και πρωίμιση της συγκομιδής).	1	7

** Χρήση Ήσσονος Σημασίας.*

Βατόμουρα

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
Ε	**SHOOTER 200 SL**	Αφίδες	2|10	3
Μ	**ALANDIN 100 EC**	Ωίδιο	1	3
Μ	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	6 | 14	ΔΟ

Βερικοκιά ► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
Ε	**DELMUS 2,5 EC**	Ανάρσια, Αφίδες, Καρπόκαψα δαμασκηνιάς (*Cydia funebrana*), Μύγα Μεσογείου, Φυλλοδέτες	1	7
Ε	**KITROFEN ULTRA 100 EC**	Βαμβακάδα (ή Διάσπις), Ψώρα Σαν Ζοζέ	1 (πριν την άνθηση)	Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
Ε	**PHANTOM 2,5 EC**	Ανάρσια, Αφίδες, Καρπόκαψα δαμασκηνιάς (*Cydia funebrana*), Μύγα μεσογείου, Ραγολέτιδα, Φυλλοδέτες, Ψώρα Σαν Ζοζέ	1	7
Ε	**REVENGE 200 SL**	Ανάρσια, Αφίδες, Θρίπες, Καρπόκαψα ροδακινιάς (*Grapholitha molesta*), Τζιτζικάκια, Φυλλορύκτες	2 | 20	14
Ε	**REVOLVER 1,8 EC**	Ακάρεα (*Aculus schlechtendali*, *Aculus* sp., *Eryophyes* spp.), Θρίπες (*Frankliniella occidentalis, Thrips* sp.), Πανόνυγχος (*Panonychus ulmi*), Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), Ψύλλα	2 | 14	14
Ε	**SCORPION EC**	Ακάρεα, Αφίδες, Βαμβακάδα, Κοκκοειδή, Πανόνυγχος, Παρλατόρια, Σφαιρολεκάνιο, Τετράνυχοι, Φυλλοδέτες, Ψώρα (μυτιλόμορφη), Ψώρα Σαν Ζοζέ	2 | 60	M/E
Μ	**ALANDIN 100 EC**	Ωίδιο	2|12-14	14
Μ	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	8 | 7	ΔΟ
Μ	**MORGAN 80 WG**	Φαιά σήψη ανθέων και κλάδων (*Monilia* spp.)	2 | 7-14	21
Μ	**PENCOL 10 EC**	Ωίδιο	3 | 7-14	14
Μ	**RIBBON 12 EC**	Ωίδιο	3 | -	21
ΧΜ	**BORDO 20 WG**	Εξώασκος, Κορύνεο, Φαιά σήψη	2 | -	ΔΟ
ΧΜ	**BORDO 20 WP**	Εξώασκος, Κορύνεο, Φαιά σήψη	2 | -	ΔΟ
ΧΜ	**COURE FLOW 38 SC**	Βακτηριακό έλκος, Εξώασκος, Κλαδοσπορίωση, Κορύνεο, Φαιά σήψη	4 | -	ΔΟ
ΧΜ	**CUPRICO 50 WP**	Κορύνεο, Φαιά σήψη	3 | -	ΔΟ
ΧΜ	**CURENOX 50 WG**	Βακτηριακό έλκος, Εξώασκος, Κλαδοσπορίωση, Κορύνεο, Φαιά σήψη	4 | -	ΔΟ
ΧΜ	**HYDROPLUS NEW 40 WG**	Κορύνεο, Φαιά σήψη	3 | -	ΔΟ
ΧΜ	**ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP**	Εξώασκος, Κορύνεο	4 | -	ΔΟ
ΧΜ	**ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP**	Βακτηριακό έλκος, Εξώασκος, Κλαδοσπορίωση, Κορύνεο, Φαιά σήψη	4 | -	ΔΟ

(1) Κατηγορία: Ε Εντομοκτόνα, Υ Υποκαπνιστικά, Μ Μυκητοκτόνα, ΧΜ Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Ζ Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Βερικοκιά ► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
Z	**ABILEST® 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	IFESTOS TF 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	IPIGLYCE NEW 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	KEYNERON GREEN 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	YAMBO 18/18 SL*	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια), Πολυετή ζιζάνια	1-2 | 90	ΔΟ

** Άνω των τριών (3) ετών.*

Βρώμη

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.)	1	30
	SWEEP MAX 500 EC	Αγρότιδα ή Καραφατμέ (*Agrotis* spp.), Αφίδες, Κνεφάσια (*Cnephasia* sp.), Κολεόπτερα – Σκαθάρια, Κριόκερο	2 | 14	28
M	**COMRADE SC**	Σεπτορίωση	2 | 21	42
	FRAME 80 WG	Ωίδιο	2 | 14	ΔΟ
	LAGOON 25 EW	Ελμινθοσπορίωση, Σεπτορίωση	1	28
Z	**VERITY 750 SL**	Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ

Βυσσινιά

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Ανάρσια, Αφίδες, Καρπόκαψα δαμασκηνιάς, Μύγα Μεσογείου, Ραγολέτιδα, Φυλλοδέτες	1	7
	KITROFEN ULTRA 100 EC	Βαμβακάδα (ή Διάσπις), Ψώρα Σαν Ζοζέ	1 (πριν την άνθηση)	Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
XM	**BORDO 20 WG**	Εξώασκος, Κορύνεο, Φαιά σήψη	2 | -	ΔΟ
	BORDO 20 WP	Εξώασκος, Κορύνεο, Φαιά σήψη	2 | -	ΔΟ
Z	**FENHEX 24 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	180
	YAMBO 18/18 SL*	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια), Πολυετή ζιζάνια	1-2 | 90	ΔΟ

** Άνω των τριών (3) ετών.*

Γαιοκάρδαμο

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	M/E
	REVENGE 200 SL	Αφίδες	1	7
Z	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	21

Γαρυφαλλιά

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
M	**RIBBON 12 EC**	Σκωρίαση	5 | -	M/E

Γκαζόν (γρασίδι)

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**REBEL 100 EW**	Αλευρώδεις, Αφίδες	2 | -	M/E

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Γκρέιπφρουτ

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Λεκάνιο, Μύγα Μεσογείου	1	30
E	**IMIDAN® 50 WP**	Μύγα Μεσογείου	1	14
E	**KITROFEN ULTRA 100 EC**	Ασπιδιωτός *(Aspidiotus* sp.*)*, Κόκκινη ψώρα (*Aonidiella* sp.), Λεκάνιο *(Saissetia* sp.*)*, Μυτιλόμορφη ψώρα *(Lepidosaphes beckii)*, Παρλατόρια *(Parlatoria pergandei)*	1	30
E	**LAOTTA 1,8 EC**	Κίτρινος τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), Κόκκινος τετράνυχος των εσπεριδοειδών (*Panonychus citri*), Παραμορφωτικό άκαρι (*Aceria sheldoni*), Φυλλοκνίστης	1-3 | 7	10
E	**PHANTOM 2,5 EC**	Αλευρώδης (Εριώδης), Αφίδες, Λεκάνιο, Μύγα μεσογείου	1	30
E	**REVENGE 200 SL**	Αφίδες, Κοκκοειδή, Παρλατόρια, Φυλλοκνίστης, Ψευδόκοκκος, Ψώρα (κόκκινη)	2 | 30	14 (για δόση 70 κ.εκ./στρ.), 60 (για δόση 150 κ.εκ./στρ.)
E	**SCORPION EC**	Αλευρώδεις, Κοκκοειδή, Λεκάνιο, Πανόνυγχος, Τετράνυχοι, Ψευδόκοκκος, Ψώρα (άσπρη), Ψώρα (κόκκινη), Ψώρα (μαύρη)	2 (με μια επιπλέον φθινοπωρινή εφαρμογή για *Aleurothrixus flocossus*) | 60	M/E
E	**SERVATRAY**	Μύγα Μεσογείου	1	M/E
M	**FRAME 80 WG**	Ακάρεα	8 | 7	ΔΟ
M	**METMAN 25 WP**	Φυτόφθορα	1 (Στάγδην άρδευση), 3 |14 (Ψεκασμός)	14
M	**PIRGUS 80 WG**	Φυτόφθορα	3 | 30	14
XM	**BORDO 20 WG**	Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae)*, Κορυφοξήρα	2 | -	21
XM	**BORDO 20 WP**	Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae)*, Κορυφοξήρα	2 | -	21
XM	**COURE FLOW 38 SC**	Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση, Φυτόφθορα καρπών	2 | -	21
XM	**CUPRICO 50 WP**	Ανθράκωση, Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae)*, Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση, Φυτόφθορα καρπών	2 | -	21
XM	**CURENOX 50 WG**	Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση, Φυτόφθορα καρπών	2 | -	21
XM	**HYDROPLUS NEW 40 WG**	Ανθράκωση, Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae)*, Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση, Φυτόφθορα καρπών	3 | -	21
XM	**ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP**	Κορυφοξήρα, Φυτόφθορα καρπών	2 | -	21
XM	**ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP**	Βακτηρίωση *(Pseudomonas syringae)*, Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση, Φυτόφθορα καρπών	2 | -	21
Z	**ABILEST® 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
Z	**FENHEX 24 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	21
Z	**IFESTOS TF 36 SL**	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
Z	**IPIGLYCE NEW 36 SL**	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
Z	**KEYNERON GREEN 36 SL**	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
Z	**YAMBO 18/18 SL***	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια), Πολυετή ζιζάνια	1-2 | 90	ΔΟ

** Άνω των τριών (3) ετών.*

Γλυκό καλαμπόκι

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	2|45	M/E
E	**EFALVAC 1,5 GR**	Διαβρώτικα	1 εφαρμογή ανά 3 χρόνια	ΔΟ
		Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.), Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.), Σύμφυλα	1	ΔΟ

Γλυκό λάιμ

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**SERVATRAY**	Μύγα Μεσογείου	1	M/E

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Γογγύλι

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**EFALVAC 1,5 GR**	Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.), Υλέμυια	1	ΔΟ
E	**REBEL 100 EW**	*Autographa* sp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Άλτης, Αφίδες, Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Δορυφόρος, Θρίπες, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τζιτζικάκια, Φθοριμαία	2 | -	7
Z	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	ΔΟ

Γουλί

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**EFALVAC 1,5 GR**	Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.), Υλέμυια	1	ΔΟ
E	**SWEEP MAX 500 EC**	*Euxoa* spp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Αφίδες, Κασσίδα, Κλεονός, Λίξος, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τριχοπλούσια, Φθοριμαία	2 | 10	14

Δαμασκηνιά

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**DELMUS 2,5 EC**	Ανάρσια, Αφίδες, Καρπόκαψα δαμασκηνιάς (*Cydia funebrana*), Μύγα Μεσογείου, Φυλλοδέτες	1	7
E	**KITROFEN ULTRA 100 EC**	Βαμβακάδα (ή Διάσπις), Ψώρα Σαν Ζοζέ	1 (πριν την άνθηση)	Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
E	**PHANTOM 2,5 EC**	Ανάρσια, Αφίδες, Καρπόκαψα δαμασκηνιάς (*Cydia funebrana*), Μύγα μεσογείου, Ραγολέτιδα, Φυλλοδέτες, Ψώρα Σαν Ζοζέ	1	7
E	**REVENGE 200 SL**	Αφίδες , Καρπόκαψα δαμασκηνιάς (*Cydia funebrana*), Φυλλορύκτες	2 | 20	14
E	**REVOLVER 1,8 EC**	Ακάρεα (*Aculus schlechtendali*, *Aculus* sp., *Eryophyes* spp.), Πανόνυχος (*Panonychus ulmi*), Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*)	1	28
E	**SCORPION EC**	Ακάρεα, Αφίδες, Βαμβακάδα, Κοκκοειδή, Πανόνυχος, Παρλατόρια, Σφαιρολεκάνιο, Τετράνυχοι, Φυλλοδέτες, Ψώρα (μυτιλόμορφη), Ψώρα Σαν Ζοζέ	2 | 60	M/E
M	**BOTREFIN® PLUS 37,5/25 WG**	Φαιά σήψη (*Monilia* spp.)	3 | 7-10	7
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	8 | 7	ΔΟ
M	**MORGAN 80 WG**	Εξώασκος, Φαιά σήψη ανθέων και κλάδων (*Monilia* spp.)	4 | 7-14	21
M	**RIBBON 12 EC**	Ωίδιο	3 | -	21
XM	**BORDO 20 WG**	Εξώασκος, Κορύνεο, Φαιά σήψη	2 | -	ΔΟ
XM	**BORDO 20 WP**	Εξώασκος, Κορύνεο, Φαιά σήψη	2 | -	ΔΟ
XM	**COURE FLOW 38 SC**	Βακτηριακό έλκος, Εξώασκος, Κλαδοσπορίωση, Κορύνεο, Φαιά σήψη	4 | -	ΔΟ
XM	**CUPRICO 50 WP**	Βακτηριακό έλκος, Εξώασκος, Κλαδοσπορίωση, Κορύνεο, Φαιά σήψη	4 | -	ΔΟ
XM	**CURENOX 50 WG**	Βακτηριακό έλκος, Εξώασκος, Κλαδοσπορίωση, Κορύνεο, Φαιά σήψη	4 | -	ΔΟ
XM	**HYDROPLUS NEW 40 WG**	Βακτηριακό έλκος, Εξώασκος, Κλαδοσπορίωση, Κορύνεο, Φαιά σήψη	4 | -	ΔΟ
XM	**ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP**	Εξώασκος, Κορύνεο	4 | -	ΔΟ
XM	**ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP**	Βακτηριακό έλκος, Εξώασκος, Κλαδοσπορίωση, Κορύνεο, Φαιά σήψη	4 | -	ΔΟ
Z	**FENHEX 24 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	180
Z	**YAMBO 18/18 SL***	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια), Πολυετή ζιζάνια	1-2 | 90	ΔΟ

** Άνω των τριών (3) ετών.*

Δασικά είδη σε φυτώριο ► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**SWEEP MAX 500 EC**	Λυμάντρια	2 | 10	M/E

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Δασικά είδη σε φυτώριο ► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	3 | 7	M/E

Δενδρώνες

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
ΕΠ	**MERIDIEN 5 GB**	Σαλιγκάρια/ Γυμνοσάλιαγκες (λείμακες, αρίονες)	3 | -	M/E

Ελαιοκράμβη

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**PHANTOM 2,5 EC**	Άλτης, Αφίδες, Σκαθάρι *(Ceuthorrynchus* spp.*)*	1	ΔΟ
E	**REBEL 100 EW**	Αφίδες	2 | -	28
E	**REVENGE 200 SL**	Αφίδες, Σκαθάρι της γύρης	2 | 7	20
E	**SWEEP MAX 500 EC**	Άλτης, Κηκιδόμυγες, Κολεόπτερα - Σκαθάρια	2 | 14	21
Z	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	ΔΟ

Ελιά

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Βαμβακάδα, Δάκος, Λεκάνιο, Πυρηνοτρήτης	1	7
E	**IMIDAN® 50 WP**	Δάκος, Πυραλίδα της ελιάς (*Euzophera pinguis*)*, Πυρηνοτρήτης, Τζιτζικάκια*	2 | 10	21
E	**KITROFEN ULTRA 100 EC**	Λεκάνιο, *Parlatoria oleae* (δευτερεύουσα δράση)	1	Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
E	**MATEUS® 10 CS (Zeon Tech)**	Δάκος	2 | ανάλογα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις δακοπαγίδες	7
E		Πυρηνοτρήτης	2 | 14	7
E	**PHANTOM 2,5 EC**	Δάκος, Θρίπες, Λεκάνιο, Πυρηνοτρήτης	1	7
E	**REVENGE 200 SL**	Δάκος, Πυρηνοτρήτης	2 | 14	7
E	**SCORPION EC**	Ακάρεα*, Βαμβακάδα*, Κοκκοειδή*, Λεκάνιο*, Παρλατόρια*, Πολλίνια*, Ψώρα (άσπρη)*, Ψώρα (μυτιλόμορφη)*, Ψώρες (λοιπές)*	1-2 | 14min	M/E
M	**FRAME 80 WG****	Ακάρεα	2 | 30	90
XM	**BORDO 20 WG**	Γλοιοσπόριο, Καρκίνωση, Κυκλοκόνιο	2 | -	21
XM	**BORDO 20 WP**	Γλοιοσπόριο, Καρκίνωση, Κυκλοκόνιο	2 | -	21
XM	**COURE FLOW 38 SC**	Γλοιοσπόριο, Καρκίνωση, Κυκλοκόνιο	2 | -	21
XM	**CUPRICO 50 WP**	Γλοιοσπόριο, Καρκίνωση, Κυκλοκόνιο	2 | -	21
XM	**CURENOX 50 WG**	Γλοιοσπόριο, Καρκίνωση, Κυκλοκόνιο	2 | -	21
XM	**HYDROPLUS NEW 40 WG**	Γλοιοσπόριο, Καρκίνωση, Κυκλοκόνιο	2 | -	21
XM	**ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP**	Γλοιοσπόριο, Κυκλοκόνιο	2 | -	21
XM	**ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP**	Γλοιοσπόριο, Καρκίνωση, Κυκλοκόνιο	2 | -	21
Z	**FENHEX 24 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	21 ημέρες (παρουσία ελιών στο έδαφος) | 7 ημέρες (χωρίς παρουσία ελιών στο έδαφος)
Z	**IFESTOS TF 36 SL**	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
Z	**IPIGLYCE NEW 36 SL**	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
Z	**KEYNERON GREEN 36 SL**	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
Z	**YAMBO 18/18 SL*****	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια), Πολυετή ζιζάνια, Εξάλειψη παραφυάδων	1-2 | 90	60

** Χρήση Ήσσονος Σημασίας.* | *** Ποικιλία: Πράσινη ελιά Χαλκιδικής.* | **** Άνω των τριών (3) ετών.*

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Ζαχαρότευτλα

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	Μ/Ε
	DELMUS 2,5 EC	Άλτης, Αφίδες, Κασσίδα, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Μύγα των τεύτλων, Σποντόπτερα	1	30
	EFALVAC 1,5 GR	Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.), Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	ΔΟ
	PHANTOM 2,5 EC	Άλτης, Κλεονός, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Σκαθάρι	1	30
	SWEEP MAX 500 EC	*Euxoa* spp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Αφίδες, Κασσίδα, Κλεονός, Λίξος, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τριχοπλούσια, Φθοριμαία	2 | 10	14
M	**AZOFIN® 250 SC**	Κερκοσπορίωση, Ωίδιο	2 | 21	30
	DIFENOFIN® 250 EC	Κερκοσπορίωση	3|21	21
	DYNASTY 20/12,5 SC	Κερκοσπορίωση	2|21	21
	FRAME 80 WG	Τετράνυχος	3 | -	Μ/Ε
		Ωίδιο	2 | 14	Μ/Ε
XM	**BORDO 20 WG**	Κερκοσπορίωση	4 | -	21
	BORDO 20 WP	Κερκοσπορίωση	4 | -	21
	COURE FLOW 38 SC	Κερκοσπορίωση	3 | 10-14	21
	CUPRICO 50 WP	Κερκοσπορίωση	4 | 10-14	21
	CURENOX 50 WG	Κερκοσπορίωση	3 | 10-14	21
	HYDROPLUS NEW 40 WG	Κερκοσπορίωση	4 | 10-14	21
	ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP	Κερκοσπορίωση	3 | 10-14	21
Z	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	ΔΟ
	QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	60
	SELAS 24 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια (Ετήσια και πολυετή)	1	110
	TERRIFIC 96 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ

Ηλίανθος

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	Μ/Ε
	EFALVAC 1,5 GR	Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	ΔΟ
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	2 | 7	ΔΟ
Z	**ABILEST 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	FOCUS® 10 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	ΔΟ
	LUPO 365 CS	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	MAZA 4 SL*	Πλατύφυλλα ζιζάνια	1	ΔΟ**
	PENDINOVA® 330 EC	Αγρωστώδη (ετήσια) Ζιζάνια, Πλατύφυλλα (ετήσια) Ζιζάνια	1	ΔΟ
	QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	35

** Χρησιμοποιείται μόνο σε υβρίδια/ποικιλίες Ηλίανθου τα οποία είναι ανθεκτικά σε ιμιδαζολινονικά ζιζανιοκτόνα. | ** Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος (εφαρμόζεται από τα 2 έως τα 8 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας).*

Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης)

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	Μ/Ε

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Καλλιεργούμενοι αγροί

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
ΕΠ	**MERIDIEN 5 GB**	Σαλιγκάρια/ Γυμνοσάλιαγκες (λείμακες, αρίονες)	3 | -	Μ/Ε

Καλλωπιστικά

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Ε	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	Μ/Ε
	REBEL 100 EW	Αλευρώδεις, Αφίδες	2 | -	Μ/Ε
	SWEEP MAX 500 EC	Αλευρώδεις, Αφίδες, Θρίπες, Φυλλοδέτες, Φυλλορύκτες	2 | 10	Μ/Ε
ΧΜ	**BORDO 20 WG**	Περονόσπορος, Σεπτορίωση, Φυτόφθορα	3 | -	Μ/Ε
	BORDO 20 WP	Περονόσπορος, Σεπτορίωση, Φυτόφθορα	3 | -	Μ/Ε
	COURE FLOW 38 SC	Περονόσπορος, Φυτόφθορα	2 | 7-10	Μ/Ε
	CURENOX 50 WG	Περονόσπορος, Φυτόφθορα	2 | 7-10	Μ/Ε
	ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP	Περονόσπορος, Φυτόφθορα	2 | 7-10	Μ/Ε
Ζ	**ABILEST® 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	LUPO 365 CS	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	Μ/Ε

Καλλωπιστικά (Θ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Ε	**DELMUS 2,5 EC**	Αλευρώδεις, Αφίδες, Θρίπες, Φυλλοδέτες	3 | 7	Μ/Ε
	PHANTOM 2,5 EC	Αλευρώδεις, Αφίδες, Θρίπες, Κάμπια γαρυφάλλου, Μηλολόνθη, Φυλλοδέτες	3 | 7	Μ/Ε
	REVOLVER 1,8 EC	Ακάρεα (*Eriophyes* spp.), Θρίπας (*Frankliniella occidentalis*), Λιριόμυζα, Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), Ψύλλα	4 | 7	Μ/Ε
	SHOOTER 200 SL	Αλευρώδεις, Αφίδες	1	Μ/Ε
Μ	**PIRGUS 80 WG***	Φυτόφθορα	1-3 | 30(1) 1-2 | 30(2)	Μ/Ε
	PROMESS 72,2 SL	Πύθιο, Φυτόφθορα	-	Μ/Ε (Εφαρμογή στο έδαφος)
ΕΠ	**VAPAM FORTE 51 SL**	Απολύμανση εδάφους, Ζιζάνια (βλαστάνοντες σπόροι ετήσιων ζιζανίων), Μύκητες εδάφους, Νηματώδεις	Μία (1) εφαρμογή κάθε τρίτο έτος στο ίδιο έδαφος	Μ/Ε

** Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.*
(1) Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος. | (2) Ριζοπότισμα.

Καλλωπιστικά βολβώδη (Θ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Ε	**SHOOTER 200 SL**	Αφίδες	1	Μ/Ε

Καλλωπιστικά (Υ) ► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Ε	**DELMUS 2,5 EC**	Αλευρώδεις, Αφίδες, Θρίπες, Φυλλοδέτες	3 | 7	Μ/Ε
	PHANTOM 2,5 EC	Αλευρώδεις, Αφίδες, Θρίπες, Κάμπια γαρυφάλλου, Μηλολόνθη, Φυλλοδέτες	3 | 7	Μ/Ε
Μ	**PIRGUS 80 WG***	Φυτόφθορα	1-3 | 30(1) 1-2 | 30(2)	Μ/Ε
	PROMESS 72,2 SL	Πύθιο, Φυτόφθορα	-	Μ/Ε (Εφαρμογή στο έδαφος)

** Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.*
(1) Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος. | (2) Ριζοπότισμα.

(1) Κατηγορία: Ε Εντομοκτόνα, Υ Υποκαπνιστικά, Μ Μυκητοκτόνα, ΧΜ Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Ζ Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Καλλωπιστικά (Υ) ► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
ΕΠ	**VAPAM FORTE 51 SL**	Απολύμανση εδάφους, Ζιζάνια (βλαστάνοντες σπόροι ετήσιων ζιζανίων), Μύκητες εδάφους, Νηματώδεις	Μία (1) εφαρμογή κάθε τρίτο έτος στο ίδιο έδαφος	Μ/Ε

Καλλωπιστικά (φυτώρια)

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
Ε	**PHANTOM 2,5 EC**	Αλευρώδεις, Αφίδες, Θρίπες, Κάμπια γαρυφάλλου, Μηλολόνθη, Φυλλοδέτες	3 | 7	Μ/Ε
Ζ	**ABILEST® 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ

Καπνά και κατεργασμένα προϊόντα αυτών

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
Υ	**PHOSTEK® 57 TB**	Έντομα και ακάρεα αποθηκευμένων προϊόντων	-	-
	PHOSTEK® PELLETS	Έντομα και ακάρεα αποθηκευμένων προϊόντων	-	-
	PHOSTEK® SACHETS	Έντομα και ακάρεα αποθηκευμένων προϊόντων	-	-

Καπνός

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
Ε	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	Μ/Ε
	DELMUS 2,5 EC	Θρίπες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.)	3 | 7	7
	EFALVAC 1,5 GR	Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* spp.), Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.), Τιπούλα	1	Μ/Ε
	PHANTOM 2,5 EC	Αφίδες, Επίτριξ, Θρίπες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.)	3 | 7	7
	SHOOTER 200 SL	Αφίδες	1	Μ/Ε
	SWEEP MAX 500 EC	*Euxoa* spp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Αφίδες, Θρίπες, Κασσίδα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τριχοπλούσια, Φθορίμαία	2 | 10	14
Μ	**ALANDIN 100 EC**	Ωίδιο	2|10-14	14
	FRAME 80 WG	Ωίδιο	8 | 7	ΔΟ
	PROMESS 72,2 SL	Πύθιο, Φυτόφθορα	-	21 (Εφαρμογή στο έδαφος)
Ζ	**ABILEST 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	LUPO 365 CS	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	IFESTOS TF 36 SL	Οροβάγχη	2 | -	7
	IPIGLYCE NEW 36 SL	Οροβάγχη	2 | -	7
	KEYNERON GREEN 36 SL	Οροβάγχη	2 | -	7
	PENDINOVA® 330 EC	Αγρωστώδη (ετήσια) Ζιζάνια, Πλατύφυλλα (ετήσια) Ζιζάνια	1	ΔΟ
	QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	35
	TERRIFIC 96 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ

Καπνοσπορεία (Θ)

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
ΕΠ	**VAPAM FORTE 51 SL**	Απολύμανση εδάφους, Ζιζάνια (βλαστάνοντες σπόροι ετήσιων ζιζανίων), Μύκητες εδάφους, Νηματώδεις	Μία (1) εφαρμογή κάθε τρίτο έτος στο ίδιο έδαφος	Μ/Ε

(1) Κατηγορία: Ε Εντομοκτόνα, Υ Υποκαπνιστικά, Μ Μυκητοκτόνα, ΧΜ Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Ζ Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Κάρδαμο

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	Μ/Ε
	REVENGE 200 SL	Αφίδες	1	7
Z	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	21

Καρότο

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	Μ/Ε
	EFALVAC 1,5 GR	Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.), Υλέμυια, Ψύλλα (*Psila rosae*)	1	ΔΟ
	PHANTOM 2,5 EC	Αλευρώδεις, Αφίδες, Θρίπες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.)	3 | 14	7
	SWEEP MAX 500 EC	*Autographa* sp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Άλτης, Αφίδες, Δορυφόρος, Θρίπες, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τζιτζικάκια, Φθοριμαία	2 | 10	3
M	**DYNASTY 20/12,5 SC**	Αλτερνάρια, Ωίδιο	3|14	14
XM	**COURE FLOW 38 SC**	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
	CURENOX 50 WG	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
	HYDROPLUS NEW 40 WG	Βακτηριώσεις, Κερκοσπορίωση	4 | 7-10	7
	ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP	Περονόσπορος, Φυτόφθορα καρπών	3 | 7-14	7
	ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
Z	**ABILEST 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	FOCUS® 10 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	35
	LUPO 365 CS	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	PENDINOVA® 330 EC	Αγρωστώδη (ετήσια) Ζιζάνια, Πλατύφυλλα (ετήσια) Ζιζάνια	1	140
	QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	21

Καρότο (Θ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ

Καρότο (Υ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
M	**AZOFIN® 250 SC**	Αλτερνάρια, Ωίδιο	3 | 7	14
	FRAME 80 WG	Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
	SCALA® 40 SC	Αλτερναρίωση, Βοτρύτης	2|10-14	14

Καρπούζι

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	Μ/Ε
M	**RIBBON 12 EC**	Ωίδιο	5 | 7-10	7
XM	**BORDO 20 WG**	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	4 | -	7
	BORDO 20 WP	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	4 | -	7
	ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP	Περονόσπορος, Φυτόφθορα καρπών	3 | 7-14	7

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Καρπούζι (Θ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	3 | 7	3
E	**LAOTTA 1,8 EC**	Κίτρινος τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), Λιριόμυζα	1-2 | 7	3
E	**REVOLVER 1,8 EC**	Θρίπες *(Frankliniella occidentalis, Thrips* sp.*)*, Λιριόμυζα, Τετράνυχος *(Tetranychus urticae)*	3 | 7	3
E	**SHOOTER 200 SL**	Αλευρώδεις, Αφίδες	2|10	3
M	**ALANDIN 100 EC**	Ωίδιο	2|10-14	3
M	**AZOFIN® 250 SC**	Ωίδιο	3 | 10	3
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
M	**PENCOL 10 EC**	Ωίδιο	3 | 7-14	3
M	**PIRGUS 80 WG**	Περονόσπορος	1-2 | 8-10	3
M	**SIVAR 25 SC**	Ωίδιο	3 | 10	3
XM	**CUPRICO 50 WP**	Ανθράκωση, Βακτηρίωση (*Erwinia tracheiphila*), Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος	4 | 10-14	7
XM	**HYDROPLUS NEW 40 WG**	Ανθράκωση, Βακτηρίωση (*Erwinia tracheiphila*), Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος	4 | 10-14	7

Καρπούζι (Υ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	3 | 7	3
E	**LAOTTA 1,8 EC**	Κίτρινος τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), Λιριόμυζα	1-2 | 7	5
E	**REVOLVER 1,8 EC**	Τετράνυχος *(Tetranychus urticae)*	3 | 7	3
E	**SHOOTER 200 SL**	Αφίδες	1	3
E	**SWEEP MAX 500 EC**	*Autographa* sp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Αφίδες, Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Δορυφόρος, Θρίπες, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τζιτζικάκια, Φθοριμαία	2 | 10	3
M	**ALANDIN 100 EC**	Ωίδιο	2|10-14	3
M	**AZOFIN® 250 SC**	Ωίδιο	3 | 10	3
M	**CABRIO® DUO 4/7,2 EC**	Περονόσπορος	3 | 7	3
M	**COLLIS® 20/10 SC**	Ωίδιο	3 | 10-14	3
M	**ELLATHION DP (Micronized)**	Ωίδιο	3 | 10	ΔΟ
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
M	**PENCOL 10 EC**	Ωίδιο	3 | 7-14	3
M	**PIRGUS 80 WG**	Περονόσπορος	1-2 | 8-10	3
XM	**CUPRICO 50 WP**	Ανθράκωση, Βακτηρίωση (*Erwinia tracheiphila*), Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος	4 | 10-14	7
XM	**HYDROPLUS NEW 40 WG**	Ανθράκωση, Βακτηρίωση (*Erwinia tracheiphila*), Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος	4 | 10-14	7

Καρυδιά ► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Καρπόκαψα (*Cydia pomonella*)	2 | 14	30
E	**KITROFEN ULTRA 100 EC**	Ψώρα Σαν Ζοζέ*	1	Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
E	**REVOLVER 1,8 EC**	Ακάρεα (*Aculus schlechtendali*, *Aculus* sp., *Eryophyes* spp.), Πανόνυγχος *(Panonychus ulmi)*, Τετράνυχος *(Tetranychus urticae)*	1	60
E	**SCORPION EC**	Ακάρεα*, Κίτρινος τετράνυχος*, Κόκκινος τετράνυχος*, Ψώρα Σαν Ζοζέ*, Ψώρες (λοιπές)*	1-2 | 2min	M/E
M	**MORGAN 80 WG**	Ανθράκωση*	4 | 7-14	ΔΟ

**Χρήση Ήσσονος Σημασίας.*

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Καρυδιά ► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
XM	**BORDO 20 WG**	Ανθράκωση	3 | 10	28
	BORDO 20 WP	Ανθράκωση	3 | 10	28
	COURE FLOW 38 SC	Ανθράκωση, Κηλίδωση φύλλων και καρπών (*Xanthomonas juglandii*)	3 | 10	28
	CUPRICO 50 WP	Ανθράκωση, Κηλίδωση φύλλων και καρπών (*Xanthomonas juglandii*)	3 | 10	28
	CURENOX 50 WG	Ανθράκωση, Κηλίδωση φύλλων και καρπών (*Xanthomonas juglandii*)	3 | 10	28
	HYDROPLUS NEW 40 WG	Ανθράκωση, Κηλίδωση φύλλων και καρπών (*Xanthomonas juglandii*)	3 | 10	28
	ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP	Ανθράκωση, Κηλίδωση φύλλων και καρπών (*Xanthomonas juglandii*)	3 | 10	28
Z	**LUPO 365 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ

Καστανιά

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Καρπόκαψα καστανιάς (*Cydia* sp.)	2 | 14	30
	KITROFEN ULTRA 100 EC	Ψώρα Σαν Ζοζέ*	1	Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
	MATEUS® 10 CS (Zeon Tech)	Καρπόκαψα καστανιάς (*Cydia* sp.)	2 | 14	14
M	**MORGAN 80 WG**	Ανθράκωση*	4 | 7-14	ΔΟ

** Χρήση Ήσσονος Σημασίας*

Κερασιά ► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Ανάρσια, Αφίδες, Καρπόκαψα δαμασκηνιάς (*Cydia funebrana*), Μύγα Μεσογείου, Ραγολέτιδα, Φυλλοδέτες	1	7
	KITROFEN ULTRA 100 EC	Βαμβακάδα (ή Διάσπις), Ψώρα Σαν Ζοζέ	1 (πριν την άνθηση)	Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
	PHANTOM 2,5 EC	Ανάρσια, Αφίδες, Καρπόκαψα δαμασκηνιάς (*Cydia funebrana*), Μύγα μεσογείου, Ραγολέτιδα, Φυλλοδέτες, Ψώρα Σαν Ζοζέ	1	7
	REVENGE 200 SL	Αφίδες, Ραγολέτιδα	2 | 14	3
	SCORPION EC	Ακάρεα, Αφίδες, Βαμβακάδα (ή Διάσπις), Κοκκοειδή, Πανόνυγχος, Παρλατόρια, Σφαιρολεκάνιο, Τετράνυχοι, Φυλλοδέτες, Ψώρα (μυτιλόμορφη), Ψώρα Σαν Ζοζέ	2 | 60	M/E
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	8 | 7	ΔΟ
	MORGAN 80 WG	Φαιά σήψη	2 | 7-14	21
XM	**BORDO 20 WG**	Εξώασκος, Κορύνεο, Φαιά σήψη	2 | -	ΔΟ
	BORDO 20 WP	Εξώασκος, Κορύνεο, Φαιά σήψη	2 | -	ΔΟ
	COURE FLOW 38 SC	Βακτηριακό έλκος, Εξώασκος, Κλαδοσπορίωση, Κορύνεο, Φαιά σήψη	4 | -	ΔΟ
	CUPRICO 50 WP	Βακτηρίωση *(Pseudomonas syringae)*, Κορύνεο	4 | -	ΔΟ
	CURENOX 50 WG	Βακτηριακό έλκος, Εξώασκος, Κλαδοσπορίωση, Κορύνεο, Φαιά σήψη	4 | -	ΔΟ
	HYDROPLUS NEW 40 WG	Βακτηρίωση *(Pseudomonas syringae)*, Κορύνεο	4 | -	ΔΟ
	ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP	Εξώασκος, Κορύνεο	4 | -	ΔΟ
	ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP	Βακτηριακό έλκος, Εξώασκος, Κλαδοσπορίωση, Κορύνεο, Φαιά σήψη	4 | -	ΔΟ
Z	**FENHEX 24 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	180
	IFESTOS TF 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	IPIGLYCE NEW 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	KEYNERON GREEN 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Κερασιά ► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
Z	**LUPO 365 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	YAMBO 18/18 SL*	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια), Πολυετή ζιζάνια	1-2 | 90	ΔΟ

** Άνω των τριών (3) ετών.*

Κεχρί

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	2|45	Μ/Ε

Κιτριά

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**LAOTTA 1,8 EC**	Κίτρινος τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), Κόκκινος τετράνυχος των εσπεριδοειδών (*Panonychus citri*), Παραμορφωτικό άκαρι (*Aceria sheldoni*), Φυλλοκνίστης	1-3 | 7	10
	SERVATRAY	Μύγα Μεσογείου	1	Μ/Ε
M	**FRAME 80 WG**	Ακάρεα	8 | 7	ΔΟ
	PIRGUS 80 WG	Φυτόφθορα	3 | 30	14
XM	**BORDO 20 WG**	Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae)*, Κορυφοξήρα	2 | -	21
	BORDO 20 WP	Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae)*, Κορυφοξήρα	2 | -	21
	COURE FLOW 38 SC	Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση, Φυτόφθορα καρπών	2 | -	21
Z	**FENHEX 24 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	21
	IFESTOS TF 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	IPIGLYCE NEW 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	KEYNERON GREEN 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	YAMBO 18/18 SL*	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια), Πολυετή ζιζάνια	1-2 | 90	ΔΟ

** Άνω των τριών (3) ετών.*

Κιχώριο

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
M	**FRAME 80 WG**	Τετράνυχος, Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ

Κολοκύθα

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	Μ/Ε

Κολοκύθα (Θ)

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**LAOTTA 1,8 EC**	Κίτρινος Τετράνυχος(*Tetranychus urticae*), Λιριόμυζα	1-2 | 7	3
	SHOOTER 200 SL	Αλευρώδεις, Αφίδες	2|10	3
M	**ALANDIN 100 EC**	Ωίδιο	2|10-14	3
	FRAME 80 WG	Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
	PENCOL 10 EC	Ωίδιο	3 | 7-14	3
	PIRGUS 80 WG	Περονόσπορος	1-2 | 8-10	3
	SIVAR 25 SC	Ωίδιο	3 | 10	3

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Κολοκύθα (Υ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**LAOTTA 1,8 EC**	Κίτρινος τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), Λιριόμυζα	1-2 | 7	5
E	**SHOOTER 200 SL**	Αφίδες	1	3
E	**SWEEP MAX 500 EC**	*Autographa* sp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Αφίδες, Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Δορυφόρος, Θρίπες, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τζιτζικάκια, Φθορίμαία	2 | 10	3
M	**ALANDIN 100 EC**	Ωίδιο	2|10-14	3
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
M	**PENCOL 10 EC**	Ωίδιο	3 | 7-14	3
M	**PIRGUS 80 WG**	Περονόσπορος	1-2 | 8-10	3

Κολοκύθι

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	Μ/Ε
M	**RIBBON 12 EC**	Ωίδιο	5 | 7-10	7
XM	**BORDO 20 WG**	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	4 | -	7
XM	**BORDO 20 WP**	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	4 | -	7
XM	**ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP**	Περονόσπορος, Φυτόφθορα καρπών	3 | 7-14	7
Z	**QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1 | -	7

Κολοκύθι (Θ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	3 | 7	3
E	**LAOTTA 1,8 EC**	Κίτρινος τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), Λιριόμυζα	1-2 | 7	3
E	**MATEUS® 10 CS (Zeon Tech)**	Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	2 | 14	3
E	**REVOLVER 1,8 EC**	Θρίπες *(Frankliniella occidentalis, Thrips* sp.*)*, Λιριόμυζα, Τετράνυχος *(Tetranychus urticae)*	4 | 7	3
E	**SHOOTER 200 SL**	Αλευρώδεις, Αφίδες	2|10	3
M	**ALANDIN 100 EC**	Ωίδιο	2|10-14	3
M	**AZOFIN® 250 SC**	Ωίδιο	3 | 10	3
M	**CABRIO® DUO 4/7,2 EC**	Περονόσπορος, Ωίδιο	3 | 7-8	1
M	**COLLIS® 20/10 SC**	Ωίδιο	3 | 7-10	3
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
M	**ORVEGO® 30/22,5 SC**	Περονόσπορος	2|7-10	3
M	**PENCOL 10 EC**	Ωίδιο	3 | 7-14	3
M	**PIRGUS 80 WG**	Περονόσπορος	1-3 | 8-10	3
M	**SCALA® 40 SC**	Βοτρύτης	3|10-14	3
M	**SIVAR 25 SC**	Ωίδιο	3 | 10	3
XM	**CUPRICO 50 WP**	Ανθράκωση, Βακτηρίωση (*Erwinia tracheiphila*), Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος	4 | 10-14	7
XM	**HYDROPLUS NEW 40 WG**	Ανθράκωση, Βακτηρίωση (*Erwinia tracheiphila*), Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος	4 | 10-14	7

Κολοκύθι (Υ) ► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	3 | 7	3

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Κολοκύθι (Υ) ► Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**MATEUS® 10 CS (Zeon Tech)**	Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	2 | 14	3
	SHOOTER 200 SL	Αφίδες	1	3
M	**ALANDIN 100 EC**	Ωίδιο	2|10-14	3
	AZOFIN® 250 SC	Ωίδιο	3 | 10	3
	COLLIS® 20/10 SC	Ωίδιο	3 | 7-10	3
	FRAME 80 WG	Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
	ORVEGO® 30/22,5 SC	Περονόσπορος	2|7-10	3
	PENCOL 10 EC	Ωίδιο	2 | 10	3
	PIRGUS 80 WG	Περονόσπορος	1-3 | 8-10	3
XM	**CUPRICO 50 WP**	Ανθράκωση, Βακτηρίωση (*Erwinia tracheiphila*), Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος	4 | 10-14	7
	HYDROPLUS NEW 40 WG	Ανθράκωση, Βακτηρίωση (*Erwinia tracheiphila*), Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος	4 | 10-14	7

Κορομηλιά

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
Z	**FENHEX 24 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	180

Κουκιά

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Πράσινο σκουλήκι	2 | 14	7
	PHANTOM 2,5 EC	Αφίδες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Πράσινο σκουλήκι	2 | 14	ΔΟ
Z	**ABILEST 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	PENDINOVA® 330 EC	Αγρωστώδη (ετήσια) Ζιζάνια, Πλατύφυλλα (ετήσια) Ζιζάνια	1	ΔΟ
	QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	21

Κουμκουάτ

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**LAOTTA 1,8 EC**	Πανόνυχος, Παραμορφωτικό άκαρι, Τετράνυχοι, Φυλλοκνίστης	1-3 | 7	10
	REVENGE 200 SL	Αφίδες, Κοκκοειδή, Παρλατόρια, Φυλλοκνίστης, Ψευδόκοκκος, Ψώρα (κόκκινη)	2 | 30	14 (για δόση 70 κ.εκ./στρ.), 30 (για δόση 150 κ.εκ./στρ.)
	SERVATRAY	Μύγα Μεσογείου	1	M/E
Z	**YAMBO 18/18 SL***	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια), Πολυετή ζιζάνια	1-2 | 90	ΔΟ

Κουνουπίδι ► Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	M/E
	DELMUS 2,5 EC	Αφίδες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλούζια, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	2 | 14	7
	REBEL 100 EW	*Autographa* sp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ), Αλευρώδεις, Άλτης, Αφίδες, Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Δορυφόρος, Θρίπες, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τζιτζικάκια, Φθορίμαία	2 | -	7

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Κουνουπίδι ► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**SWEEP MAX 500 EC**	*Autographa* sp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Άλτης, Αφίδες, Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Δορυφόρος, Θρίπες, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τζιτζικάκια, Φθοριμαία	2 | 10	3
XM	**BORDO 20 WG**	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	4 | -	7
	BORDO 20 WP	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	4 | -	7
	COURE FLOW 38 SC	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
	CURENOX 50 WG	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
	ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP	Περονόσπορος, Φυτόφθορα καρπών	3 | 7-14	7
	ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
Z	**ABILEST 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	PENDINOVA® 330 EC	Αγρωστώδη (ετήσια) Ζιζάνια, Πλατύφυλλα (ετήσια) Ζιζάνια	1	90

Κουνουπίδι (Θ)

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
M	**FRAME 80 WG**	Τετράνυχος, Ωίδιο	8 | 7-15	ΔΟ

Κουνουπίδι (Υ)

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**REVENGE 200 SL**	Πλουτέλλα	1	14
M	**CABRIO® DUO 4/7,2 EC**	Αλτερνάρια, Περονόσπορος	3 | 10-12	7
	FRAME 80 WG	Τετράνυχος, Ωίδιο	8 | 7-15	ΔΟ

Κρεμμυδάκι (φρέσκο)

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
Z	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	42

Κρεμμύδι ► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Θρίπες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.)	3 | 14	7
	PHANTOM 2,5 EC	Αλευρώδης, Αφίδες, Θρίπες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.)	3 | 14	7
	SWEEP MAX 500 EC	Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Αφίδες, Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Δορυφόρος, Θρίπες, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σκουλήκι του πράσου, Σποντόπτερα, Τζιτζικάκια, Φθοριμαία	2 | 10	3
M	**AZOFIN® 250 SC**	Περονόσπορος	3 | 7	14
	DYNASTY 20/12,5 SC	Σκωρίαση	2|14	14
	FRAME 80 WG	Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
XM	**BORDO 20 WG**	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	4 | -	7
	BORDO 20 WP	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	4 | -	7
	COURE FLOW 38 SC	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
	CURENOX 50 WG	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
	ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP	Περονόσπορος, Φυτόφθορα καρπών	3 | 7-14	7
	ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
Z	**ABILEST 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	FOCUS® 10 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	28

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Κρεμμύδι ► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
Z	**LUPO 365 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	PENDINOVA® 330 EC	Αγρωστώδη (ετήσια) Ζιζάνια, Πλατύφυλλα (ετήσια) Ζιζάνια	1	ΔΟ
	QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	70

Κρεμμύδι (Υ)

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
M	**CABRIO® DUO 4/7,2 EC**	Περονόσπορος	3 | 7-8	7
	SCALA® 40 SC	Βοτρύτης	3|10	14

Κριθάρι

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.)	1	30
	PHANTOM 2,5 EC	Αφίδες, Θρίπες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.)	1-2 | 21	30
	REBEL 100 EW	Αγρότιδα (ή Καραφατμέ), Αφίδες	2 | -	21
	SWEEP MAX 500 EC	Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αφίδες, Κνεφάσια (*Cnephasia* sp.), Κολεόπτερα - Σκαθάρια, Κριόκερο	2 | 14	28
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	2 | 14	ΔΟ
	LAGOON 25 EW	Ελμινθοσπορίωση, Σεπτορίωση	1	28
Z	**ABILEST 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	HELSTAR 6,9 EW	Αγρωστώδη Ζιζάνια	1	ΔΟ
	NIMBLE® 50/25 WG	Αγρωστώδη Ζιζάνια	1	ΔΟ
	RENOX® 40 SL	Πλατύφυλλα Ζιζάνια (ετήσια και ορισμένα πολυετή)	1	ΔΟ
	SANAPHEN 600 EC	Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	60
	VERITY 750 SL	Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ

Κτηνοτροφικά τεύτλα

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**SWEEP MAX 500 EC**	Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Αφίδες, Κασσίδα, Κλεονός, Λίξος, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τριχοπλούσια, Φθοριμαία	2 | 10	14
Z	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	ΔΟ

Κυδωνιά ► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Καρπόκαψα (*Cydia pomonella*), Φυλλοδέτες, Ψύλλα	2 | 14	7
	IMIDAN® 50 WP	Καρπόκαψα (*Cydia pomonella*)	2 | 20	28
	KITROFEN ULTRA 100 EC	Ψώρα Σαν Ζοζέ*, Βαμβακάδα (ή Διάσπις)*	1 (πριν την άνθηση)	Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
	REVOLVER 1,8 EC	Ακάρεα (*Aculus schlechtendali*, *Aculus* sp., *Eryophyes* spp.), Θρίπες (*Frankliniella occidentalis, Thrips* sp.), Πανόνυγχος (*Panonychus ulmi*), Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), Φυλλορύκτες, Ψύλλα	2 | 7	28
M	**ALANDIN 100 EC**	Ωίδιο	3|12-14	14
	MORGAN 80 WG	Φουζικλάδιο	6-10 | 7-14	28
	PIRGUS 80 WG	Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae*), Φυτόφθορα λαιμού και ριζών	2-3 | 30	15

** Χρήση Ήσσονος Σημασίας.*

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Κυδωνιά ► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
ΧΜ	**COURE FLOW 38 SC**	Βακτηριακό κάψιμο, Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae)*, Σεπτορίωση, Φαιά σήψη, Φουζικλάδιο	3 | -	ΔΟ
	ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP	Φουζικλάδιο	3 | -	ΔΟ
Ζ	**FENHEX 24 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	180
Ζ	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	28
Ζ	**YAMBO 18/18 SL****	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια), Πολυετή ζιζάνια	1-2 | 90	ΔΟ

*** Άνω των τριών (3) ετών.*

Κυκλάμινο (Θ+Υ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Μ	**SCALA® 40 SC**	Βοτρύτης	4|7-10	Μ/Ε

Λαγόχορτο (Scorzonera)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Ε	**SWEEP MAX 500 EC**	*Autographa* sp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Άλτης, Αφίδες, Δορυφόρος, Θρίπες, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τζιτζικάκια, Φθορίμαία	2 | 10	3
Μ	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
Ζ	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	ΔΟ

Λάιμ (lime, λιμετία)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Ε	**KITROFEN ULTRA 100 EC**	Ασπιδιωτός *(Aspidiotus* sp.*)*, Κόκκινη ψώρα (*Aonidiella* sp.), Λεκάνιο *(Saissetia* sp.*)*, Μυτιλόμορφη ψώρα *(Lepidosaphes beckii)*, Παρλατόρια *(Parlatoria pergandei)*	1	28
Ε	**REVENGE 200 SL**	Αφίδες, Κοκκοειδή, Παρλατόρια, Φυλλοκνίστης, Ψευδόκοκκος, Ψώρα (κόκκινη)	2 | 30	14 (για δόση 70 κ.εκ./στρ.), 30 (για δόση 150 κ.εκ./στρ.)
	SERVATRAY	Μύγα Μεσογείου	1	Μ/Ε
Μ	**FRAME 80 WG**	Ακάρεα (*Eriophyes* sp.)	8 | 7	ΔΟ

Λαχανάκι Βρυξελλών

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Ε	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	Μ/Ε
Ε	**REBEL 100 EW**	*Autographa* sp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Άλτης, Αφίδες, Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Δορυφόρος, Θρίπες, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τζιτζικάκια, Φθορίμαία	2 | -	7
Ζ	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	42

Λαχανάκι Βρυξελλών (Θ+Υ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Μ	**FRAME 80 WG**	Τετράνυχος, Ωίδιο	8 | 7-15	ΔΟ

(1) Κατηγορία: Ε Εντομοκτόνα, Υ Υποκαπνιστικά, Μ Μυκητοκτόνα, ΧΜ Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Ζ Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Λαχανικά (Θ+Υ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
ΕΠ	**VAPAM FORTE 51 SL**	Απολύμανση εδάφους, Ζιζάνια (βλαστάνοντες σπόροι ετήσιων ζιζανίων), Μύκητες εδάφους, Νηματώδεις	Μία (1) εφαρμογή κάθε τρίτο έτος στο ίδιο έδαφος	Μ/Ε

Λάχανο

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Ε	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	Μ/Ε
	DELMUS 2,5 EC	Αφίδες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλούζια, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	2 | 14	7
	MATEUS® 10 CS (Zeon Tech)	Μαμέστρα, Πιερίδα	2 | 14	7
	PHANTOM 2,5 EC	Αφίδες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλούζια, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	2 | 14	7
	REBEL 100 EW	*Autographa* sp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ), Αλευρώδεις, Άλτης, Αφίδες, Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Δορυφόρος, Θρίπες, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τζιτζικάκια, Φθοριμαία	2 | -	7
	SWEEP MAX 500 EC	*Autographa* sp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Άλτης, Αφίδες, Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Δορυφόρος, Θρίπες, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τζιτζικάκια, Φθοριμαία	2 | 10	3
ΧΜ	**BORDO 20 WG**	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	4 | -	7
	BORDO 20 WP	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	4 | -	7
	COURE FLOW 38 SC	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
	CURENOX 50 WG	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
	ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP	Περονόσπορος, Φυτόφθορα καρπών	3 | 7-14	7
	ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
Ζ	**ABILEST 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	PENDINOVA® 330 EC	Αγρωστώδη (ετήσια) Ζιζάνια, Πλατύφυλλα (ετήσια) Ζιζάνια	1	90
	QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	56

Λάχανο (Θ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Μ	**FRAME 80 WG**	Τετράνυχοι, Ωίδιο	8 | 7-15	ΔΟ

Λάχανο (Υ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Ε	**REVENGE 200 SL**	Πλουτέλλα	1	14
Μ	**CABRIO® DUO 4/7,2 EC**	Αλτερνάρια, Περονόσπορος	3 | 10-12	3
	FRAME 80 WG	Τετράνυχοι, Ωίδιο	8 | 7-15	ΔΟ

Λάχανο (Κινέζικο)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Ε	**REBEL 100 EW**	*Autographa* sp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Άλτης, Αφίδες, Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Δορυφόρος, Θρίπες, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τζιτζικάκια, Φθοριμαία	2 | -	7
Ζ	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	42

(1) Κατηγορία: Ε Εντομοκτόνα, Υ Υποκαπνιστικά, Μ Μυκητοκτόνα, ΧΜ Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Ζ Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Λάχανο (Κόκκινο, Λευκό)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Ζ	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	42 (κόκκινο λάχ.) 28 (λευκό λάχ.)

Λαχανόκηποι

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
ΕΠ	**MERIDIEN 5 GB**	Σαλιγκάρια/ Γυμνοσάλιαγκες (λείμακες, αρίονες)	3 | -	Μ/Ε

Λεμονιά

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Ε	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Λεκάνιο, Μύγα Μεσογείου	1	30
	IMIDAN® 50 WP	Μύγα Μεσογείου	1	14
	KITROFEN ULTRA 100 EC	Ασπιδιωτός *(Aspidiotus* sp.), Κόκκινη ψώρα (*Aonidiella* sp.), Λεκάνιο *(Saissetia* sp.), Μυτιλόμορφη ψώρα *(Lepidosaphes beckii)*, Παρλατόρια *(Parlatoria pergandei)*	1	30
	LAOTTA 1,8 EC	Κίτρινος τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), Κόκκινος τετράνυχος των εσπεριδοειδών (*Panonychus citri*), Παραμορφωτικό άκαρι (*Aceria sheldoni*), Φυλλοκνίστης	1-3 | 7	10
	PHANTOM 2,5 EC	Αλευρώδης (Εριώδης), Αφίδες, Λεκάνιο, Μύγα μεσογείου	1	30
	REVENGE 200 SL	Αφίδες, Κοκκοειδή, Παρλατόρια, Φυλλοκνίστης, Ψευδόκοκκος, Ψώρα (κόκκινη)	2 | 30	14 (για δόση 70 κ.εκ./στρ.), 30 (για δόση 150 κ.εκ./στρ.)
	REVOLVER 1,8 EC	Πανόνυγχος *(Panonychus citri)*, Τετράνυχος *(Tetranychus urticae)*, Φυλλοκνίστης	3 | 10	10
	SCORPION EC	Ακάρεα, Αλευρώδεις, Κοκκοειδή, Λεκάνιο, Πανόνυγχος, Τετράνυχοι, Ψευδόκοκκος, Ψώρα (άσπρη), Ψώρα (κόκκινη), Ψώρα (μαύρη)	2 (με μια επιπλέον φθινοπωρινή εφαρμογή για *Aleurothrixus flocossus*) | 60	Μ/Ε
	SERVATRAY	Μύγα Μεσογείου	1	Μ/Ε
Μ	**FRAME 80 WG**	Ακάρεα	8 | 7	ΔΟ
	PIRGUS 80 WG	Φυτόφθορα	3 | 30	14
ΧΜ	**BORDO 20 WG**	Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae)*, Κορυφοξήρα	2 | -	21
	BORDO 20 WP	Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae)*, Κορυφοξήρα	2 | -	21
	COURE FLOW 38 SC	Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση, Φυτόφθορα καρπών	2 | -	21
	CUPRICO 50 WP	Ανθράκωση, Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae)*, Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση, Φυτόφθορα καρπών	2 | -	21
	CURENOX 50 WG	Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση, Φυτόφθορα καρπών	2 | -	21
	HYDROPLUS NEW 40 WG	Ανθράκωση, Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae)*, Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση, Φυτόφθορα καρπών	3 | -	21
	ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP	Κορυφοξήρα, Φυτόφθορα καρπών	2 | -	21
	ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP	Βακτηρίωση *(Pseudomonas syringae)*, Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση, Φυτόφθορα καρπών	2 | -	21
Ζ	**ABILEST 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	FENHEX 24 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	21
	IFESTOS TF 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	IPIGLYCE NEW 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	KEYNERON GREEN 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	LUPO 365 CS	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	YAMBO 18/18 SL*	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια), Πολυετή ζιζάνια	1-2 | 90	ΔΟ

** Άνω των τριών (3) ετών.*

(1) Κατηγορία: Ε Εντομοκτόνα, Υ Υποκαπνιστικά, Μ Μυκητοκτόνα, ΧΜ Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Ζ Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Λεύκη (και δενδρύλλια σε φυτώρια)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**SWEEP MAX 500 EC**	Αφίδες, Κολεόπτερα - Σκαθάρια	2 | 10	Μ/Ε
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	3 | 7	Μ/Ε

Λούπινο

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Z	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	56

Λυκίσκος

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
M	**FRAME 80 WG**	Τετράνυχος, Ωίδιο	8 | 7	ΔΟ

Λυκοτρίβολο

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	Μ/Ε
M	**FRAME 80 WG**	Τετράνυχος, Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
Z	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	21

Λυκοτρίβολο (Υ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**LAOTTA 1,8 EC**	Λιριόμυζα, Τετράνυχοι	1-3 | 7	7
M	**CABRIO® DUO 4/7,2 EC**	Περονόσπορος	3 | 7-8	7

Λωτός

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**KITROFEN ULTRA 100 EC**	Ψώρα Σαν Ζοζέ*	1 (πριν την άνθηση)	Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
	SERVATRAY	Μύγα Μεσογείου	1	Μ/Ε
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	8 | 7	ΔΟ

** Χρήση Ήσσονος Σημασίας.*

Μαϊντανός

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**DELMUS 2,5 EC**	Άλτης, Αφίδες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Μαμέστρα, Σποντόπτερα	2 | 14	7
	SWEEP MAX 500 EC	*Autographa* sp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Άλτης, Αφίδες, Δορυφόρος, Θρίπες, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τζιτζικάκια, Φθοριμαία	2 | 10	3

Μαϊντανός (Θ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**REVOLVER 1,8 EC**	Θρίπας *(Frankliniella occidentalis)*, Τετράνυχος*	4 | 7	14

**Χρήση Ήσσονος Σημασίας.*

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Μαϊντανός (Υ)

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
Μ	CABRIO® DUO 4/7,2 EC	Περονόσπορος	3 | 7-10	7

Μάνγκο

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
Μ	FRAME 80 WG	Ωίδιο	8 | 7	ΔΟ

Μανιτάρια

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
Ε	PHANTOM 2,5 EC	Δίπτερα, Κολλέμβολα	1	3

Μανταρινιά ► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
Ε	DELMUS 2,5 EC	Αφίδες, Λεκάνιο, Μύγα Μεσογείου	1	30
	IMIDAN® 50 WP	Μύγα Μεσογείου	1	14
	KITROFEN ULTRA 100 EC	Ασπιδιωτός *(Aspidiotus* sp.*)*, Κόκκινη ψώρα (*Aonidiella* sp.), Λεκάνιο *(Saissetia* sp.*)*, Μυτιλόμορφη ψώρα *(Lepidosaphes beckii)*, Παρλατόρια *(Parlatoria pergandei)*	1	30
	LAOTTA 1,8 EC	Κίτρινος τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), Κόκκινος τετράνυχος των εσπεριδοειδών (*Panonychus citri*), Παραμορφωτικό άκαρι (*Aceria sheldoni*), Φυλλοκνίστης	1-3 | 7	10
	PHANTOM 2,5 EC	Αλευρώδης (Εριώδης), Αφίδες, Λεκάνιο, Μύγα μεσογείου	1	30
	REVENGE 200 SL	Αφίδες, Κοκκοειδή, Παρλατόρια, Φυλλοκνίστης, Ψευδόκοκκος, Ψώρα (κόκκινη)	2 | 30	14 (για δόση 70 κ.εκ./στρ.), 30 (για δόση 150 κ.εκ./στρ.)
	REVOLVER 1,8 EC	Πανόνυχος *(Panonychus citri)*, Τετράνυχος *(Tetranychus urticae)*, Φυλλοκνίστης	3 | 10	10
	SCORPION EC	Ακάρεα, Αλευρώδεις, Κοκκοειδή, Λεκάνιο, Πανόνυχος, Τετράνυχοι, Ψευδόκοκκος, Ψώρα (άσπρη), Ψώρα (κόκκινη), Ψώρα (μαύρη)	2 (με μια επιπλέον φθινοπωρινή εφαρμογή για *Aleurothrixus flocossus*) | 60	M/E
	SERVATRAY	Μύγα Μεσογείου	1	M/E
Μ	FRAME 80 WG	Ακάρεα (*Eriophyes* sp.)	8 | 7	ΔΟ
	PIRGUS 80 WG	Φυτόφθορα	3 | 30	14
ΧΜ	BORDO 20 WG	Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae)*, Κορυφοξήρα	2 | -	21
	BORDO 20 WP	Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae)*, Κορυφοξήρα	2 | -	21
	COURE FLOW 38 SC	Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση, Φυτόφθορα καρπών	2 | -	21
	CUPRICO 50 WP	Ανθράκωση, Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae)*, Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση, Φυτόφθορα καρπών	2 | -	21
	CURENOX 50 WG	Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση, Φυτόφθορα καρπών	2 | -	21
	HYDROPLUS NEW 40 WG	Ανθράκωση, Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae)*, Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση, Φυτόφθορα καρπών	3 | -	21
	ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP	Κορυφοξήρα, Φυτόφθορα καρπών	2 | -	21
	ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP	Βακτηρίωση *(Pseudomonas syringae)*, Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση, Φυτόφθορα καρπών	2 | -	21
Ζ	ABILEST 455 CS	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	FENHEX 24 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	21
	IFESTOS TF 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	IPIGLYCE NEW 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	KEYNERON GREEN 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7

(1) Κατηγορία: Ε Εντομοκτόνα, Υ Υποκαπνιστικά, Μ Μυκητοκτόνα, ΧΜ Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Ζ Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Μανταρινιά ► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
Z	**LUPO 365 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	YAMBO 18/18 SL*	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια), Πολυετή ζιζάνια	1-2 | 90	ΔΟ

** Άνω των τριών (3) ετών.*

Μαρούλι

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	M/E
	REVENGE 200 SL	Αφίδες	1	7
M	**FRAME 80 WG**	Τετράνυχος, Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
XM	**BORDO 20 WG**	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	4 | -	7
	BORDO 20 WP	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	4 | -	7
	COURE FLOW 38 SC	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
	CURENOX 50 WG	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
	ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP	Περονόσπορος, Φυτόφθορα καρπών	3 | 7-14	7
	ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
Z	**ABILEST 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	FOCUS® 10 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	21
	LUPO 365 CS	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	PENDINOVA® 330 EC	Αγρωστώδη (ετήσια) Ζιζάνια, Πλατύφυλλα (ετήσια) Ζιζάνια	1	75 (εφαρμογή πριν τη μεταφύτευση)
	QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	21

Μαρούλι (Θ)

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**REVOLVER 1,8 EC**	Θρίπας *(Frankliniella occidentalis)*	4 | 7	14
M	**ORVEGO® 30/22,5 SC**	Περονόσπορος	2|7-10	7
	PIRGUS 80 WG	Περονόσπορος	4 | 10	15
	SCALA® 40 SC	Βοτρύτης	2|10-14	14

Μαρούλι (Υ)

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Άλτης, Αφίδες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	3 | 7	3
	LAOTTA 1,8 EC	Λιριόμυζα, Τετράνυχοι	1-3 | 7	7
	PHANTOM 2,5 EC	Άλτης, Αφίδες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	3 | 7	3
	SHOOTER 200 SL	Αφίδες	1	3
M	**CABRIO® DUO 4/7,2 EC**	Περονόσπορος	3 | 7-8	7
	METMAN 25 WP	Περονόσπορος	3|10	14
	ORVEGO® 30/22,5 SC	Περονόσπορος	2|7-10	7
	PIRGUS 80 WG	Περονόσπορος	4 | 10	15
	SCALA® 40 SC	Βοτρύτης	2|10-14	14

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Μαρούλι και λοιπά σαλατικά

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
M	**FRAME 80 WG**	Τετράνυχος, Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ

Μαρούλι και λοιπά σαλατικά (Υ)

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**LAOTTA 1,8 EC**	Λιριόμυζα, Τετράνυχοι	1-3 | 7	7

Μελιτζάνα

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	M/E
M	**DYNASTY 20/12,5 SC**	Ωίδιο	3|8-10	3
Z	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	42

Μελιτζάνα (Θ)

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Βρωμούσες, Δορυφόρος, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	4 | 7	3
	KITROFEN ULTRA 100 EC	Αλευρώδεις* (*Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci*)	2 | 10	3
	LAOTTA 1,8 EC	Κίτρινος τετράνυχος (*Tetranychus urticae*)	1-3 | 7	3
	MATEUS® 10 CS (Zeon Tech)	Αφίδες, Δορυφόρος, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	2 | 14	3
	PHANTOM 2,5 EC	Αφίδες, Βρωμούσες, Δορυφόρος, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	3 | 7	3
	REVENGE 200 SL	Αλευρώδεις, Αφίδες	2 | 20	3
	REVOLVER 1,8 EC	Θρίπες (*Frankliniella occidentalis, Thrips* sp.), Λιριόμυζα, Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*)	4 | 7	3
	SHOOTER 200 SL	Αλευρώδεις, Αφίδες	2|10	3
M	**ALANDIN 100 EC**	Ωίδιο	2|10-12	3
	AZOFIN® 250 SC	Αλτερνάρια*, Περονόσπορος*, Ωίδιο*	3 | 7	3
	BOTREFIN® PLUS 37,5/25 WG	Βοτρύτης	3 | 7-10	3
	FRAME 80 WG	Ακάρεα (*Eriophyes* sp.), Παραμορφωτικό άκαρι (*Aculops lycopersici*), Τετράνυχοι (*Tetranychus urticae*), Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
	METMAN 25 WP	Περονόσπορος	3|10	14
	SCALA® 40 SC	Βοτρύτης	3|10-14	3
	SIVAR GOLD 25,5/6,25 SC	Περονόσπορος	3|10	0

** Χρήση Ήσσονος Σημασίας*

Μελιτζάνα (Υ) ► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Βρωμούσες, Δορυφόρος, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	3 | 14	3
	LAOTTA 1,8 EC	Κίτρινος τετράνυχος (*Tetranychus urticae*)	1-3 | 7	3
	MATEUS® 10 CS (Zeon Tech)	Αφίδες, Δορυφόρος, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	2 | 14	3
	PHANTOM 2,5 EC	Αλευρώδεις, Αφίδες, Βρωμούσες, Δορυφόρος, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	3 | 14	3
	REVENGE 200 SL	Αλευρώδεις, Αφίδες	2 | 20	7

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Μελιτζάνα (Υ) ► Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Ε	**REVOLVER 1,8 EC**	Θρίπες (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips* sp.), Λιριόμυζα, Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*)	3 | 7	3
Ε	**SHOOTER 200 SL**	Αφίδες	1	3
Ε	**SWEEP MAX 500 EC**	*Autographa* sp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Αφίδες, Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Δορυφόρος, Θρίπες, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τζιτζικάκια, Φθοριμαία	2 | 10	3
Μ	**ALANDIN 100 EC**	Ωίδιο	2|10-12	3
Μ	**FRAME 80 WG**	Ακάρεα (*Eriophyes* sp.), Παραμορφωτικό άκαρι (*Aculops lycopersici*), Τετράνυχοι (*Tetranychus urticae*), Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
Μ	**METMAN 25 WP**	Περονόσπορος	3|10	14
Μ	**SCALA® 40 SC**	Βοτρύτης	3|10-14	3
Μ	**SIVAR GOLD 25,5/6,25 SC**	Περονόσπορος	3|10	0

Μηδική

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Ε	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδα των μπιζελιών, Σκαθάρι των μπιζελιών, Φυτονόμος	2 | 14	14
Ε	**REBEL 100 EW**	Αγρότιδα ή Καραφατμέ (*Agrotis* spp.), Ακανθώδες σκουλήκι, Αλευρώδεις, Αφίδες, Διπάροψη, Θρίπες, Πράσινο σκουλήκι, Προνύμφες λεπιδοπτέρων, Ρόδινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Φυτονόμος	2 | -	14
Ε	**SWEEP MAX 500 EC**	Αγρότιδα ή Καραφατμέ (*Agrotis* spp.), Ακανθώδες σκουλήκι, Αλευρώδεις, Αφίδες, Θρίπες, Κολεόπτερα - Σκαθάρια, Πράσινο σκουλήκι, Ρόδινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Φυτονόμος	2 | 10	7
Ζ	**QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	21

Μηλιά ► Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Ε	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Καρπόκαψα (*Cydia pomonella*), Φυλλοδέτες, Ψύλλα	2 | 14	7
Ε	**IMIDAN® 50 WP**	Καρπόκαψα (*Cydia pomonella*)	2 | 20	28
Ε	**KITROFEN ULTRA 100 EC**	Βαμβακάδα (ή Διάσπις), Ψώρα Σαν Ζοζέ	1 (πριν την άνθηση)	Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
Ε	**LAOTTA 1,8 EC**	Κίτρινος τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), Κόκκινος τετράνυχος (*Panonychus ulmi*)	1-2 | 15	3
Ε	**MATEUS® 10 CS (Zeon Tech)**	Φυλλορύκτες	2 | 14	7
Ε	**PHANTOM 2,5 EC**	Ανθονόμος, Αφίδες, Θρίπες, Καρπόκαψα (*Cydia pomonella*), Κηκιδόμυγες, Μηλολόνθη, Φυλλοδέτες, Ψύλλα (*Psylla* spp.)	2 | 14	7
Ε		Ψώρα Σαν Ζοζέ	1	7
Ε	**REVENGE 200 SL**	Αφίδες, Οπλοκάμπη, Φυλλορύκτες	2 | 20	14
Ε		Καρπόκαψα (*Cydia pomonella*)	2 | 8	14
Ε	**REVOLVER 1,8 EC**	Ακάρεα (*Aculus schlechtendali*, *Aculus* sp., *Eryophyes* spp.), Θρίπες (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips* sp.), Πανόνυγχος (*Panonychus ulmi*), Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), Φυλλορύκτες, Ψύλλα	2 | 7	28
Ε	**SCORPION EC**	Αφίδες, Βαμβακάδα, Κοκκοειδή, Ματόψειρα*, Πανόνυγχος, Παρλατόρια, Τετράνυχοι, Φυλλοδέτες, Ψευδόκοκκος*, Ψύλλα, Ψώρα (μυτιλόμορφη), Ψώρα (σταχτιά), Ψώρα Σαν Ζοζέ, Ψώρα (*Eriococcus lagerstroemiae*)*	2 | 60	M/E
Ε	**SHOOTER 200 SL**	Αφίδες	1 εφαρμογή κάθε 2 έτη	14
Μ	**ALANDIN 100 EC**	Ωίδιο	3|12-14	14
Μ	**DEMON 70 WG**	Φουζικλάδιο	6|-	42
Μ	**DIFENOFIN® 250 EC**	Φουζικλάδιο	3|10	14

** Χρήση Ήσσονος Σημασίας.*

(1) Κατηγορία: Ε Εντομοκτόνα, Υ Υποκαπνιστικά, Μ Μυκητοκτόνα, ΧΜ Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Ζ Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Μηλιά ► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
M	**FRAME 80 WG**	Φουζικλάδιο, Ωίδιο	8 | 7	ΔΟ
	MORGAN 80 WG	Φουζικλάδιο	6-10** | 7-14	28
	PENCOL 10 EC	Ωίδιο	3 | 7-14	14
	PIRGUS 80 WG	Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae*)	2 | 30	15
		Φυτόφθορα λαιμού και ριζών	3 | 30	15
	RIBBON 12 EC	Φουζικλάδιο, Ωίδιο	4 | -	21
	SCALA® 40 SC	Μετασυλλεκτικές ασθένειες από *Neofabraea* sp.	3|10	7
		Φουζικλάδιο	4|7-10	7
XM	**BORDO 20 WG**	Φουζικλάδιο	2 | -	ΔΟ
	BORDO 20 WP	Φουζικλάδιο	2 | -	ΔΟ
	COURE FLOW 38 SC	Βακτηριακό κάψιμο, Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae*), Σεπτορίωση, Φαιά σήψη, Φουζικλάδιο	3 | -	ΔΟ
	CUPRICO 50 WP	Βακτηριακό κάψιμο, Βακτηρίωση *(Pseudomonas syringae)*, Σεπτορίωση, Φαιά σήψη, Φουζικλάδιο	3 | -	ΔΟ
	CURENOX 50 WG	Βακτηριακό κάψιμο, Βακτηρίωση *(Pseudomonas syringae)*, Σεπτορίωση, Φαιά σήψη, Φουζικλάδιο	3 | -	ΔΟ
	HYDROPLUS NEW 40 WG	Βακτηριακό κάψιμο, Βακτηρίωση *(Pseudomonas syringae)*, Σεπτορίωση, Φαιά σήψη, Φουζικλάδιο	3 | -	ΔΟ
	ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP	Φουζικλάδιο	3 | -	ΔΟ
	ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP	Βακτηριακό κάψιμο, Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae*), Σεπτορίωση, Φαιά σήψη, Φουζικλάδιο	3 | -	ΔΟ
Z	**ABILEST 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	FENHEX 24 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	180
	FOCUS® 10 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	28
	LUPO 365 CS	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	IFESTOS TF 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	IPIGLYCE NEW 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	KEYNERON GREEN 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	35
	YAMBO 18/18 SL* **	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια), Πολυετή ζιζάνια	1-2 | 90	ΔΟ

*** Συνολικά 10 εφαρμογές σε εδάφη με PH<7,5 και μέχρι 6 εφαρμογές για εδάφη με PH>7,5. | **** Άνω των τριών (3) ετών.*

Μόνιμοι βοσκότοποι και λιβάδια με αγρωστώδη

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Z	**RENOX® 40 SL**	Πλατύφυλλα Ζιζάνια (ετήσια και ορισμένα πολυετή)	2 | -	Μ/Ε

Μουσμουλιά

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Καρπόκαψα (*Cydia pomonella*), Φυλλοδέτες, Ψύλλα	2 | 14	7
	KITROFEN ULTRA 100 EC	Βαμβακάδα (ή Διάσπις)*, Ψώρα Σαν Ζοζέ*	1 (πριν την άνθηση)	Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
M	**PIRGUS 80 WG**	Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae*), Φυτόφθορα λαιμού και ριζών	2-3 | 30	15
	RIBBON 12 EC	Φουζικλάδιο	4 | -	21
Z	**FENHEX 24 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	180
	YAMBO 18/18 SL**	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια), Πολυετή ζιζάνια	1-2 | 90	ΔΟ

** Χρήση Ήσσονος Σημασίας. | ** Άνω των τριών (3) ετών.*

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Μπιζέλι

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**PHANTOM 2,5 EC**	Αφίδα των κουκιών, Αφίδα των μπιζελιών, Θρίπες, Κάμπιες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Σιτόνα	2 | 14	7
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
XM	**COURE FLOW 38 SC**	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
XM	**CURENOX 50 WG**	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
XM	**ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP**	Περονόσπορος, Φυτόφθορα καρπών	3 | 7-14	7
XM	**ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP**	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
Z	**ABILEST 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
Z	**PENDINOVA® 330 EC**	Αγρωστώδη (ετήσια) Ζιζάνια, Πλατύφυλλα (ετήσια) Ζιζάνια	1	ΔΟ
Z	**QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	49

Μπιζέλι (ξηρό, όσπρια)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
Z	**ABILEST 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
Z	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	56
Z	**PENDINOVA® 330 EC**	Αγρωστώδη (ετήσια) Ζιζάνια, Πλατύφυλλα (ετήσια) Ζιζάνια	1	ΔΟ

Μπιζέλι με λοβό

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**EFALVAC 1,5 GR**	Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.), Υλέμυια	1	ΔΟ

Μπιζέλι με λοβό (Θ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ

Μπιζέλι με λοβό (Υ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**SWEEP MAX 500 EC**	*Autographa* sp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αφίδες, Θρίπες, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σιτόνα, Σποντόπτερα, Φθοριμαία	2 | 10	3
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ

Μπρόκολο ► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	M/E
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Κοφτοσκούληκο, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλούζια, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	2 | 14	7
E	**MATEUS® 10 CS (Zeon Tech)**	Μαμέστρα, Πιερίδα	2 | 14	10
E	**REBEL 100 EW**	*Autographa* sp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Άλτης, Αφίδες, Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Δορυφόρος, Θρίπες, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τζιτζικάκια, Φθοριμαία	2 | -	7
E	**SWEEP MAX 500 EC**	*Autographa* sp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Άλτης, Αφίδες, Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Δορυφόρος, Θρίπες, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τζιτζικάκια, Φθοριμαία	2 | 10	3

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Μπρόκολο ► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
Z	**ABILEST 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ

Μπρόκολο (Θ)

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
M	**FRAME 80 WG**	Τετράνυχοι, Ωίδιο	8 | 7-15	ΔΟ

Μπρόκολο (Υ)

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**REVENGE 200 SL**	Πλουτέλλα	1	14
M	**CABRIO® DUO 4/7,2 EC**	Αλτερνάρια, Περονόσπορος	3 | 10-12	7
	FRAME 80 WG	Τετράνυχοι, Ωίδιο	8 | 7-15	ΔΟ

Μύρτιλλα

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	6 | 14	ΔΟ

Νεραντζιά

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Λεκάνιο, Μύγα Μεσογείου	1	30
	LAOTTA 1,8 EC	Κίτρινος τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), Κόκκινος τετράνυχος των εσπεριδοειδών (*Panonychus citri*), Παραμορφωτικό άκαρι (*Aceria sheldoni*)	1-3 | 7	10
	PHANTOM 2,5 EC	Αλευρώδης (Εριώδης), Αφίδες, Λεκάνιο, Μύγα μεσογείου	1	30
	SERVATRAY	Μύγα Μεσογείου	1	M/E
M	**FRAME 80 WG**	Ακάρεα	8 | 7	ΔΟ
	PIRGUS 80 WG	Φυτόφθορα	3 | 30	14
XM	**BORDO 20 WG**	Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae*), Κορυφοξήρα	2 | -	21
	BORDO 20 WP	Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae*), Κορυφοξήρα	2 | -	21
	COURE FLOW 38 SC	Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση, Φυτόφθορα καρπών	2 | -	21
	CURENOX 50 WG	Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση, Φυτόφθορα καρπών	2 | -	21
	ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP	Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae*), Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση, Φυτόφθορα καρπών	2 | -	21
Z	**YAMBO 18/18 SL***	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια), Πολυετή ζιζάνια	1-2 | 90	ΔΟ

** Άνω των τριών (3) ετών.*

Όλες οι καλλιέργειες

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**MATEUS® 10 CS (Zeon Tech)**	Ακρίδες*	-	M/E

** Συλλογική καταπολέμηση με επίβλεψη και ευθύνη του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Νομ. Αυτοδιοικήσεων.*

Όλυρα (*Triticum spelta*)

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**SWEEP MAX 500 EC**	Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αφίδες, Κνεφάσια (*Cnephasia* sp.), Κολεόπτερα - Σκαθάρια, Κριόκερο	2 | 14	28

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Παντζάρι

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Άλτης, Αφίδες, Κασσίδα, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Μύγα των τεύτλων, Σποντόπτερα	1	30
	EFALVAC 1,5 GR	Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	ΔΟ
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
Z	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	ΔΟ

Παπάγια

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	8 | 7	ΔΟ

Παστινάκι

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**SWEEP MAX 500 EC**	*Autographa* sp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Άλτης, Αφίδες, Δορυφόρος, Θρίπες, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τζιτζικάκια, Φθοριμαία	2 | 10	3
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
Z	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	ΔΟ

Πατάτα ► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	2|30	M/E
	DELMUS 2,5 EC	Δορυφόρος, Σποντόπτερα	3 | 14	7
	MATEUS® 10 CS (Zeon Tech)	Δορυφόρος	2 | 14	7
	PHANTOM 2,5 EC	Δορυφόρος, Σποντόπτερα	3 | 14	7
	REBEL 100 EW	Αφίδες, Δορυφόρος, Φθοριμαία	2 | -	14
	REVENGE 200 SL	Αφίδες, Δορυφόρος	2 | 7	7
	SWEEP MAX 500 EC	Αφίδες, Δορυφόρος, Φθοριμαία	2 | 10	3
	ARMETIL COURE 8/40 WP	Περονόσπορος	2 | 10-14	28
	CABRIO® DUO 4/7,2 EC	Περονόσπορος	3 | 10	3
M	**DIPROSPERO SC**	Περονόσπορος	5 | 7	14
	FLUAZINOVA® 500 SC	Περονόσπορος	10 | 7-10	7
	FRAME 80 WG	Ωίδιο	8 | 7	ΔΟ
	METMAN 25 WP	Περονόσπορος	3|10	14
	ORVEGO® 30/22,5 SC	Περονόσπορος	3|5-10	7
	PROMESS 72,2 SL	Περονόσπορος	3 | 10-14	15 (Εφαρμογή στο φύλλωμα)
	REVIVAL 505 WP	Περονόσπορος	4 | 7-10	21
	PROXANIL DUO SC	Περονόσπορος	6|7	14
	SIVAR GOLD 25,5/6,25 SC	Περονόσπορος	3|10	15
XM	**BORDO 20 WG**	Περονόσπορος	3 | -	21
	BORDO 20 WP	Περονόσπορος	3 | -	21
	COURE FLOW 38 SC	Περονόσπορος	2 | 7-10	21
	CUPRICO 50 WP	Ανθράκωση, Περονόσπορος	4 | 10-14	21
	CURENOX 50 WG	Περονόσπορος	2 | 7-10	21

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Πατάτα ► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
XM	**HYDROPLUS NEW 40 WG**	Ανθράκωση, Περονόσπορος	4 | 10-14	21
XM	**ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP**	Περονόσπορος	2 | 7-10	21
XM	**ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP**	Περονόσπορος	2 | 7-10	21
Z	**ABILEST® 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
Z	**BUZIN 70 WG***	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	60
Z	**DIQUELL 20 SL****	Αποξήρανση στελεχών πριν τη συγκομιδή	1	10
Z	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	56
Z	**LUPO 365 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
Z	**PENDINOVA® 330 EC**	Αγρωστώδη (ετήσια) Ζιζάνια, Πλατύφυλλα (ετήσια) Ζιζάνια	1	ΔΟ
Z	**QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	35
Z	**SELAS 24 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (Ετήσια και πολυετή)	1	60
Z	**TERRIFIC 96 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ

** Η εφαρμογή του σκευάσματος συνιστάται σε ποικιλίες πατάτας που δεν είναι ευαίσθητες στο Metribuzin. | ** Κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά (άρθρο 53 του Καν. 1107/2009/ΕΚ).*

Πεπόνι

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	Μ/Ε
M	**RIBBON 12 EC**	Ωίδιο	5 | 7-10	7
XM	**BORDO 20 WG**	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	4 | -	7
XM	**BORDO 20 WP**	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	4 | -	7
XM	**ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP**	Περονόσπορος, Φυτόφθορα καρπών	3 | 7-14	7
Z	**QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	56

Πεπόνι (Θ)

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	3 | 7	3
E	**LAOTTA 1,8 EC**	Κίτρινος τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), Λιριόμυζα	1-2 | 7	3
E	**REVOLVER 1,8 EC**	Θρίπες *(Frankliniella occidentalis, Thrips* sp.*)*, Λιριόμυζα, Τετράνυχος *(Tetranychus urticae)*	3 | 7	3
M	**ALANDIN 100 EC**	Ωίδιο	2|10-14	3
M	**AZOFIN® 250 SC**	Περονόσπορος, Ωίδιο	3 | 10	3
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
M	**PENCOL 10 EC**	Ωίδιο	3 | 7-14	3
M	**PIRGUS 80 WG**	Περονόσπορος	1-2 | 8-10	3
M	**PROMESS 72,2 SL**	Περονόσπορος	3 | 8-10	7 (Εφαρμογή στο φύλλωμα)
M	**SIVAR 25 SC**	Ωίδιο	3 | 10	3
XM	**CUPRICO 50 WP**	Ανθράκωση, Βακτηρίωση (*Erwinia tracheiphila*), Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος	4 | 10-14	7
XM	**HYDROPLUS NEW 40 WG**	Ανθράκωση, Βακτηρίωση (*Erwinia tracheiphila*), Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος	4 | 10-14	7

Πεπόνι (Υ) ► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	3 | 7	3

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Πεπόνι (Υ) ► Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**LAOTTA 1,8 EC**	Κίτρινος τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), Λιριόμυζα	1-2 | 7	5
E	**REVOLVER 1,8 EC**	Τετράνυχος *(Tetranychus urticae)*	3 | 7	3
E	**SWEEP MAX 500 EC**	*Autographa* sp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Αφίδες, Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Δορυφόρος, Θρίπες, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τζιτζικάκια, Φθοριμαία	2 | 10	3
M	**ALANDIN 100 EC**	Ωίδιο	2|10-14	3
M	**AZOFIN® 250 SC**	Περονόσπορος Ωίδιο	3 | 10	3
M	**CABRIO® DUO 4/7,2 EC**	Περονόσπορος	3 | 7	3
M	**COLLIS® 20/10 SC**	Ωίδιο	3 | 10-14	3
M	**ELLATHION DP (Micronized)**	Ωίδιο	3 | 10	ΔΟ
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
M	**ORVEGO® 30/22,5 SC**	Περονόσπορος	2|7-10	3
M	**PENCOL 10 EC**	Ωίδιο	3 | 7-14	3
M	**PIRGUS 80 WG**	Περονόσπορος	1-2 | 8-10	3
M	**PROMESS 72,2 SL**	Περονόσπορος	3 | 8-10	7 (Εφαρμογή στο φύλλωμα)
XM	**CUPRICO 50 WP**	Ανθράκωση, Βακτηρίωση (*Erwinia tracheiphila*), Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος	4 | 10-14	7
XM	**HYDROPLUS NEW 40 WG**	Ανθράκωση, Βακτηρίωση (*Erwinia tracheiphila*), Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος	4 | 10-14	7

Περγαμόντο

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**LAOTTA 1,8 EC**	Κίτρινος τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), Κόκκινος τετράνυχος των εσπεριδοειδών (*Panonychus citri*), Παραμορφωτικό άκαρι (*Aceria sheldoni*), Φυλλοκνίστης	1-3 | 7	10
E	**SERVATRAY**	Μύγα Μεσογείου	1	M/E
M	**FRAME 80 WG**	Ακάρεα (*Eriophyes* sp.)	8 | 7	ΔΟ
M	**PIRGUS 80 WG**	Φυτόφθορα	3 | 30	14
Z	**YAMBO 18/18 SL**	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια), Πολυετή ζιζάνια	1-2 | 90	ΔΟ

** Άνω των τριών (3) ετών.*

Πεύκα (αστικών και περιαστικών περιοχών)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**KITROFEN ULTRA 100 EC***	*Marchalina hellenica*	1**	M/E

** Για τη χρήση του KITROFEN ULTRA 100 EC σε πεύκα, ισχύουν ειδικές οδηγίες, απαγορεύσεις, περιορισμοί (βλ. ετικέτα του σκευάσματος για αναλυτικές πληροφορίες). | ** Με την προϋπόθεση ότι την ίδια περίοδο δεν θα χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό άλλο φυτοπροστατευτικό προϊόν.*

Πιπεριά ► Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	M/E
XM	**BORDO 20 WG**	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	4 | -	7
XM	**BORDO 20 WP**	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	4 | -	7
XM	**COURE FLOW 38 SC**	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
XM	**CURENOX 50 WG**	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
XM	**ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP**	Περονόσπορος, Φυτόφθορα καρπών	3 | 7-14	7

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Πιπεριά ► Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
XM	**ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP**	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
Z	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	21
	LUPO 365 CS	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	PENDINOVA® 330 EC	Αγρωστώδη (ετήσια) Ζιζάνια, Πλατύφυλλα (ετήσια) Ζιζάνια	1	ΔΟ
	QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	56

Πιπεριά (Θ)

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αλευρώδης, Αφίδες, Βρωμούσες, Δορυφόρος, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	4 | 7	3
	KITROFEN ULTRA 100 EC	Αλευρώδεις *(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)*	2 | 10-15*	3
	MATEUS® 10 CS (Zeon Tech)	Αφίδες, Δορυφόρος, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	2 | 14	3
	PHANTOM 2,5 EC	Αλευρώδεις, Αφίδες, Βρωμούσες, Δορυφόρος, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	4 | 7	3
	REVENGE 200 SL	Αλευρώδεις, Αφίδες	2 | 20	7
	REVOLVER 1,8 EC	Θρίπες *(Frankliniella occidentalis, Thrips* sp.*)*, Λιριόμυζα, Τετράνυχος *(Tetranychus urticae)*	4 | 7	3
	SHOOTER 200 SL	Αλευρώδεις, Αφίδες	2|10	3
M	**ALANDIN 100 EC**	Ωίδιο	2|10-12	3
	AZOFIN® 250 SC	Ωίδιο	2 | 7	3
	FRAME 80 WG	Ακάρεα (*Eriophyes* sp.), Παραμορφωτικό άκαρι (*Aculops lycopersici*), Τετράνυχοι (*Tetranychus urticae*), Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
	METMAN 25 WP	Περονόσπορος	2|14	14
	PROMESS 72,2 SL	Πύθιο, Φυτόφθορα	1	21 (Εφαρμογή στο έδαφος)
	SCALA® 40 SC	Βοτρύτης	3|10-14	3
XM	**CUPRICO 50 WP**	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
	HYDROPLUS NEW 40 WG	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	4 | 7-14	7

** KITROFEN ULTRA 100 EC: Μεσοδιάστημα επεμβάσεων 10 ημέρες όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη των 25°C και 15 ημέρες όταν είναι μικρότερη.*

Πιπεριά (Υ) ► Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Βρωμούσες, Δορυφόρος, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	3 | 14	3
	MATEUS® 10 CS (Zeon Tech)	Αφίδες, Δορυφόρος, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	2 | 14	3
	PHANTOM 2,5 EC	Αλευρώδεις, Αφίδες, Βρωμούσες, Δορυφόρος, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	3 | 14	3
	REVENGE 200 SL	Αλευρώδεις, Αφίδες	2 | 20	7
	REVOLVER 1,8 EC	Θρίπες *(Frankliniella occidentalis, Thrips* sp.*)*, Λιριόμυζα, Τετράνυχος *(Tetranychus urticae)*	3 | 7	3
	SHOOTER 200 SL	Αφίδες	1	3
M	**ALANDIN 100 EC**	Ωίδιο	2|10-12	3
	AZOFIN® 250 SC	Ωίδιο	2 | 7	3
	FRAME 80 WG	Ακάρεα (*Eriophyes* sp.), Παραμορφωτικό άκαρι (*Aculops lycopersici*), Τετράνυχοι (*Tetranychus urticae*), Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
	PROMESS 72,2 SL	Πύθιο, Φυτόφθορα	1	21 (Εφαρμογή στο έδαφος)

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Πιπεριά (Υ) ► Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	PHI
XM	**CUPRICO 50 WP**	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
	HYDROPLUS NEW 40 WG	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	4 | 7-14	7

Πορτοκαλιά

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Λεκάνιο, Μύγα Μεσογείου	1	30
	IMIDAN® 50 WP	Μύγα Μεσογείου	1	14
	KITROFEN ULTRA 100 EC	Ασπιδιωτός *(Aspidiotus* sp.*)*, Κόκκινη ψώρα (*Aonidiella* sp.), Λεκάνιο *(Saissetia* sp.*)*, Μυτιλόμορφη ψώρα *(Lepidosaphes beckii)*, Παρλατόρια *(Parlatoria pergandei)*	1	28
	LAOTTA 1,8 EC	Κίτρινος τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), Κόκκινος τετράνυχος των εσπεριδοειδών (*Panonychus citri*), Παραμορφωτικό άκαρι (*Aceria sheldoni*), Φυλλοκνίστης	1-3 | 7	10
	PHANTOM 2,5 EC	Αλευρώδης (Εριώδης), Αφίδες, Λεκάνιο, Μύγα μεσογείου	1	30
	REVENGE 200 SL	Αφίδες, Κοκκοειδή, Παρλατόρια, Φυλλοκνίστης, Ψευδόκοκκος, Ψώρα (κόκκινη)	2 | 30	14 (για δόση 70 κ.εκ./στρ.), 60 (για δόση 150 κ.εκ./στρ.)
	REVOLVER 1,8 EC	Πανόνυγχος *(Panonychus citri)*, Τετράνυχος *(Tetranychus urticae)*, Φυλλοκνίστης	3 | 10	10
	SCORPION EC	Αλευρώδεις, Κοκκοειδή, Λεκάνιο, Πανόνυγχος, Τετράνυχοι, Ψευδόκοκκος, Ψώρα (άσπρη), Ψώρα (κόκκινη), Ψώρα (μαύρη)	2 (με μια επιπλέον φθινοπωρινή εφαρμογή για *Aleurothrixus flocossus*) | 60	M/E
	SERVATRAY	Μύγα Μεσογείου	1	M/E
M	**FRAME 80 WG**	Ακάρεα	8 | 7	ΔΟ
	METMAN 25 WP	Φυτόφθορα	1 (Στάγδην άρδευση), 3 |14 (Ψεκασμός)	14
	PIRGUS 80 WG	Φυτόφθορα	3 | 30	14
XM	**BORDO 20 WG**	Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae)*, Κορυφοξήρα	2 | -	21
	BORDO 20 WP	Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae)*, Κορυφοξήρα	2 | -	21
	COURE FLOW 38 SC	Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση, Φυτόφθορα καρπών	2 | -	21
	CUPRICO 50 WP	Ανθράκωση, Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae)*, Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση, Φυτόφθορα καρπών	2 | -	21
	CURENOX 50 WG	Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση, Φυτόφθορα καρπών	2 | -	21
	HYDROPLUS NEW 40 WG	Ανθράκωση, Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae)*, Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση, Φυτόφθορα καρπών	3 | -	21
	ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP	Κορυφοξήρα, Φυτόφθορα καρπών	2 | -	21
	ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP	Βακτηρίωση *(Pseudomonas syringae)*, Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση, Φυτόφθορα καρπών	2 | -	21
Z	**ABILEST 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	FENHEX 24 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	21
	IFESTOS TF 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	IPIGLYCE NEW 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	KEYNERON GREEN 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	LUPO 365 CS	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	YAMBO 18/18 SL*	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια), Πολυετή ζιζάνια	1-2 | 90	ΔΟ

** Άνω των τριών (3) ετών.*

Πράσο ► Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Θρίπες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.)	3 | 14	7

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Πράσο ► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Ε	**PHANTOM 2,5 EC**	Αλευρώδεις, Αφίδες, Θρίπες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.)	3 | 14	7
ΧΜ	**BORDO 20 WG**	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	4 | -	7
ΧΜ	**BORDO 20 WP**	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	4 | -	7
ΧΜ	**COURE FLOW 38 SC**	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
ΧΜ	**CURENOX 50 WG**	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
ΧΜ	**ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP**	Περονόσπορος, Φυτόφθορα καρπών	3 | 7-14	7
ΧΜ	**ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP**	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
Ζ	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	42

Προσκολλητικό - επιφανειοδραστικό

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
ΕΠ	**BLUE SHADE**	Προσκολλητικό - επιφανειοδραστικό	-	Μ/Ε
ΕΠ	**COMO PLUS**	Προσκολλητικό - επιφανειοδραστικό	-	Μ/Ε

Ραδίκι

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Μ	**FRAME 80 WG**	Τετράνυχος, Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
ΧΜ	**COURE FLOW 38 SC**	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
ΧΜ	**ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP**	Περονόσπορος, Φυτόφθορα καρπών	3 | 7-14	7
Ζ	**QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	49

Ραπάνι

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Ε	**EFALVAC 1,5 GR**	Υλέμυια	1	21
Ε	**SWEEP MAX 500 EC**	*Autographa* sp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Άλτης, Αφίδες, Δορυφόρος, Θρίπες, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τζιτζικάκια, Φθορίμαία	2 | 10	3
Μ	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
ΧΜ	**COURE FLOW 38 SC**	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
ΧΜ	**ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP**	Περονόσπορος, Φυτόφθορα καρπών	3 | 7-14	7
Ζ	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	35

Ρέβα

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Ε	**SWEEP MAX 500 EC**	*Euxoa* spp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Αφίδες, Κασσίδα, Κλεονός, Λίξος, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τριχοπλούσια, Φθορίμαία	2 | 10	14

Ρεβίθι ► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Ε	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Πράσινο σκουλήκι	2 | 14	7
Μ	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
Ζ	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	56
Ζ	**PENDINOVA® 330 EC**	Αγρωστώδη (ετήσια) Ζιζάνια, Πλατύφυλλα (ετήσια) Ζιζάνια	1	ΔΟ

(1) Κατηγορία: Ε Εντομοκτόνα, Υ Υποκαπνιστικά, Μ Μυκητοκτόνα, ΧΜ Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Ζ Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Ρεβίθι ► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
Z	**QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	21

Ροδακινιά

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Ανάρσια, Αφίδες, Καρπόκαψα δαμασκηνιάς (*Cydia funebrana*), Μύγα Μεσογείου, Φυλλοδέτες	1	7
	IMIDAN® 50 WP	Ανάρσια, Καρπόκαψα ροδακινιάς (*Cydia molesta*), Μύγα Μεσογείου	2 | 10	14
	KITROFEN ULTRA 100 EC	Βαμβακάδα (ή Διάσπις) Ψώρα Σαν Ζοζέ	1 (πριν την άνθηση)	Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
	LAOTTA 1,8 EC	Κίτρινος τετράνυχος *(Tetranychus urticae)*, Κόκκινος τετράνυχος *(Panonychus ulmi)*	1	14
	MATEUS® 10 CS (Zeon Tech)	Φυλλοδέτες	2 | 14	7
	PHANTOM 2,5 EC	Ανάρσια, Αφίδες, Καρπόκαψα δαμασκηνιάς (*Cydia funebrana*), Μύγα μεσογείου, Φυλλοδέτες, Ψώρα Σαν Ζοζέ	1	7
	REVENGE 200 SL	Ανάρσια, Αφίδες, Θρίπες, Καρπόκαψα ροδακινιάς (*Cydia molesta*), Τζιτζικάκια, Φυλλορύκτες	2 | 20	14
	REVOLVER 1,8 EC	Ακάρεα (*Aculus schlechtendali*, *Aculus* sp., *Eryophyes* spp.), Θρίπες *(Frankliniella occidentalis, Thrips* sp.*)*, Πανόνυγχος *(Panonychus ulmi)*, Τετράνυχος *(Tetranychus urticae)*, Ψύλλα	2 | 14	14
	SCORPION EC	Ακάρεα, Αφίδες, Βαμβακάδα (ή Διάσπις), Κοκκοειδή, Πανόνυγχος, Παρλατόρια, Σφαιρολεκάνιο, Τετράνυχοι, Φυλλοδέτες, Ψώρα (μυτιλόμορφη), Ψώρα Σαν Ζοζέ	2 | 60	M/E
M	**ALANDIN 100 EC**	Ωίδιο	2|12-14	14
	FRAME 80 WG	Ωίδιο	8 | 7	ΔΟ
	LAGOON 25 EW	Μονίλια καρπών *(Monilia laxa)*, Ωίδιο	1	7
	MORGAN 80 WG	Εξώασκος, Φαιά σήψη ανθέων και κλάδων *(Monilia* spp.*)*	4 | 7-14	21
		Φουζίκοκκο (ή φόμοψη)*	1	21
	PENCOL 10 EC	Ωίδιο	3 | 7-14	14
	RIBBON 12 EC	Ωίδιο	3 | -	21
	SIVAR GOLD 25,5/6,25 SC	Φυτόφθορα	3|-	15
	URANSER	Φυτόφθορα	3|14	14
XM	**BORDO 20 WG**	Εξώασκος, Κορύνεο, Φαιά σήψη	2 | -	ΔΟ
	BORDO 20 WP	Εξώασκος, Κορύνεο, Φαιά σήψη	2 | -	ΔΟ
	COURE FLOW 38 SC	Βακτηριακό έλκος, Εξώασκος, Κλαδοσπορίωση, Κορύνεο, Φαιά σήψη	4 | -	ΔΟ
	CUPRICO 50 WP	Βακτηριακό έλκος, Εξώασκος, Κλαδοσπορίωση, Κορύνεο, Φαιά σήψη	4 | -	ΔΟ
	CURENOX 50 WG	Βακτηριακό έλκος, Εξώασκος, Κλαδοσπορίωση, Κορύνεο, Φαιά σήψη	4 | -	ΔΟ
	HYDROPLUS NEW 40 WG	Βακτηριακό έλκος, Εξώασκος, Κλαδοσπορίωση, Κορύνεο, Φαιά σήψη	4 | -	ΔΟ
	ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP	Εξώασκος, Κορύνεο	4 | -	ΔΟ
	ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP	Βακτηριακό έλκος, Εξώασκος, Κλαδοσπορίωση, Κορύνεο, Φαιά σήψη	4 | -	ΔΟ
Z	**ABILEST 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	FENHEX 24 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	180
	IFESTOS TF 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	IPIGLYCE NEW 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	LUPO 365 CS	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	KEYNERON GREEN 36 SL	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) Ζιζάνια, Πολυετή Ζιζάνια	1-2 | -	7
	QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	35
	YAMBO 18/18 SL**	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια), Πολυετή ζιζάνια	1-2 | 90	ΔΟ

** Χρήση Ήσσονος Σημασίας. | ** Άνω των τριών (3) ετών.*

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Ροδιά

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
M	**SCORPION EC**	Ακάρεα*, Κηροπλάστης*, Κίτρινος τετράνυχος*, Κόκκινος τετράνυχος*, Κοκκοειδή*, Λεκάνιο*	1-2 | 2min	M/E

** Χρήση Ήσσονος Σημασίας.*

Ρόκα

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	M/E
	DELMUS 2,5 EC	Άλτης, Αφίδες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Μαμέστρα, Σποντόπτερα	2 | 14	3
	PHANTOM 2,5 EC	Άλτης, Αφίδες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Μαμέστρα, Σποντόπτερα	2 | 14	3
	REVENGE 200 SL	Αφίδες	1	7

Ρύζι

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
M	**SIVAR 25 SC**	Ελμινθοσπορίωση, Πυρικουλάρια	1	28

Σέλερι

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**EFALVAC 1,5 GR**	Ψύλλα *(Psila rosae)*	1	110

Σέλινο

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**DELMUS 2,5 EC**	Άλτης, Αφίδες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Μαμέστρα, Σποντόπτερα	2 | 14	7
	PHANTOM 2,5 EC	Άλτης, Αφίδες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Μαμέστρα, Σποντόπτερα	2 | 14	7
XM	**BORDO 20 WG**	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	4 | -	7
	BORDO 20 WP	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	4 | -	7
	COURE FLOW 38 SC	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
	CUPRICO 50 WP	Κερκοσπορίωση, Σεπτορίωση	3 | 7-10	7
	CURENOX 50 WG	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
	HYDROPLUS NEW 40 WG	Κερκοσπορίωση, Σεπτορίωση	3 | 7-10	7
	ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP	Περονόσπορος, Φυτόφθορα καρπών	3 | 7-14	7
	ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
Z	**QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	70

Σελινόριζα (ραπανοσέλινο) ► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**REBEL 100 EW**	*Autographa* sp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Άλτης, Αφίδες, Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Δορυφόρος, Θρίπες, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τζιτζικάκια, Φθορίμαία	2 | -	14
	SWEEP MAX 500 EC	*Autographa* sp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Άλτης, Αφίδες, Δορυφόρος, Θρίπες, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τζιτζικάκια, Φθορίμαία	2 | 10	3

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Σελινόριζα (ραπανοσέλινο) ► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
Ζ	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	ΔΟ

Σέσκουλο

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
Ε	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	Μ/Ε
	SWEEP MAX 500 EC	*Euxoa* spp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Αφίδες, Κασσίδα, Κλεονός, Λίξος, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τριχοπλούσια, Φθορίμαία	2 | 10	14

Σίκαλη

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
Ε	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.)	1	30
	SWEEP MAX 500 EC	Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αφίδες, Κνεφάσια (*Cnephasia* sp.), Κολεόπτερα – Σκαθάρια, Κριόκερο	2 | 14	28
Μ	**COMRADE SC**	Σεπτορίωση	2 | 21	42
	FRAME 80 WG	Ωίδιο	2 | 14	ΔΟ
	LAGOON 25 EW	Ελμινθοσπορίωση, Σεπτορίωση	1	28
Ζ	**ABILEST 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	VERITY 750 SL	Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ

Σινάπι

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
Ε	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	Μ/Ε
	REVENGE 200 SL	Αφίδες	1	7
	SWEEP MAX 500 EC	Άλτης, Κηκιδόμυγες, Κολεόπτερα - Σκαθάρια	2 | 14	21
Ζ	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	21

Σιτάρι

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
Ε	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.)	1	30
	PHANTOM 2,5 EC	Αφίδες, Θρίπες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.)	1-2 | 21	30
	REBEL 100 EW	Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αφίδες	2 | -	21
	SWEEP MAX 500 EC	*Oulema* sp, Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αφίδες, Κνεφάσια (*Cnephasia* sp.), Κριόκερο	2 | 14	28
Μ	**COMRADE SC**	Σεπτορίωση	2 | 21	42
	FRAME 80 WG	Ωίδιο	2 | 14	ΔΟ
	LAGOON 25 EW	Ελμινθοσπορίωση, Σεπτορίωση	1	28
Ζ	**ABILEST 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	LUPO 365 CS	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	PENDINOVA® 330 EC	Αγρωστώδη (ετήσια) Ζιζάνια, Πλατύφυλλα (ετήσια) Ζιζάνια	1	ΔΟ
	RENOX® 40 SL	Πλατύφυλλα Ζιζάνια (ετήσια και ορισμένα πολυετή)	1	ΔΟ
	SANAPHEN 600 EC	Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	60
	VERITY 750 SL	Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ

(1) Κατηγορία: Ε Εντομοκτόνα, Υ Υποκαπνιστικά, Μ Μυκητοκτόνα, ΧΜ Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Ζ Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Σιτάρι (μαλακό, σκληρό)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	PHI
Z	**HELSTAR 6,9 EW**	Αγρωστώδη Ζιζάνια	1	ΔΟ
	NIMBLE® 50/25 WG	Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ

Σκαρόλα

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	PHI
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	M/E
	REVENGE 200 SL	Αφίδες	1	7
M	**FRAME 80 WG**	Τετράνυχος, Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
Z	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	21

Σκαρόλα (Υ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	PHI
E	**LAOTTA 1,8 EC**	Λιριόμυζα, Τετράνυχοι	1-3 | 7	7
M	**METMAN 25 WP**	Περονόσπορος	3|10	14
	SCALA® 40 SC	Βοτρύτης	2|10-14	14

Σκαρόλα (Θ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	PHI
M	**SCALA® 40 SC**	Βοτρύτης	2|10-14	14

Σκόρδο

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Θρίπες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.)	3 | 14	7
	SWEEP MAX 500 EC	Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Αφίδες, Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Δορυφόρος, Θρίπες, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σκουλήκι του πράσου, Σποντόπτερα, Τζιτζικάκια, Φθορίμαία	2 | 10	3
M	**AZOFIN® 250 SC**	Σκωρίαση	3 | 7	14
	FRAME 80 WG	Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
Z	**ABILEST 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	FOCUS® 10 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	28
	LUPO 365 CS	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	PENDINOVA® 330 EC	Αγρωστώδη (ετήσια) Ζιζάνια, Πλατύφυλλα (ετήσια) Ζιζάνια	1	ΔΟ
	QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	49

Σκόρδο (Υ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	PHI
M	**CABRIO® DUO 4/7,2 EC**	Αλτερνάρια*, Περονόσπορος	3 | 7-8	7

**Χρήση Ήσσονος Σημασίας.*

Σμέουρα ► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	PHI
M	**ALANDIN 100 EC**	Ωίδιο	1	3

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Σμέουρα ► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	6 | 14	ΔΟ

Σμέουρα (Θ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**SHOOTER 200 SL**	Αφίδες	2|10	3

Σόγια

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	Μ/Ε
	PHANTOM 2,5 EC	Άλτης, Αφίδες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Νεζάρα	2 | 14	ΔΟ
M	**FRAME 80 WG**	Ωίδιο	2 | 14	ΔΟ
Z	**ABILEST 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	FOCUS® 10 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	56
	LUPO 365 CS	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
	PENDINOVA® 330 EC	Αγρωστώδη (ετήσια) Ζιζάνια, Πλατύφυλλα (ετήσια) Ζιζάνια	1	ΔΟ
	QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	60

Σόργο

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	2|45	Μ/Ε
	EFALVAC 1,5 GR	Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1 | Ανά 3 χρόνια	ΔΟ

Σπανάκι

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	Μ/Ε
M	**FRAME 80 WG**	Τετράνυχος, Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
XM	**BORDO 20 WG**	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	4 | -	7
	BORDO 20 WP	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	4 | -	7
	COURE FLOW 38 SC	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
	ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP	Περονόσπορος, Φυτόφθορα καρπών	3 | 7-14	7
Z	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	28
	QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	21

Σπαράγγι ► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	**PHANTOM 2,5 EC**	Αφίδες, Θρίπες	2 | 7	ΔΟ
M	**AZOFIN® 250 SC**	Σκωρίαση, Στεμφύλιο	2 | 10	Μ/Ε
	DIFENOFIN® 250 EC	Σκωρίαση	3|14	ΔΟ

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Σπαράγγι ► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	PHI
M	**LAGOON 25 EW**	Σκωρίαση	1	ΔΟ (Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής)
Z	**PENDINOVA® 330 EC**	Αγρωστώδη (ετήσια) Ζιζάνια, Πλατύφυλλα (ετήσια) Ζιζάνια	1	28

Σπορεία

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	PHI
ΕΠ	**MERIDIEN 5 GB**	Σαλιγκάρια/ Γυμνοσάλιαγκες (λείμακες, αρίονες)	3 | -	M/E

Σπόροι ελαιοκράμβης

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	PHI
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	M/E

Σπόροι παπαρούνας

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	PHI
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	M/E

Τομάτα

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	PHI
E	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	M/E
M	**DYNASTY 20/12,5 SC**	Αλτερνάρια, Περονόσπορος, Ωίδιο	3|8-10	3
Z	**ABILEST 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
Z	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	42
Z	**LUPO 365 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
Z	**PENDINOVA® 330 EC**	Αγρωστώδη (ετήσια) Ζιζάνια, Πλατύφυλλα (ετήσια) Ζιζάνια	1	ΔΟ
Z	**QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	56
Z	**SELAS 24 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (Ετήσια και πολυετή)	1	30
Z	**TERRIFIC 96 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ

Τομάτα (Θ) ► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Βρωμούσες, Δορυφόρος, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	4 | 7	3
E	**KITROFEN ULTRA 100 EC**	Αλευρώδεις *(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)*	2 | 10	3
E	**LAOTTA 1,8 EC**	Ακάρεα, Κίτρινος τετράνυχος *(Tetranychus urticae)*, Λιριόμυζα	1-3 | 7	3
E	**MATEUS® 10 CS (Zeon Tech)**	Αφίδες, Δορυφόρος, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	2 | 14	3
E	**OXAMYL ASCENZA 10 SL**	Νηματώδεις	3 | 20	21
E	**PHANTOM 2,5 EC**	Αφίδες, Βρωμούσες, Δορυφόρος, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	3 | 7	3
E	**REBEL 100 EW**	*Autographa* sp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Αφίδες, Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Δορυφόρος, Θρίπες, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τζιτζικάκια, Φθοριμαία	2 | -	3

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Τομάτα (Θ) ► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**REVENGE 200 SL**	Αλευρώδεις, Αφίδες	2 | 20	3
	REVOLVER 1,8 EC	Θρίπες *(Frankliniella occidentalis, Thrips* sp.*)*, Λιριόμυζα, Τετράνυχος *(Tetranychus urticae)*	4 | 7	3
	SHOOTER 200 SL	Αλευρώδεις, Αφίδες	2|10	3
M	**ALANDIN 100 EC***	Ωίδιο	2|10-12	3
	AZOFIN® 250 SC	Αλτερνάρια, Περονόσπορος, Ωίδιο	3 | 7	3
	BOTREFIN® PLUS 37,5/25 WG	Βοτρύτης	3 | 7-10	3
	CABRIO® DUO 4/7,2 EC	Περονόσπορος	3 | 7-8	3
	FOLLOW 80 WG	Περονόσπορος	3 | 7	7
	FRAME 80 WG	Ακάρεα (*Eriophyes* sp.), Παραμορφωτικό άκαρι (*Aculops lycopersici*), Τετράνυχοι (*Tetranychus urticae*), Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
	METMAN 25 WP	Περονόσπορος	3|10	14
	ORVEGO® 30/22,5 SC	Περονόσπορος	3|7-10	3
	PENCOL 10 EC	Ωίδιο	3 | 7-14	3
	PIRGUS 80 WG	Περονόσπορος	4 | 10	3
	PROMESS 72,2 SL	Πύθιο, Φυτόφθορα	1	21 (Εφαρμογή στο έδαφος)
	PROXANIL DUO SC	Περονόσπορος	3|7-10	3
	SCALA® 40 SC	Βοτρύτης	3|10-14	3
	SIVAR 25 SC	Ωίδιο	2 | 10	3
	SIVAR GOLD 25,5/6,25 SC	Περονόσπορος	3|10	0
XM	**BORDO 20 WG**	Βακτηριακή κηλίδωση (*Xanthomonas campestris*), Περονόσπορος	3 | -	7
	BORDO 20 WP	Βακτηριακή κηλίδωση (*Xanthomonas campestris*), Περονόσπορος	3 | -	7
	COURE FLOW 38 SC	Βακτηριακή κηλίδωση (*Xanthomonas campestris*), Περονόσπορος	2 | -	7
	CUPRICO 50 WP	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
	CURENOX 50 WG	Περονόσπορος	2 | -	7
	HYDROPLUS NEW 40 WG	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
	ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP	Περονόσπορος	2 | -	7
	ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP	Περονόσπορος	2 | -	7

** Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που προορίζονται για μεταποίηση.*

Τομάτα (Υ) ► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Βρωμούσες, Δορυφόρος, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	3 | 14	3
	LAOTTA 1,8 EC	Ακάρεα, Κίτρινος τετράνυχος *(Tetranychus urticae)*, Λιριόμυζα	1-3 | 7	3
	MATEUS® 10 CS (Zeon Tech)	Αφίδες, Δορυφόρος, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	2 | 14	3
	PHANTOM 2,5 EC	Αλευρώδεις, Αφίδες, Βρωμούσες, Δορυφόρος, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα	3 | 14	3
	REBEL 100 EW	*Autographa* sp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Αφίδες, Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Δορυφόρος, Θρίπες, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τζιτζικάκια, Φθοριμαία	2 | -	7
	REVENGE 200 SL	Αλευρώδεις, Αφίδες	2 | 20	7
	REVOLVER 1,8 EC	Θρίπες *(Frankliniella occidentalis, Thrips* sp.*)*, Λιριόμυζα, Τετράνυχος *(Tetranychus urticae)*	4 | 7	3
	SWEEP MAX 500 EC	*Autographa* sp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αλευρώδεις, Αφίδες, Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Δορυφόρος, Θρίπες, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Τζιτζικάκια, Φθοριμαία	2 | 10	3

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Τομάτα (Υ) ► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
M	**ALANDIN 100 EC***	Ωίδιο	2|10-12	3
M	**CABRIO® DUO 4/7,2 EC**	Περονόσπορος	3|7-8	3
M	**ELLATHION DP (Micronized)**	Ωίδιο	3|10	ΔΟ
M	**FILDER 69 WG**	Περονόσπορος	3|7-10	3
M	**FRAME 80 WG**	Ακάρεα (*Eriophyes* sp.), Παραμορφωτικό άκαρι (*Aculops lycopersici*), Τετράνυχοι (*Tetranychus urticae*), Ωίδιο	8|7-10	ΔΟ
M	**METMAN 25 WP**	Περονόσπορος	3|10	14
M	**MORGAN 80 WG**	Αλτερνάρια	4|7-14	21
M	**ORVEGO® 30/22,5 SC**	Περονόσπορος	3|7-10	3
M	**PIRGUS 80 WG**	Περονόσπορος (*Phytophthora Infestans*)	4|10	3
M	**PROMESS 72,2 SL**	Πύθιο, Φυτόφθορα	1	21 (Εφαρμογή στο έδαφος)
M	**PROXANIL DUO SC**	Περονόσπορος	3|7-10	3
M	**SCALA® 40 SC**	Βοτρύτης	3|10-14	3
M	**SIVAR GOLD 25,5/6,25 SC**	Περονόσπορος	3|10	0
XM	**BORDO 20 WG**	Βακτηριακή κηλίδωση (*Xanthomonas campestris*), Περονόσπορος	3|-	10
XM	**BORDO 20 WP**	Βακτηριακή κηλίδωση (*Xanthomonas campestris*), Περονόσπορος	3|-	10
XM	**COURE FLOW 38 SC**	Βακτηριακή κηλίδωση (*Xanthomonas campestris*), Περονόσπορος	2|-	10
XM	**CUPRICO 50 WP**	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3|10-14	10
XM	**CURENOX 50 WG**	Περονόσπορος	2|-	10
XM	**HYDROPLUS NEW 40 WG**	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3|7-14	10
XM	**ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP**	Περονόσπορος	2|-	10
XM	**ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP**	Περονόσπορος	2|-	10

** Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που προορίζονται για μεταποίηση.*

Τριανταφυλλιά

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
M	**ELLATHION DP (Micronized)**	Ωίδιο	3|10-15	M/E
M	**FRAME 80 WG**	Ακάρεα, Ωίδιο	8|7	M/E
M	**RIBBON 12 EC**	Μελανή κηλίδωση, Ωίδιο	5|7-14	M/E

Τριτικάλε

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
M	**COMRADE SC**	Σεπτορίωση	2|21	42
M	**LAGOON 25 EW**	Ελμινθοσπορίωση, Σεπτορίωση	1	28
Z	**ABILEST 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ

Φακή

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ME	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Κοφτοσκούληκο (*Agrotis* spp.), Πράσινο σκουλήκι	2|14	7
E	**MATEUS® 10 CS (Zeon Tech)**	Βρούχος	2|10	3
Z	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	56
Z	**QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	21

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Φασόλι

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
M	FRAME 80 WG	Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
XM	BORDO 20 WG	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	4 | -	7
XM	BORDO 20 WP	Ανθράκωση, Βακτηριώσεις, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	4 | -	7
XM	COURE FLOW 38 SC	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
XM	CUPRICO 50 WP	Βακτηριώσεις, Κερκοσπορίωση	3 | 7-14	7
XM	CURENOX 50 WG	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
XM	HYDROPLUS NEW 40 WG	Βακτηριώσεις, Κερκοσπορίωση	3 | 7-14	7
XM	ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP	Περονόσπορος, Φυτόφθορα καρπών	3 | 7-14	7
XM	ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP	Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Περονόσπορος, Σεπτορίωση	3 | 7-14	7
Z	FOCUS® 10 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	56
Z	LUPO 365 CS	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
Z	PENDINOVA® 330 EC	Αγρωστώδη (ετήσια) Ζιζάνια, Πλατύφυλλα (ετήσια) Ζιζάνια	1	ΔΟ
Z	QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια	1	35

Φασόλι με λοβό

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	EFALVAC 1,5 GR	Σιδηροσκώληκες (*Agriotes* spp.), Υλέμυια	1	ΔΟ
Z	FOCUS® 10 EC	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	28
Z	LUPO 365 CS	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ

Φασόλι με λοβό (Θ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
M	FRAME 80 WG	Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ
M	SCALA® 40 SC	Βοτρύτης	2|10-14	14

Φασόλι με λοβό (Υ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	SWEEP MAX 500 EC	*Autographa* sp., Αγρότιδα (ή Καραφατμέ) (*Agrotis* spp.), Αφίδες, Θρίπες, Μαμέστρα, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σιτόνα, Σποντόπτερα, Φθορίμαία	2 | 10	3
M	FRAME 80 WG	Ωίδιο	8 | 7-10	ΔΟ

Φιστικιά ► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
E	DELMUS 2,5 EC	Αφίδες, Ευρύτομο	2 | 14	30
E	KITROFEN ULTRA 100 EC	Ψώρα Σαν Ζοζέ	1 (πριν την άνθηση)	Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
E	SCORPION EC	Κίτρινος Τετράνυχος*, Κηροπλάστης*, Λεκάνιο*, Ψύλλα*, Ψώρες (λοιπές)*	1-2 | 2min	M/E
M	MORGAN 80 WG	Αλτερνάρια*, Βοτρυοσφαίρια*, Σεπτόρια*	4 | 7-14	ΔΟ
M	SCALA® 40 SC	Καμαροσπόριο	2|7	30
XM	COURE FLOW 38 SC	Σεπτορίωση	4 | -	28
XM	CUPRICO 50 WP	Σεπτορίωση	4 | -	28
XM	CURENOX 50 WG	Σεπτορίωση	4 | -	28
XM	HYDROPLUS NEW 40 WG	Σεπτορίωση	3 | -	28

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Φιστικιά ► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
XM	**ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP**	Σεπτορίωση	4 | -	28

** Χρήση Ήσσονος Σημασίας.*

Φοινικοειδή

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**MATEUS® 10 CS (Zeon Tech)***	Κόκκινο σκαθάρι των φοινικοειδών	2 | -	M/E

** Ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις/ απαγορεύσεις/ περιορισμοί χρήσης (βλ. ετικέτα).*

Φουντουκιά

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες, Καρπόκαψα καστανιάς (*Cydia* sp.)	2 | 14	30
E	**KITROFEN ULTRA 100 EC**	Ψώρα Σαν Ζοζέ*	1 (πριν την άνθηση)	Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
M	**FRAME 80 WG**	Ακάρεα (*Eriophyes* sp., *Phytoptus avelanae*), Ωίδιο	2-8 | 7	ΔΟ
XM	**COURE FLOW 38 SC**	Βακτηριακό έλκος	3 | -	28
XM	**CUPRICO 50 WP**	Βακτηριακό έλκος	2 | -	28
XM	**CURENOX 50 WG**	Βακτηριακό έλκος	3 | -	28
XM	**HYDROPLUS NEW 40 WG**	Βακτηριακό έλκος	2 | -	28
XM	**ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP**	Βακτηριακό έλκος	3 | -	28
Z	**LUPO 365 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ

** Χρήση Ήσσονος Σημασίας.*

Φράουλα

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
E	**PHANTOM 2,5 EC**	Αφίδες	3 | 14	3
Z	**ABILEST 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
Z	**QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	35

Φράουλα (Θ)

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
M	**ALANDIN 100 EC***	Ωίδιο	2|10-14	3
M	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες	3 | 14	3
M	**LAOTTA 1,8 EC**	Ακάρεα, Κίτρινος τετράνυχος *(Tetranychus urticae)*, Λιριόμυζα	1-2 | 7	3
M	**SHOOTER 200 SL**	Αλευρώδεις, Αφίδες	2|10	3
M	**BOTREFIN® PLUS 37,5/25 WG**	Βοτρύτης	2 | 10	1
M	**FRAME 80 WG**	Ακάρεα (*Eriophyes* sp., *Aculops lycopersici*), Ωίδιο	8 | 10-14	ΔΟ
M	**METMAN 25 WP**	Φυτόφθορα	1	14
M	**PIRGUS 80 WG**	Φυτόφθορα λαιμού και ριζών *(Phytophthora cactorum)*	1-3 | 8-10(1)	14
			1(2)	-
M	**SCALA® 40 SC**	Βοτρύτης	2|7-14	3

** Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που προορίζονται για μεταποίηση. \| (1) Προληπτικοί ψεκασμοί έως την άνθηση (BBCH 12-59). \| (2) Εμβάπτιση ριζώματος πριν τη φύτευση.*

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Φράουλα (Υ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Ε	**DELMUS 2,5 EC**	Αφίδες	3 | 14	3
Μ	**ALANDIN 100 EC***	Ωίδιο	2|10-14	3
Μ	**AZOFIN® 250 SC**	Ωίδιο	3 | 7	3
Μ	**BOTREFIN® PLUS 37,5/25 WG**	Βοτρύτης	1	2
Μ	**FRAME 80 WG**	Ακάρεα (*Eriophyes* sp., *Aculops lycopersici*), Ωίδιο	8 | 10-14	ΔΟ
Μ	**PIRGUS 80 WG**	Φυτόφθορα λαιμού και ριζών *(Phytophthora cactorum)*	1-3 | 8-10(1)	14
			1(2)	-
Μ	**SCALA® 40 SC**	Βοτρύτης	3|7-14	3

** Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που προορίζονται για μεταποίηση. | (1) Προληπτικοί ψεκασμοί έως την άνθηση (BBCH 12-59). | (2) Εμβάπτιση ριζώματος πριν τη φύτευση.*

Φράπα

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Ε	**LAOTTA 1,8 EC**	Κίτρινος τετράνυχος (*Tetranychus urticae*) , Κόκκινος τετράνυχος των εσπεριδοειδών (*Panonychus citri*), Παραμορφωτικό άκαρι (*Aceria sheldoni*), Φυλλοκνίστης	1-3 | 7	10
Ε	**REVENGE 200 SL**	Αφίδες, Κοκκοειδή, Παρλατόρια, Φυλλοκνίστης, Ψευδόκοκκος, Ψώρα (κόκκινη)	2 | 30	14 (για δόση 70 κ.εκ./στρ.), 30 (για δόση 150 κ.εκ./στρ.)
Ε	**SCORPION EC**	Ακάρεα, Αλευρώδεις, Κοκκοειδή, Λεκάνιο, Πανόνυγχος, Τετράνυχοι, Ψευδόκοκκος, Ψώρα (άσπρη), Ψώρα (κόκκινη), Ψώρα (μαύρη)	2 (με μια επιπλέον φθινοπωρινή εφαρμογή για *Aleurothrixus flocossus*) | 60	M/E
Ε	**SERVATRAY**	Μύγα Μεσογείου	1	M/E
Μ	**FRAME 80 WG**	Ακάρεα (*Eriophyes* sp.)	8 | 7	ΔΟ
Μ	**PIRGUS 80 WG**	Φυτόφθορα	3 | 30	14
ΧΜ	**BORDO 20 WG**	Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae)*, Κορυφοξήρα	2 | -	21
ΧΜ	**BORDO 20 WP**	Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae)*, Κορυφοξήρα	2 | -	21
Ζ	**ABILEST 455 CS**	Αγρωστώδη Ζιζάνια, Πλατύφυλλα Ζιζάνια	1	ΔΟ
Ζ	**YAMBO 18/18 SL***	Ετήσια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια), Πολυετή ζιζάνια	1-2 | 90	ΔΟ

** Άνω των τριών (3) ετών.*

Φύλλα τεύτλων (Υ)

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Μ	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	M/E

Φυτώρια

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
ΕΠ	**MERIDIEN 5 GB**	Σαλιγκάρια/ Γυμνοσάλιαγκες (λείμακες, αρίονες)	3 | -	M/E

Φυτώρια οπωροφόρων δένδρων και νεαρά δέντρα

	Προϊόν	Στόχος	ΜΑΕ | ΜΕ	ΦΗΙ
Μ	**CONTROL 0,4 GR**	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο) (*Agrotis* spp.), Διαβρώτικα (*Diabrotica* spp.), Μηλολόνθη, Σιδηροσκούληκα (*Agriotes* spp.)	1	M/E

(1) Κατηγορία: Ε Εντομοκτόνα, Υ Υποκαπνιστικά, Μ Μυκητοκτόνα, ΧΜ Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Ζ Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

Χρένο

	Προϊόν	Στόχος	MAE | ΜΕ	PHI
Z	**FOCUS® 10 EC**	Αγρωστώδη Ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)	1	ΔΟ

(1) Κατηγορία: E Εντομοκτόνα, Y Υποκαπνιστικά, M Μυκητοκτόνα, XM Χαλκούχα Μυκητοκτόνα, Z Ζιζανιοκτόνα, ΕΠ Ειδικά Προϊόντα

ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΡΕΨΗΣ - ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Μείγματα μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων, Βιοδιεγέρτες, Προϊόντα εξειδικευμένης θρέψης

Προϊόν (εγγυημένη σύνθεση)	**Περιγραφή**

ADIMEL®+

BIO

Υγρό μείγμα θρεπτικών ιχνοστοιχείων Μαγγανίου (Mn) και Ψευδαργύρου (Zn)

Μαγγάνιο (Mn), υδατοδιαλυτό: 1% β/β
Ψευδάργυρος (Zn), υδατοδιαλυτός: 1% β/β

Το **ADIMEL®+** είναι διάλυμα μοριακών μορφών μαγγανίου και ψευδαργύρου, με καλή διασυστηματική απορρόφηση όταν εφαρμόζεται με ψεκασμό.

Προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για την πρόληψη και τη θεραπεία τροφοπενιών μαγγανίου ή/και ψευδαργύρου και την πρόληψη/ αποφυγή ανωμαλιών στη φυτική ανάπτυξη που σχετίζονται με την έλλειψη αυτών των ιχνοστοιχείων.

Δοσολογία: Εφαρμόζεται **διαφυλλικά** με δόση 250-300 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό.

BIOCUAJE®

Υγρό διάλυμα Φωσφόρου (P) - Καλίου (K) και θρεπτικών ιχνοστοιχείων, με κυρίαρχο το Μολυβδαίνιο (Mo)

Φώσφορος (P_2O_5), υδατοδιαλυτός: 20% β/β
Κάλιο (K_2O), υδατοδιαλυτό: 5% β/β
Βόριο (B), υδατοδιαλυτό: 0,02% β/β
Σίδηρος (Fe), υδατοδιαλυτός: 0,1% β/β
Μαγγάνιο (Mη), υδατοδιαλυτό: 0,2% β/β
Μολυβδαίνιο (Mo), υδατοδιαλυτό: 2,5% β/β
Ψευδάργυρος (Zn), υδατοδιαλυτός: 0,2% β/β

Το **BIOCUAJE®** είναι σταθερό υδατικό διάλυμα Φωσφόρου (P) - Καλίου (K) και θρεπτικών ιχνοστοιχείων, με κυρίαρχο το μολυβδαίνιο (Mo).

Η εφαρμογή του προϊόντος προάγει την καρπόδεση ενισχύοντας τη χημική συγγένεια μεταξύ γύρης και γυρεοσωλήνα λόγω της παρουσίας του μολυβδαινίου, ενώ, η υψηλή συγκέντρωση φωσφόρου διεγείρει τη γονιμοποίηση των ανθέων.

Δοσολογία: **Διαφυλλική εφαρμογή**: 100-150 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό (100-150 κ.εκ./ στρέμμα). Συστήνονται 1-2 εφαρμογές, από την έναρξη έως το τέλος της ανθοφορίας. Η δεύτερη εφαρμογή συνιστάται όταν οι κλιματολογικές συνθήκες είναι δυσμενείς για την καρπόδεση καθώς και στις καλλιέργειες των κηπευτικών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

BIOVIDA

Βιοδιεγέρτης - Υγρό λίπασμα, με βάση ελεύθερα Αμινοξέα φυτικής προέλευσης και ενζυματικής υδρόλυσης (με κυρίαρχο το αμινοξύ γλυκίνη), Αμινοσάκχαρα και Άζωτο προερχόμενο κυρίως από ουρία.

Ελευθέρα αμινοξέα: 6,1% β/β
Γλυκίνη: 5,6% β/β
GABA (γ-αμινοβουτυρικό οξύ): 0,5% β/β
Άζωτο (N) ολικό: 4,5% β/β
Άζωτο (N) ουρικό: 4,0% β/β
Άζωτο (N) οργανικό: 0,5% β/β

Το **BIOVIDA** είναι βιοδιεγέρτης, διάλυμα αμινοξέων φυτικής προέλευσης και ενζυματικής υδρόλυσης, με κυρίαρχο το αμινοξύ γλυκίνη, σε συνδυασμό με εξειδικευμένα αμινοσάκχαρα (μονομερή της χιτίνης) και άζωτο προερχόμενο κυρίως από ουρία, με καλή διασυστηματική απορρόφηση και ταχύτατη αφομοίωση από τα φυτά. Το προϊόν είναι ειδικά σχεδιασμένο για την προώθηση της συνολικής φυτικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης των καλλιεργειών, κυρίως κάτω από συνθήκες διαφόρων μορφών αβιοτικής καταπόνησης. Τα φυσικά μονομερή της χιτίνης που περιέχονται στο προϊόν δρουν γρηγορότερα, σε σχέση με τα αντίστοιχα πολυμερή ή/και τα ολιγομερή παράγωγα της χιτίνης, προκαλώντας έτσι την άμεση απόκριση των μηχανισμών άμυνας του φυτού έναντι του αβιοτικού στρες.

Η εφαρμογή του **BIOVIDA**:

•Ενισχύει την ευρωστία των φυτών και προάγει τη φυτική αύξηση και ανάπτυξη, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική απόδοση •Αυξάνει τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα και την περιεκτικότητα των φύλλων σε χλωροφύλλη •Διεγείρει τα ενζυματικά και μη-ενζυματικά αντιοξειδωτικά αμυντικά συστήματα των φυτών •Ενισχύει την αντοχή των φυτών έναντι αβιοτικών καταπονήσεων (ξηρασία, υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, αλατότητα, κ.ά. •Συμβάλλει στην καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος ή/και το φύλλωμα •Προάγει την ωφέλιμη, συμβιωτική σχέση φυτών-μικροοργανισμών στην περιοχή της ριζόσφαιρας και τη διατήρηση της ισορροπίας της μικροβιακής χλωρίδας του εδάφους •Βελτιώνει τη μετασυλλεκτική διάρκεια ζωής φρούτων και λαχανικών.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε όλες τις καλλιέργειες.

Δοσολογία:
Υδρολίπανση: Πρώτη εφαρμογή 2 ή 3 εβδομάδες μετά τη φύτευση. Επανάληψη της εφαρμογής όταν είναι απαραίτητο. Δόση: 200-300 cc/ στρέμμα.
Διαφυλλικά: Δόση: 100-200 cc/ 100 λίτρα νερού.

Υδροπονία: Δόση: 200 cc/ στρέμμα.

BoMo FORTE

BIO

► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

Υγρό λίπασμα Βορίου (B) - Μολυβδαινίου (Mo)

Βόριο (B): 11% β/β
Μολυβδαίνιο (Mo): 0,5% β/β

Το **BoMo FORTE** είναι υγρό, υψηλής συγκέντρωσης λίπασμα βορίου. Η εφαρμογή του συστήνεται ιδιαίτερα μετασυλλεκτικά και πριν την άνθηση, άλλα και αργότερα, στα στάδια της ανθοφορίας, της καρπόδεσης και της ανάπτυξης του καρπού. Ενεργοποιεί/ βελτιώνει την άνθηση και την καρπόδεση των φυτών. Το υψηλό επίπεδο του βορίου στη φόρμουλα του βελτιώνει την κυτταροδιαίρεση και το σχηματισμό του κυτταρικού τοιχώματος.

Προϊόν (εγγυημένη σύνθεση)	**Περιγραφή**

BoMo FORTE

BIO

► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

Υγρό λίπασμα Βορίου (Β) - Μολυβδαινίου (Mo)

Βόριο (Β): 11% β/β
Μολυβδαίνιο (Mo): 0,5% β/β

Το **Βόριο (Β)** εμπλέκεται σε πολλαπλές φυσιολογικές λειτουργίες του φυτού. Ευνοεί την άνθηση και την καρπόδεση, καθώς επηρεάζει το σχηματισμό και τη γονιμοποίηση των ανθέων και αυξάνει τη βιωσιμότητα της γύρης, επιδρά στο μεταβολισμό των υδατανθράκων και τη μεταφορά και αποθήκευση των σακχάρων προς τα αποθησαυριστικά όργανα, επιδρά θετικά στη διαδικασία της σύνθεσης νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή λειτουργιά της μεριστωματικής αύξησης του φυτού και την επιμήκυνση βλαστών και ριζών, έχει ευνοϊκή επίδραση στη φωτοσυνθετική δραστηριότητα των φυτών κ.ά. Το **Μολυβδαίνιο (Mo)** παίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό και την αφομοίωση του αζώτου (Ν) στα φυτά, καθώς είναι απαραίτητο συστατικό των ενζύμων νιτρική ρεδουκτάση και νιτρογενάση. Η νιτρική ρεδουκτάση καταλύει τη μετατροπή των νιτρικών (NO_3^-) σε νιτρώδη (NO_2^-) επηρεάζοντας θετικά την πρωτεϊνοσύνθεση, ενώ, η νιτρογενάση, είναι το βασικό ένζυμο για την αζωτοδέσμευση καθώς καταλύει τη δέσμευση του στοιχειακού αζώτου της ατμόσφαιρας και την αναγωγή του σε αμμωνία (NH_3) από τα συμβιωτικά βακτήρια των ψυχανθών.

Δοσολογία | Διαφυλλική εφαρμογή:

Καλλιέργεια	**Περίοδος εφαρμογής**	**Δόση** (κ.εκ./ στρέμμα/ εφαρμογή)
Οπωροφόρα	3-4 εφαρμογές: • Πριν την άνθηση • Στην πτώση των πετάλων • Κατά την περίοδο αύξησης των καρπών • Μετασυλλεκτικά	75 - 125
Ελιά	3 εφαρμογές: • Πριν την άνθηση • Στην πτώση των πετάλων • Κατά την περίοδο αύξησης των καρπών	75 - 125
Αμπέλι	2-3 εφαρμογές στο διάστημα από πριν την άνθηση έως την καρπόδεση.	75 - 125
Κηπευτικά/ Λαχανικά	3 εφαρμογές κατά τη διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης, με μεσοδιάστημα 10-14 ήμερες.	100 - 250
Ζαχαρότευτλα	2 εφαρμογές: Στο στάδιο των 8-10 φύλλων και επανάληψη μετά από 10-14 ημέρες.	300 - 400
Ελαιοκράμβη	2 εφαρμογές: Πριν το άνοιγμα των οφθαλμών και επανάληψη μετά από 7-10 ημέρες.	250 - 350
Ηλίανθος	1-2 εφαρμογές από το στάδιο των 5-6 φύλλων.	250 - 350

CalMag LIQUID

Υγρό λίπασμα Αζώτου (Ν) - Ασβεστίου (Ca) - Μαγνησίου (Mg). Υγρό διάλυμα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού μαγνησίου.

Άζωτο (Ν) ολικό: 7,8% β/β
Άζωτο, Νιτρικό ($N\text{-}NO_3$): 7,8% β/β
Ασβέστιο (CaO): 10% β/β
Μαγνήσιο (MgO): 4% β/β

Το **CalMag Liquid** είναι υγρό, υψηλής συγκέντρωσης λίπασμα Ασβεστίου και Μαγνησίου, προερχόμενο από νιτρικό μαγνήσιο και νιτρικό ασβέστιο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα και χλώριο. Η εφαρμογή του συστήνεται ιδιαίτερα στην περίοδο από την καρπόδεση έως πριν τη συγκομιδή. Το υψηλό επίπεδο ασβεστίου και μαγνησίου στη φόρμουλα του προϊόντος, βελτιώνει σημαντικά τη συνεκτικότητα και την αντοχή των κυτταρικών τοιχωμάτων και την παραγωγή χλωροφύλλης, αυξάνει μετασυλλεκτικά τη διατηρησιμότητα των φρούτων και λαχανικών, ενώ, ή παρουσία του αζώτου έχει θετική επίδραση στην πρόσληψη ασβεστίου και μαγνησίου από το φυτό.
Το **Ασβέστιο (Ca)** διαδραματίζει σημαντικό ρολό στη δομή, την περατότητα και την ομαλή λειτουργιά των μεμβρανών, ενώ, είναι απαραίτητο συστατικό για το σχηματισμό, τη σταθερότητα - ακεραιότητα και την ισχυροποίηση των κυτταρικών τοιχωμάτων, την ομαλή διαίρεση και επιμήκυνση των κυττάρων και τη μεριστωματική ανάπτυξη. Μειώνει τις φυσιολογικές ανωμαλίες των καρπών που οφείλονται σε διαταραχές τροφοδοσίας ασβεστίου (π.χ. «πικρή κηλίδωση» στα μήλα, «ξηρή κορυφή» στην τομάτα, «κάψιμο κορυφής» στο μαρούλι, κ.ά.) και αυξάνει μετασυλλεκτικά, τη διάρκεια ζωής των φρούτων και λαχανικών. Το Μαγνήσιο (Mg) αποτελεί βασικό συστατικό της χλωροφύλλης, διαδραματίζοντας πρωτεύοντα ρόλο στη λειτουργία της φωτοσύνθεσης, καθώς και βασικό συστατικό των ριβοσωμάτων, παίζοντας σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της πρωτεϊνοσύνθεσης. Συμβάλει, τέλος, στην ενεργοποίηση ενζύμων τα οποία σχετίζονται με το μεταβολισμό των υδατανθράκων, ενώ, αποτελεί συμπαράγοντα πολυάριθμων άλλων ενζυμων.

Δοσολογία:
Διαφυλλικά:
Αμπέλι, Ελιά, Εσπεριδοειδή, Οπωροφόρα: Συστήνονται 3-4 εφαρμογές με δόση 200-300 κ.εκ. / 100 λίτρα νερό, από την καρπόδεση έως την ωρίμανση του καρπού.
Κηπευτικά/ Λαχανικά: 200-300 κ.εκ. / 100 λίτρα νερό, από την καρπόδεση έως την ωρίμανση του καρπού.

Ριζοπότισμα:
Αμπέλι, Ελιά, Εσπεριδοειδή, Οπωροφόρα: Συνολικά 2-3 L / στρέμμα, κατά τη διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης και κατά τη διάρκεια γεμίσματος των καρπών.

Κηπευτικά/ Λαχανικά: Συνολικά 1-2 L / στρέμμα, από την καρπόδεση έως τη συγκομιδή, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες.

Προϊόν (εγγυημένη σύνθεση)	**Περιγραφή**

CUPRAZUFRE

BIO

Στερεό λίπασμα Θείου (S) - Χαλκού (Cu).

Στοιχειακό θείο (S): 98%
Τριοξείδιο του θείου (SO_3): 245%
Χαλκός (Cu): 2%

Στερεό λίπασμα Θείου (S) - Χαλκού (Cu), κατάλληλο για εφαρμογή σε όλες τις καλλιέργειες.

Δοσολογία:
2,5-3 Kg/ στρέμμα, ανάλογα την πυκνότητα φύτευσης.

FIXER

Υγρό διάλυμα Αζώτου (N) - Φωσφόρου (P) / Ρυθμιστής pH, με δείκτη αλλαγής χρώματος.

Άζωτο (N), από ουρία: 4% β/β
Φώσφορος (P_2O_5): 20% β/β

Το **FIXER** είναι υγρό διάλυμα Αζώτου (N) - Φωσφόρου (P), με ιδιότητες ρύθμισης του pH του ψεκαστικού διαλύματος. Εμπεριέχει δείκτη αλλαγής χρώματος.

Μειώνει το pH του νερού ενώ παράλληλα ενισχύει την αποτελεσματικότητα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των διαφυλλικών προϊόντων θρέψης. Επίσης, περιέχει επιφανειοδραστικές ουσίες που ενισχύουν την διεισδυτικότητα του σκευάσματος στο φύλλο.

Δοσολογία:
Κατά προσέγγιση: Για pH νερού 7,5 - 8.
Επιθυμητό pH ψεκαστικού νερού: 6 - 6,5: Δόση 25 κ.εκ./ 100lt νερό.
Επιθυμητό pH ψεκαστικού νερού: 5 - 5,5: Δόση 50 κ.εκ./ 100lt νερό.
Επιθυμητό pH ψεκαστικού νερού: <4,5: Δόση 75 κ.εκ./ 100lt νερό.

HUMIBOR

BIO

Υγρό διάλυμα λιπάσματος Βορίου (B).

Βόριο (B), υδατοδιαλυτό: 10% β/β

Σταθερό διάλυμα βασιζόμενο σε ένα μη ιονισμένο μοριακό σύμπλοκο βορίου-αλκυλαμίνης, ώστε το στοιχείο του βορίου να απορροφάται διασυστηματικά και να αποδεσμεύεται διαμέσου της ροής των φυτικών χυμών. Το σύμπλοκο βορίου προάγει τη μεταφορά σακχάρων στους νεαρούς βλαστούς.

Η εφαρμογή του προϊόντος, ευνοεί τη γονιμοποίηση και την καρπόδεση και προάγει τη βλάστηση μέσω της μεταφοράς θεμελιωδών μονάδων για τη βιοσύνθεση σακχάρων στους νεαρούς βλαστούς.

Δοσολογία: Εφαρμόζεται **διαφυλλικά** με δόση 200-300 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό (200-300 κ.εκ./ στρέμμα) ή με **υδρολίπανση**, με δόση 400-600 κ.εκ./ στρέμμα.

HUMICAL

Υγρό διάλυμα Νιτρικού Ασβεστίου.

Άζωτο (N), ολικό: 8% β/β
Άζωτο (N), νιτρικό ($N\text{-}NO_3$): 8% β/β
Ασβέστιο (CaO), υδατοδιαλυτό: 15% β/β
Παράγοντας συμπλοκοποίησης: Λιγνοσουλφονικό άλας.

Μερικώς συμπλοκοποιημένο διάλυμα νιτρικού ασβεστίου, με καλή διασυστηματική απορρόφηση μέσω της εφαρμογής του με ψεκασμό ή υδρολίπανση.

Εφαρμόζεται για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών ασβεστίου σε φύλλα και φυτικούς ιστούς. Η απορρόφησή του από το φύλλωμα ή τη ρίζα, επιτρέπει τη βελτίωση των επιπέδων ασβεστίου.

Δοσολογία: Εφαρμόζεται **διαφυλλικά** με δόση 300-400 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό (300-400 κ.εκ./ στρέμμα).

Καλλιέργειες: Αγγούρι, Μαρούλι (πρόληψη «καψίματος κορυφής»), Μηλιά (πρόληψη «πικρής στιγμάτωσης»), Μπρόκολο, Οπωροφόρα, Πιπεριά, Τομάτα (πρόληψη «ξηρής κορυφής»).

IRON FORTE EDDHA 6%

BIO

EDDHA χηλικό σύμπλοκο Σιδήρου (Fe).

Σίδηρος (Fe), ολικός: 6% β/β
Σίδηρος (Fe), διαλυτός στο νερό:6% β/β
Σίδηρος (Fe), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με [o,o]-EDDHA: 4.8% β/β

Το **IRON FORTE** είναι χηλικός σίδηρος, γρήγορης και πλήρους διαλυτότητας, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τροφοπενιών σιδήρου σε όλα τα στάδια της βλαστικής ανάπτυξης των φυτών, σε καλλιέργειες υπαίθρου, θερμοκηπίου καθώς και σε υδροπονικές καλλιέργειες.

Δοσολογία: Εφαρμόζεται με **υδρολίπανση** ή **έγχυση στο έδαφος**, σε δοσολογία 5-100 γραμ. ανά δένδρο ή 1,5-6 Kg/ στρ., ανάλογα το είδος και το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας (βλ. ετικέτα για περισσότερες πληροφορίες).

KELTERRA L

BIO

Υγρό διάλυμα λιπάσματος Σιδήρου (Fe).

Σίδηρος (Fe), υδατοδιαλυτός: 4% β/β

Σταθερό διάλυμα με βάση το Σίδηρο (Fe), μερικώς συμπλοκοποιημένο με φυτική ύλη, με καλή διασυστηματική απορρόφηση μέσω της εφαρμογής του με ψεκασμό ή υδρολίπανση.

Εφαρμόζεται για την πρόληψη και θεραπεία της χλώρωσης των φύλλων η οποία εμφανίζεται λόγω τροφοπενίας σιδήρου, ως αποτέλεσμα της έλλειψης ή δέσμευσης του σιδήρου στο έδαφος. Η εφαρμογή του είναι χρήσιμη για κάθε απαιτητική σε σίδηρο καλλιέργεια.

Δοσολογία: Εφαρμόζεται **διαφυλλικά** με δόση 200-300 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό (200-300 κ.εκ./ στρέμμα) ή με **υδρολίπανση** με δόση 400-600 κ.εκ./ στρέμμα.

Προϊόν (εγγυημένη σύνθεση)	**Περιγραφή**

K-VITRUM®

BIO

Βιοδιεγέρτης - Ανόργανο λίπασμα με Πυρίτιο (Si) και Κάλιο (K)

Πυρίτιο (SiO_2), υδατοδιαλυτό: 23% β/β
Κάλιο (K_2O), υδατοδιαλυτό: 10,5% β/β

Το **K-VITRUM®** είναι βιοδιεγέρτης - ανόργανο λίπασμα, με Πυρίτιο (Si) και Κάλιο (K) σε υγρή μορφή.

Το πυρίτιο (Si) έχει μια σειρά θετικών, βιοδιεγερτικών επιδράσεων στην αύξηση και ανάπτυξη των φυτών. Οι επιδράσεις αυτές περιλαμβάνουν την αύξηση της ανθεκτικότητας των φυτών έναντι αβιοτικών καταπονήσεων, όπως αλατότητα, ξηρασία, αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες (χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες), τοξικότητα βαρέων μετάλλων, μηχανική καταπόνηση και υπεριώδης ακτινοβολία, παρέχοντας ωσμωτική και αντιοξειδωτική προστασία των κυττάρων. Επιπλέον, προσδίδει δομική σταθερότητα στα κυτταρικά τοιχώματα και μηχανική αντοχή στους φυτικούς ιστούς.

Η εφαρμογή του **K-VITRUM®** βοηθάει τα φυτά να ανταπεξέλθουν συνθήκες αβιοτικού στρες, όπως αλατότητα, ακραίες θερμοκρασίες, τοξικότητες βαρέων μετάλλων, προσδίδει αντοχή στο πλάγιασμα (π.χ. σιτηρά), αυξάνει τη αποτελεσματικότητα της χρήσης νερού και θρεπτικών στοιχείων (φωσφόρου, καλίου, κτλ.), βελτιώνει τη φωτοσυνθετική ικανότητα των φυτών, καθυστερεί τις διαδικασίες της γήρανσης, βελτιώνει την συνολική ποιότητα των καρπών και αυξάνει τη συντηρησιμότητα και την ανθεκτικότητά τους στους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς, οδηγώντας έτσι στη συνολική αύξηση της ποσότητας και ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Η εφαρμογή του **K-VITRUM®** συνιστάται ιδιαίτερα σε καλλιέργειες όπως τα σιτηρά (σιτάρι, αραβόσιτος, ρύζι, κ.ά.), αμπέλι, οπωροφόρα, εσπεριδοειδή, φράουλα και κηπευτικά (αγγούρι, τομάτα, πατάτα, κ.ά.).

Δοσολογία: Εφαρμόζεται **διαφυλλικά** με δόση 300-500 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό (300-500 κ.εκ./ στρέμμα).

MAS-RAIZ+

Βιοδιεγέρτης - Ειδικό σκεύασμα, προϊόν βοηθητικό της ανάπτυξης και της θρέψης των φυτών.

Υδατικό διάλυμα με σακχαρίτες και αμινοξέα, φυτικής προέλευσης, που διεγείρουν την ανάπτυξη και τη θρέψη των φυτών.

Ξηρά ουσία: 51,4% β/β
Διαλυτά σάκχαρα: 13% β/β
Γλουταμικό οξύ: 1,3% β/β
γ-αμινοβουτυρικό οξύ (GABA): 1,1% β/β

Περιέχει σε μικρές ποσότητες: Μαγγάνιο, Ψευδάργυρο, Σίδηρο, Βόριο και Μολυβδαίνιο.

Το **MAS RAIZ+** είναι ειδικό σκεύασμα βοηθητικό της ανάπτυξης και της θρέψης των φυτών. Περιέχει σακχαρίτες και αμινοξέα, φυτικής προέλευσης, που διεγείρουν τη θρέψη και την ανάπτυξη των φυτών. Το **MAS RAIZ+** συμβάλει στην ανάπτυξη και την ευρωστία του ριζικού συστήματος, προωθεί τη βλάστηση των σπόρων και επιταχύνει το φύτρωμα και την ανάπτυξη των φυταρίων, ενισχύοντας την πρωίμιση της παραγωγής.

Δοσολογία/ Τρόπος εφαρμογής:

Το **MAS RAIZ+** εφαρμόζεται:
Α. Με **ψεκασμούς φυλλώματος** σε καλλιέργειες **λαχανικών** (καρποφόρα και φυλλώδη), **σιτηρών**, **ψυχανθών** και **ελαιοκράμβης**.

- **Καλλιέργειες λαχανικών:** Εφαρμόζεται με δόση 150 κ.εκ./ στρ. Στα καρποφόρα λαχανικά εφαρμόζεται στο στάδιο της βλάστησης, από το 4ο φύλλο μέχρι την αρχή της άνθησης. Στα φυλλώδη λαχανικά εφαρμόζεται από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης του 4ου φύλλου μέχρι την ανάπτυξη του 20% του συνολικού φυλλώματος (χαρακτηριστικό του εκάστοτε είδους/ ποικιλίας).
- **Σιτηρά*, ψυχανθή, ελαιοκράμβη:** Εφαρμόζεται με δόση 120 κ.εκ./ στρ., από το 4ο πραγματικό φύλλο μέχρι την αρχή του αδελφώματος.

Το **MAS RAIZ+ ενισχύει το αδέλφωμα των σιτηρών.*

Αριθμός εφαρμογών/ μεσοδιάστημα εφαρμογών: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-15 ημέρες.

Β. Με **εφαρμογή σε σπόρους σόγιας**, **αραβοσίτου**, **σιτηρών** (για την παραγωγή ζωοτροφών), **ελαιοκράμβης** και **καρποφόρων λαχανικών**. Εφαρμόζεται αδιάλυτο, με ομοιόμορφο ανακάτεμα με το σπόρο πριν τη σπορά.

- Για **σπόρους σόγιας** και **αραβοσίτου:** 600 κ.εκ./ 100 Kg σπόρου.

Για **σπόρους σιτηρών** (για την παραγωγή ζωοτροφών), **ελαιοκράμβης** και **καρποφόρων λαχανικών**: 800 κ.εκ./ 100 Kg σπόρου.

NEKAMIL STAR

Υγρό, ανόργανο λίπασμα Καλίου (K) - Θείου (S).

Κάλιο (K_2O), υδατοδιαλυτό: 25% β/β
Θείο (SO_3), υδατοδιαλυτό: 41% β/β

Ανόργανο λίπασμα Καλίου (K_2O) με δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά (Θείο, SO_3).

Συμπυκνωμένο διάλυμα καλίου παρουσία θείου, με διασυστηματική απορρόφησή και γρήγορη αφομοίωση από τα φυτά.

Χάρις στη διασυστηματική απορρόφησή του, το **NEKAMIL STAR** μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ψεκασμό είτε με υδρολίπανση σε οποιαδήποτε καλλιέργεια, με σκοπό την αύξηση της βιοσύνθεσης σακχάρων και χρωστικών. Η εφαρμογή του **NEKAMIL STAR** συνιστάται ιδιαίτερα στο οινοποιήσιμο αμπέλι, τα οπωροφόρα, τα εσπεριδοειδή και τα κηπευτικά, όπου ο χρωματισμός και η συγκέντρωση σακχάρων παίζουν καθαριστικό ρόλο στην ποιότητα, χωρίς την παράλληλη απώλεια οξύτητας.

Δοσολογία:
Διαφυλλική εφαρμογή: Δόση 150-300 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό (150-300 κ.εκ./ στρέμμα).
Υδρολίπανση: Δόση 400-600 κ.εκ./ στρέμμα.

Προϊόν (εγγυημένη σύνθεση)	**Περιγραφή**

NUTRIMAN N-24

BIO

Διάλυμα ελεύθερων Αμινοξέων φυτικής προέλευσης και ενζυματικής υδρόλυσης.

Ελεύθερα αμινοξέα: 24% β/β
Άζωτο (N) ολικό: 2,4% β/β
Άζωτο (N) οργανικό: 2,4% β/β
Συνολική οργανική ουσία: 20% β/β
***Αμινόγραμμα**: Γλουταμικό οξύ (Glu): 15,7% | Γλυκίνη (Gly): 8,1% | Τρυπτοφάνη (Trp): 0,1%.*

Διάλυμα αμινοξέων.

Περιέχει **ελεύθερα αμινοξέα** βιολογικής σύνθεσης που παράγονται μέσω **ενζυματικής υδρόλυσης**.

Το **NUTRIMAN N-24** εφαρμόζεται σε περιόδους αυξημένων αναγκών των φυτών σε θρεπτικά συστατικά ή/και σε συνθήκες αυξημένης αβιοτικής καταπόνησης (στρες) των φυτών, από το στάδιο της μεταφύτευσης έως την άνθηση και την καρπόδεση, με σκοπό την καλύτερη φυτική αύξηση και ανάπτυξη. Η εφαρμογή του **NUTRIMAN N-24**, προάγει την πρωτεϊνοσύνθεση και την ανάπτυξη φυτικής μάζας, ενώ, παράλληλα βοηθάει τα φυτά να ανταπεξελθόν ακραίες συνθήκες αβιοτικού στρες.

Κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες.

Δοσολογία: Εφαρμόζεται **διαφυλλικά** με δόση 100-200 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό (100-200 κ.εκ./ στρέμμα) ή με **υδρολίπανση**, με δόση 200-300 κ.εκ./ στρέμμα.

OLIVO PLUS

Βιοδιεγέρτης - Υγρό Λίπασμα.

Με βάση εκχύλισμα φυκιών *Ascophyllum nodosum* και θρεπτικά μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία.

Προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για την καλλιέργεια της ελιάς.

Αλγινικό οξύ (από εκχύλισμα *A. nodosum*): 1% β/β
Μαννιτόλη (από εκχύλισμα *A. nodosum*): 0,35% β/β
Άζωτο (N) ολικό (από Ουρία): 5% β/β
Μαγνήσιο (MgO) υδατοδιαλυτό: 1,5% β/β
Θείο (SO_3) υδατοδιαλυτό: 3,5% β/β
Βόριο (B) υδατοδιαλυτό: 1,2% β/β
Μαγγάνιο (Mn) υδατοδιαλυτό: 1% β/β
Μολυβδαίνιο (Mo) υδατοδιαλυτό: 0,1% β/β
Ψευδάργυρος (Zn) υδατοδιαλυτός: 0,5% β/β

Το **OLIVO PLUS** είναι **Βιοδιεγέρτης - Υγρό λίπασμα** με βάση εκχύλισμα φυκιών του *Ascophyllum nodosum*, Αλγινικό οξύ και Μαννιτόλη, σε συνδυασμό με Άζωτο, προερχόμενο από ουρία, Μαγνήσιο (MgO), Θείο (SO_3) και Θρεπτικά Ιχνοστοιχεία (B, Mn, Mo, Zn), **ειδικά σχεδιασμένο καλλιέργεια της ελιάς.**

Η ειδική φόρμουλά του συνδυάζει τη βιοδιεγερτική δράση των εκχυλισμάτων φυκιών με απαραίτητα για την ισορροπημένη θρέψη της ελιάς, θρεπτικά μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία, ώστε το προϊόν να λειτουργεί ως φυσικός ενεργοποιητής που βοηθάει την καλλιέργεια να αντιμετωπίζει καταστάσεις υψηλού εσωτερικού και εξωτερικού στρες και να βελτιώνει βασικές φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, όπως η φωτοσύνθεση, η άνθηση και η καρπόδεση, συνεισφέροντας έτσι στην καλύτερη αύξηση και ανάπτυξη της καλλιέργειας, στη διατήρηση της ευρωστίας και τη βελτίωση της παραγωγικότητας των δένδρων. Το εκχύλισμα φυκιών του *A. nodosum* έχει σημαντική βιοδιεγερτική δράση στα φυτά, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε φυσικές ουσίες, υψηλής βιολογικής αξίας για τα φυτά, όπως φυτορμόνες (φυσικές κυτοκινίνες), αλγινικό οξύ, μαννιτόλη, πολυσακχαρίτες, βεταΐνες, πολυαμίνες, φαινολικές ενώσεις, αμινοξέα, βιταμίνες, κ.ά.

Με το **OLIVO PLUS:**

- Αυξάνεται η ανθεκτικότητα των ελαιόδενδρων σε παράγοντες εσωτερικού και εξωτερικού στρες.
- Επιτυγχάνεται ισορροπημένη θρέψη των ελαιόδενδρων, με αποτέλεσμα την παραγωγή καλύτερης ποιότητας ελαιολάδου.
- Διεγείρεται η ανάπτυξη των ανθέων και παράγεται καλύτερης ποιότητας γύρη.
- Αυξάνεται η παραγόμενη ποσότητα ελαιοκάρπου, λόγω βελτίωσης της ανθοφορίας και της καρπόδεσης.
- Επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα παραγωγής όσον αφορά το μέγεθος, την ομοιομορφία της ωρίμανσης και τη διατηρησιμότητα του καρπού.
- Διευκολύνεται η αναγέννηση των κατεστραμμένων ιστών.
- Ενεργοποιείται και βελτιώνεται η ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των ελαιόδενδρων.
- Βελτιώνεται η συνολική ποιότητα και ποσότητα της παραγωγής.

Δοσολογία: Διαφυλλική εφαρμογή με δόση 200-250 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό.

Εάν απαιτείται, η εφαρμογή επαναλαμβάνεται.

QUALIFUN®

Υγρό διάλυμα Αζώτου (N) - Θείου (S):

4,5-0-0 + 28% SO_3

Άζωτο (N), ολικό: 4,5% β/β
Θείο (SO_3), υδατοδιαλυτό: 28% β/β

Το **QUALIFUN** ® εκλύει ανιόντα υδρόθειου (ομάδα θειολών ως S(II)). Η ομάδα των θειολών υποβάλλεται σε μεγάλης πυκνότητας αρνητική φόρτιση, η οποία την κάνει να κινείται σε αναζήτηση θετικού φορτίου εντός του φυτικού χυμού, εξασφαλίζοντας έτσι διασυστηματική απορρόφηση. Η παρουσία S(II) εντός του φυτού, προάγει τη βιοσύνθεση της L-κυστεΐνης, συνεχίζοντας έτσι τον κύκλο της πρωτεϊνοσύνθεσης.

Η παρουσία S(II), η βιοσύνθεση της L-κυστεΐνης και η ταχεία προαγωγή της πρωτεϊνοσύνθεσης, δίνουν τη δυνατότητα της αύξησης πάχους του ιστού προφυλάσσοντας έτσι το φυτό από αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες (συνθήκες αβιοτικού στρες). Η εφαρμογή του προϊόντος συστήνεται ιδιαίτερα στο αμπέλι, τα κηπευτικά (ιδιαίτερα στα κολοκυνθοειδή), τα οπωροφόρα δέντρα, τα δημητριακά, τα κονδυλώδη, τα σταυρανθή και τα φυλλώδη λαχανικά.

Δοσολογία: Εφαρμόζεται **διαφυλλικά** σε δοσολογία 150-250 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό (150-250 κ.εκ./ στρέμμα), ή στο έδαφος, **μέσω του συστήματος άρδευσης**, σε δοσολογία 200-300 κ.εκ./ στρέμμα.

Στα **κηπευτικά**, εφαρμόζεται μέσω στάγδην άρδευσης (**υδρολίπανση**), σε δοσολογία 200-300 κ.εκ./ στρέμμα.

Συστήνονται δύο εφαρμογές με ελάχιστο μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών 15-21 ημέρες, σύμφωνα με τις θρεπτικές ανάγκες των φυτών.

Προϊόν (εγγυημένη σύνθεση)	**Περιγραφή**

SERGOMAX® L90 ECO

BIO

Υγρό διάλυμα θρεπτικών ιχνοστοιχείων (Cu, Mn, Zn).

Χαλκός (Cu), υδατοδιαλυτός: 1,8% β/β
Μαγγάνιο (Mn), υδατοδιαλυτό: 0,8% β/β
Ψευδάργυρος (Zn), υδατοδιαλυτός: 0,5% β/β

Υγρό διάλυμα θρεπτικών ιχνοστοιχείων Χαλκού (Cu), Μαγγανίου (Μη) και Ψευδαργύρου (Zn).

Δοσολογία: Στα κηπευτικά, οπωροφόρα και εσπεριδοειδή, εφαρμόζεται **διαφυλλικά** με δόση 200-300 κ.εκ./ 100 λίτρα νερού (200-300 κ.εκ./ στρέμμα) ή με **υδρολίπανση**, με δόση 400-600 κ.εκ./ στρέμμα.

Στην ελιά, επιτυγχάνονται καλά αποτελέσματα έναντι αντίξοων κλιματολογικών συνθηκών, όταν το προϊόν εφαρμόζεται το φθινόπωρο (πλησίον της έναρξης της ωρίμανσης), μετά τη συγκομιδή και την άνοιξη, με δόση 400 κ.εκ./ στρέμμα.

Στο αμπέλι, συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος μετά τη συγκομιδή, το κλάδεμα και την καρπόδεση, **διαφυλλικά** με δόση 250-500 κ.εκ./ 100 λίτρα νερού (250-500 κ.εκ./ στρέμμα) ή με **υδρολίπανση**, με δόση 400-600 κ.εκ./ στρέμμα.

SERGOMIL® ECO

BIO

Συμπλοκοποιημένο διάλυμα Χαλκού (Cu).

Χαλκός (Cu), υδατοδιαλυτός: 5,5% β/β

Σταθερό μοριακό σύμπλεγμα υπό την μορφή λιγνοσουλφονικού χαλκού, με διασυστηματική δράση και απορρόφηση από τις ρίζες και τα φύλλα.

Χρησιμοποιείται για την παροχή χαλκού με σκοπό την πρόληψη και διόρθωση τροφοπενιών χαλκού καθώς και την πρόληψη διαφόρων φυσιολογικών ανωμαλιών που οφείλονται στην έλλειψη χαλκού. Το **SERGOMIL® ECO** παρέχει προστασία από αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως διασφαλισθεί η μη ευαισθησία της καλλιέργειας σε χαλκούχα προϊόντα, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση φυτοτοξικότητας.

Δοσολογία: Διαφυλλική εφαρμογή: 150-300 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό (150-300 κ.εκ./ στρέμμα). Οι εφαρμογές συστήνεται να γίνονται με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 15 ημερών.
Εφαρμογή με **υδρολίπανση**: 200-300 κ.εκ./ στρέμμα για όλες τις καλλιέργειες, κάθε 10-15 ημέρες.

Για τις καλλιέργειες που είναι ευαίσθητες στο χαλκό (πυρηνόκαρπα, μερικές ποικιλίες αμπέλου, λαχανικά υπό ορισμένες προϋποθέσεις), προτείνεται η εφαρμογή του προϊόντος μόνο μέσω άρδευσης.

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε καταστάσεις στρες των φυτών (ξηρασία, ασφυξία ριζών, υπερβολικό κρύο, υγρασία, υψηλές θερμοκρασίες, κλπ.). Εφαρμόστε το προϊόν κατά προτίμηση νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, αποφεύγοντας την περίοδο της ημέρας με υψηλές θερμοκρασίες.

SERVAFORT®

Υγρό διάλυμα λιπάσματος NPK με δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά (Θείο).

Άζωτο (N), ολικό: 8% β/β
Φώσφορος (P_2O_5), υδατοδιαλυτός: 3% β/β
Κάλιο (K_2O), υδατοδιαλυτό: 4% β/β
Θείο (SO_3), υδατοδιαλυτό: 44% β/β

Το **SERVAFORT®** είναι σταθερό διάλυμα αμμωνιακού αζώτου, καλίου και φωσφόρου, στο οποίο εμπεριέχεται σημαντική ποσότητα μη στοιχειακού θείου σε μοριακή μορφή, παρουσιάζοντας έτσι διασυστηματική απορρόφηση από το φυτό.

Εφαρμόζεται για την παροχή των παραπάνω θρεπτικών συστατικών στο φυτό και τη διέγερση των μεταβολικών διεργασιών, συμβάλλοντας έτσι στη γενική ευρωστία και τη βελτίωση της παραγωγικότητας των φυτών. Η εφαρμογή του προϊόντος συνιστάται κυρίως σε καλλιέργειες αμπέλου, κηπευτικών, φράουλας, μαρουλιού, ρυζιού, εσπεριδοειδών και τεύτλων.

Δοσολογία: Εφαρμόζεται **διαφυλλικά** με δόση 250-350 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό (200-300 κ.εκ./ στρέμμα).

SERVANITRO STAR®

BIO

Στερεό μείγμα ελεύθερων Αμινοξέων μικροβιακής ζύμωσης και ενζυματικής υδρόλυσης

Ελεύθερα αμινοξέα: 82% β/β
Άζωτο (N) ολικό: 12% β/β
Άζωτο (N) οργανικό: 12% β/β

***Αμινόγραμμα**: Γλουταμικό οξύ (Glu): 43% | Γλυκίνη (Gly): 39%.*

Το Γλουταμικό οξύ λαμβάνεται από μικροβιακή ζύμωση (Corynebacterium glutamicum), ενώ η Γλυκίνη λαμβάνεται από ενζυματική υδρόλυση φυτικών υλικών (non-GMO).

Το **SERVANITRO STAR®** είναι ένα προϊόν με βάση αμινοξέα βιολογικής προέλευσης, το οποίο παράγεται αποκλειστικά από φυσικές πρώτες ύλες. Τα αμινοξέα που περιέχονται στη φόρμουλά του παράγονται με τη χρήση ήπιων βιολογικών μεθόδων, χωρίς τη μεσολάβηση χημικής υδρόλυσης. Η υψηλή περιεκτικότητά του σε οργανικό άζωτο, το καθιστά μια σημαντική πηγή αζώτου βραδείας αποδέσμευσης για τα φυτά, περιορίζοντας έτσι τις απώλειες αζώτου λόγω έκπλυσης.

Λόγω της υψηλής του περιεκτικότητας σε αμινοξέα βιολογικής προέλευσης, το **SERVANITRO STAR®** παρουσιάζει βιοδιεγερτική δράση, διεγείροντας τις διαδικασίες θρέψης, τη φυτική αύξηση και την ανάπτυξη φυτικής μάζας, ενώ, παράλληλα, αυξάνει την αντοχή των φυτών σε διάφορες μορφές αβιοτικού στρες.

Η εφαρμογή του προϊόντος συνιστάται ιδιαιτέρα κατά τα αρχικά στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας, κατά το στάδιο της άνθησης και της ανάπτυξης των καρπών και γενικότερα, όταν ο κίνδυνος αβιοτικής καταπόνησης των φυτών είναι αυξημένος (π.χ. αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες).

Δοσολογία:

Διαφυλλική εφαρμογή: 100-300 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό (100-300 κ.εκ./ στρέμμα).

Υδρολίπανση: 200-400 κ.εκ./ στρέμμα.

Προϊόν (εγγυημένη σύνθεση)	**Περιγραφή**

SERVIMEC 5-10-43 + 1%MgO + 0,2%B + Micros

Λίπασμα NPK με Μαγνήσιο (Mg) και θρεπτικά ιχνοστοιχεία (B, Cu, Fe, Mn, Zn).

Άζωτο (N), ολικό: 5% β/β
Άζωτο (N), νιτρικό: 5% β/β
Φώσφορος (P_2O_5), υδατοδιαλυτός: 10% β/β
Κάλιο (K_2O), υδατοδιαλυτό: 43% β/β
Μαγνήσιο (MgO), υδατοδιαλυτό: 1% β/β
Βόριο (B), υδατοδιαλυτό: 0,2% β/β
Χαλκός (Cu)*, υδατοδιαλυτός: 0,002% β/β
Σίδηρος (Fe)*, υδατοδιαλυτός: 0,04% β/β
Μαγγάνιο (Mn)*, υδατοδιαλυτό: 0,03% β/β
Ψευδάργυρος (Zn)*, υδατοδιαλυτός: 0,03% β/β
** Σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA.*

Το **SERVIMEC 5-10-43** είναι διαφυλλικό λίπασμα υψηλής διαλυτότητας, με υψηλή συγκέντρωση καλίου και εμπλουτισμένο με βόριο, μαγνήσιο και θρεπτικά ιχνοστοιχεία. Η εφαρμογή του συνιστάται ειδικά για την αντιμετώπιση της έλλειψης απαραιτήτων για τη φυτική αύξηση και ανάπτυξη θρεπτικών στοιχείων.

Μπορεί να εφαρμοστεί καθ' όλα τα βλαστικά στάδια κατά τη διάρκεια του κύκλου της καλλιέργειας, ωστόσο, συστήνεται ιδιαίτερα για την ενίσχυση της ανάπτυξης καθώς και τη διέγερση και υποβοήθηση της καρπόδεσης και της ωρίμανσης του καρπού, με σκοπό τη συνολική αύξηση των αποδόσεων.

Δοσολογία:
Διαφυλλική εφαρμογή: 200-300 γραμ./ 100 κιλά νερό.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε όλους τους τύπους καλλιεργειών, προσαρμόζοντας τη δόση ανάλογα τις θρεπτικές ανάγκες των φυτών.

SIDEFUN®

Βιοδιεγέρτης - Ειδικό σκεύασμα, προϊόν βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών

Υδατικό διάλυμα ακόρεστων οργανικών οξέων, υπό μορφή άλατος καλίου.

Ξηρά ουσία: 26% β/β
Ακόρεστα οργανικά οξέα: 19% β/β

Το **SIDEFUN®** είναι υδατικό διάλυμα ακόρεστων οργανικών οξέων σε μορφή άλατος καλίου. Είναι κατάλληλο για χρήση σε Οπωροφόρα (μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, κ.τ.λ.), Φυλλώδη λαχανικά (μαρούλι, σπανάκι, αντίδι, σέσκουλο, κ.τ.λ.), Κηπευτικά (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, καρπούζι, κολοκύθι, πεπόνι κ.τ.λ.), Φράουλα, Αμπέλι.

Το **SIDEFUN®** βελτιώνει την ποιότητα των καρπών, καθώς:
- Αυξάνει την περιεκτικότητα σακχάρων (βαθμός Brix),
- Βελτιώνει τη συνεκτικότητα της σάρκας των καρπών,
- Βελτιώνει το χρώμα και το μέγεθος καρπών,
- Προάγει την πρωίμηση.

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του **SIDEFUN®** είναι σημαντικά σε όλες τις καλλιέργειες. Ιδιαίτερα στη **φράουλα**:
- Προσδίδει ανθεκτικότητα στους καρπούς κατά τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς,
- Μειώνει την απώλεια βάρους των καρπών,
- Αυξάνει τη συνεκτικότητα της σάρκας των καρπών,
- Αυξάνει τη διάρκεια ζωής των καρπών στο ράφι (shelf-life).

Το **SIDEFUN®** ενισχύει, επίσης, την ανάπτυξη της φυλλικής επιφάνειας και τη συνολική βιομάζα των φυτών και αυξάνει την περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη. Η χρήση του **SIDEFUN®** βελτιώνει την απορρόφηση των προϊόντων θρέψης-λίπανσης, αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητά τους. Γενικότερα, η εφαρμογή του **SIDEFUN®** αυξάνει την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής.

Δοσολογία/ Χρόνος εφαρμογής:
Εφαρμόζεται **διαφυλλικά**, με δόση 300 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό (300 κ.εκ./ στρέμμα).

Καλλιέργειες/ Χρόνος εφαρμογής:
Αμπέλι: Από την πτώση των πετάλων μέχρι την ωρίμανση των καρπών.
Πυρηνόκαρπα, Μηλοειδή: Από την πτώση των πετάλων μέχρι την ωρίμανση των καρπών.
Κηπευτικά (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, καρπούζι, πεπόνι κ.τ.λ.): Από την πτώση των πετάλων μέχρι την ωρίμανση των καρπών.
Κολοκυθάκι: 1η εφαρμογή από το 5ο φύλλο της καλλιέργειας. 2η εφαρμογή μετά από 7-15 ημέρες.
Φυλλώδη λαχανικά (μαρούλι, **σπανάκι**, αντίδι, σέσκουλο, κ.τ.λ.): Καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου καλλιέργειας.
Φράουλα: 1η εφαρμογή στην αρχή της άνθησης. 2η εφαρμογή όταν οι καρποί αποκτήσουν το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας.

Αριθμός εφαρμογών:
Συστήνονται τουλάχιστον δύο εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-15 ημέρες.

SUPERB UREA

► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

Υγρό λίπασμα Ουρίας, Θείου (S), Βορίου (B) και Μολυβδαινίου (Mo), με χαμηλό ποσοστό διουρίας.

15 N + 15 S *(37,5 SO_3)* + 0,5 B + 0,1 Mo

Άζωτο ολικό (N): 15% β/β
Άζωτο ουρικό (N-NH_2): 15% β/β*
Στοιχειακό θείο (S): 15% β/β
Τριοξείδιο του θείου (SO_3): 37,5% β/β
Βόριο (B): 0,5% β/β
Μολυβδαίνιο (Mo): 0,1% β/β
**Διουρία ≤ 0,25%.*

Υγρό λίπασμα ουρίας, θείου, βορίου και μολυβδαινίου, με χαμηλό ποσοστό διουρίας*, κατάλληλο τόσο για διαφυλλικές εφαρμογές όσο και για ριζοπότισμα. Λόγω της υψηλής του περιεκτικότητας σε άζωτο, το **SUPERB UREA** συστήνεται να χρησιμοποιείται σε όλες τις περιόδους υψηλού ρυθμού ανάπτυξης του φυτού. Το **SUPERB UREA** περιέχει άζωτο σε ταχύτατα αφομοιώσιμη, ασφαλή και αποτελεσματική μορφή, για χρήση είτε διαφυλλικά είτε με ριζοπότισμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
- ✓ Υψηλή περιεκτικότητα σε κύρια θρεπτικά συστατικά (ουρικό άζωτο και στοιχειακό θείο), προάγοντας έτσι μεγαλύτερη ανάπτυξη και αύξηση των φυτών και των καρπών.
- ✓ Συνεργιστική δράση αζώτου και θείου: Βελτίωση της αφομοίωσης του παρεχόμενου αζώτου, αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης αζώτου.
- ✓ Μείωση των απωλειών αζώτου λόγω εξαέρωσης, επιτυγχάνοντας έτσι τη μείωση της εφαρμοζόμενης δόσης αζώτου.
- ✓ Υψηλής ποιότητας άζωτο, χάρις στο ουρικό άζωτο.

Προϊόν (εγγυημένη σύνθεση)	**Περιγραφή**

SUPERB UREA

► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

Υγρό λίπασμα Ουρίας, Θείου (S), Βορίου (B) και Μολυβδαινίου (Mo), με χαμηλό ποσοστό διουρίας.

15 N + 15 S *(37,5 SO_3)* + 0,5 B + 0,1 Mo

Άζωτο ολικό (N): 15% β/β
Άζωτο ουρικό (N-NH_2): 15% β/β*
Στοιχειακό θείο (S): 15% β/β
Τριοξείδιο του θείου (SO_3): 37,5% β/β
Βόριο (B): 0,5% β/β
Μολυβδαίνιο (Mo): 0,1% β/β
**Διουρία ≤ 0,25%.*

- ✓ Χαμηλότερο κόστος ανά στρέμμα σε σύγκριση με προϊόντα που περιέχουν μη αμμωνιακό άζωτο και θειικά άλατα.
- ✓ Ο ιδανικός συνδυασμός αζώτου, θείου, βορίου και μολυβδαινίου (N+S+B+Mo) το καθιστά ιδανικό τόσο για προανθικές όσο και μετασυλλεκτικές (π.χ. οπωροφόρα δένδρα) εφαρμογές.
- ✓ Η υψηλή του περιεκτικότητας σε θείο (37,5% SO_3) το καθιστά ιδανικό για την αύξηση της περιεκτικότητα σε λάδι σε ελαιοδοτικά φυτά (ηλίανθος, ελαιοκράμβη κ.λπ.) και την αύξηση της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη στα σιτηρά.
- ✓ Όταν εφαρμόζεται με ριζοπότισμα, δρα ρυθμιστικά στο pH του εδάφους.

Δοσολογία:

Ριζοπότισμα:
- Ελιά: 750-1.000 κ.εκ./ στρέμμα.
- Εσπεριδοειδή, Οπωροφόρα: 350-500 κ.εκ./ στρέμμα.
- Κηπευτικά-Λαχανικά: 250-400 κ.εκ./ στρέμμα.
- Σιτηρά (αραβόσιτος, σιτάρι, κριθάρι, ρύζι, κ.ά.): 400-600 κ.εκ/ στρέμμα.
- Βιομηχανικά Φυτά/ Ελαιοδοτικά φυτά (βάμβακι, ελαιοκράμβη, ηλίανθος, τεύτλα, κ.ά.): 400-600 κ.εκ./ στρέμμα.
- Γκαζόν: 175-325 κ.εκ./ στρέμμα.

Υδρολίπανση:
0,25-3 κ.εκ./ L (ανάλογα το στάδιο)

Διαφυλλικά:

250-500 κ.εκ./ στρέμμα.

TANISER®

Βιοδιεγέρτης - Ειδικό σκεύασμα, προϊόν βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών.

Φυσικό εκχύλισμα τανινών φυτικής προέλευσης με ακόρεστα οργανικά οξέα, υπό μορφή άλατος καλίου.

Ξηρά ουσία: 33% β/β
Ακόρεστα οργανικά οξέα: 6% β/β
Συμπυκνωμένες τανίνες (κατεχίνες): 3% β/β
Κάλιο (K_2O): 2,4% β/β

Το **TANISER®** περιέχει τανίνες (πολυφαινόλες φυτικής προέλευσης) και ακόρεστα οργανικά οξέα που προάγουν την αύξηση και ανάπτυξη των φυτών και παρέχουν προστασία από ακραίες συνθήκες του περιβάλλοντος. Διεγείρει τη φυτική ανάπτυξη και βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων καρπών, αυξάνοντας το τελικό τους μέγεθος και τη συνεκτικότητα. Η ενίσχυση της συνεκτικότητας των καρπών αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα σε αρκετές καλλιέργειες (π.χ. φράουλα), καθώς ενισχύει την αντοχή τους κατά τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς και αυξάνει τη διάρκεια ζωής στο ράφι (shelf-life). Το **TANISER®**, τέλος, αυξάνει την αντοχή των φυτών σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες (συνθήκες αβιοτικού στρες).

Δοσολογία/ Χρόνος εφαρμογής:
Εφαρμόζεται **διαφυλλικά**, με δόση 250-300 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό (250-300 κ.εκ./ στρέμμα).

Καλλιέργειες/ Χρόνος εφαρμογής:

Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα: Από την πτώση των πετάλων (BBCH 69) έως το στάδιο της ανάπτυξης του καρπού (BBCH 73, στάδιο 2ης καρπόπτωσης).

Αμπέλι: Από την πλήρη άνθηση έως την ωρίμανση.

Φράουλα (Υπαίθρου + Θερμοκηπίου): Από την έναρξη της άνθησης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας.

Ακτινίδιο: Προανθικό στάδιο (εμφάνιση ταξιανθίας) (BBCH 51-59).

Εσπεριδοειδή: Από την πτώση των πετάλων (BBCH 71) έως το στάδιο της ανάπτυξης του καρπού (BBCH 85, στάδιο 2ης καρπόπτωσης).

Σολανώδη (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα κ.τ.λ.)**:** Από την έναρξη της άνθησης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας.

Κολοκυνθοειδή (αγγούρι, καρπούζι, κολοκύθι, πεπόνι κ.τ.λ.): Καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου της καλλιέργειας.

Φυλλώδη λαχανικά (μαρούλι, σπανάκι, αντίδι, σέσκουλο, κ.τ.λ.): Καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου της καλλιέργειας.

Αριθμός εφαρμογών:
Συστήνονται τουλάχιστον δύο εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιάστημα 10-15 ημέρες.

VERDEZIN Fe

BIO

Στερεό μείγμα Θειικού Μαγνησίου με θρεπτικά ιχνοστοιχεία (B, Fe, Mn, Mo, Zn).

Μαγνήσιο (MgO), υδατοδιαλυτό: 11,5% β/β
Τριοξείδιο του θείου (SO_3), υδατοδιαλυτό: 47%
Βόριο (B), υδατοδιαλυτό: 0,2% β/β
Σίδηρος (Fe), υδατοδιαλυτός: 2% β/β
Μαγγάνιο (Mn), υδατοδιαλυτό: 5,9% β/β
Μολυβδαίνιο (Mo), υδατοδιαλυτό: 0,05% β/β
Ψευδάργυρος (Zn), υδατοδιαλυτός: 10% β/β

Το **VERDEZIN Fe** είναι στερεό μείγμα λιπάσματος θειικού μαγνησίου και απαραίτητων θρεπτικών ιχνοστοιχείων, κατάλληλο για την πρόληψη και αποφυγή ανωμαλιών που εμφανίζονται όταν τα θρεπτικά αυτά στοιχεία δεν βρίσκονται σε ικανοποιητική συγκέντρωση εντός του φυτικού χυμού, έχοντας ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή βιοσύνθεση χλωροφύλλης, πολυσακχαριτών, πολυφαινολών, ορμονών και βιταμινών.

Δεδομένων των χαρακτηριστικών του προϊόντος, συνιστάται η συνεχής ανάδευση του μείγματος κατά την εφαρμογή του.

Ιδανική περίοδος για την εφαρμογή του προϊόντος, είναι η άνοιξη, κατά τη διάρκεια της μέγιστης ροής των φυτικών χυμών, διασφαλίζοντας έτσι την ταχεία αύξηση της βιοσύνθεσης απαραίτητων για τη φυτική ανάπτυξη οργανικών ενώσεων.

Δοσολογία: Διαφυλλική εφαρμογή: 200-300 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό (200-300 κ.εκ./ στρέμμα).
Υδρολίπανση: 200-300 κ.εκ./ στρέμμα.

Προϊόν (εγγυημένη σύνθεση)	**Περιγραφή**

ZIMAGBOR PM

BIO

Στερεό μείγμα Θειικού Μαγνησίου με Βόριο (Β) και Ψευδάργυρο (Zn).

Μαγνήσιο (MgO), υδατοδιαλυτό: 10% β/β
Τριοξείδιο του θείου (SO_3), υδατοδιαλυτό: 20%
Βόριο (Β), υδατοδιαλυτό: 10% β/β
Ψευδάργυρος (Zn), υδατοδιαλυτός: 10% β/β
Χηλικός παράγοντας: EDTA.

Το **ZIMAGBOR PM** είναι στερεό μείγμα λιπάσματος θειικού μαγνησίου με θρεπτικά ιχνοστοιχεία (βόριο, ψευδάργυρος) με καλή διασυστηματική απορρόφηση από το φυτό.

Η εφαρμογή του ZIMAGBOR PM συνιστάται για την πρόληψη και τη θεραπεία τροφοπενιών μαγνησίου, βορίου και ψευδαργύρου, ειδικά σε ελαιοδοτικές και κλωστικές ποικιλίες λιναριού (για τη βελτίωση της ποιότητας της ίνας), καθώς επίσης, στα εσπεριδοειδή, το αμπέλι, τα ελαιόδενδρα, τα οπωροφόρα κ.ά.

Δεδομένων των χαρακτηριστικών του προϊόντος, συνιστάται η συνεχής ανάδευση του μείγματος κατά την εφαρμογή του.

Δοσολογία: Διαφυλλική εφαρμογή: 250-300 γραμ./ στρέμμα.

ZINBOR PM

BIO

Στερεό μείγμα θρεπτικών ιχνοστοιχείων Βορίου (Β) και Ψευδαργύρου (Zn).

Βόριο (Β), υδατοδιαλυτό: 10% β/β
Ψευδάργυρος (Zn), υδατοδιαλυτός: 12% β/β
Χηλικός παράγοντας: EDTA.

Το **ZINBOR PM** είναι στερεό μείγμα λιπάσματος θρεπτικών ιχνοστοιχείων βορίου και ψευδαργύρου με χηλικό σύμπλοκο EDTA, παρουσιάζοντας έτσι καλή διασυστηματική απορρόφηση από το φυτό.

Η εφαρμογή του **ZINBOR PM** συνιστάται για την πρόληψη και τη θεραπεία τροφοπενιών βορίου και ψευδαργύρου, ειδικά σε ελαιοδοτικές και κλωστικές ποικιλίες λιναριού (για τη βελτίωση της ποιότητας της ίνας), καθώς επίσης, στα εσπεριδοειδή, στο αμπέλι, στα ελαιόδενδρα, στα οπωροφόρα, κ.ά.

Δοσολογία: Διαφυλλική εφαρμογή: 250-300 γραμ./ στρέμμα.

Βιοδιεγέρτες με βάση Εκχύλισμα Φυκιών του είδους *Ascophyllum nodosum*

Προϊόν (εγγυημένη σύνθεση)	**Περιγραφή**

MAXICROP®

BIO

► *Συνέχεια στην επόμενη σελίδα*

Βιοδιεγέρτης - Φυσικό προϊόν από φύκη θαλάσσης.

Εκχύλισμα θαλάσσιων φυκιών του είδους *Ascophyllum nodosum*: 8% β/ο

Το **MAXICROP®** περιέχει 80 γρ. εκχυλίσματος φυκιών του είδους *Ascophyllum nodosum* ανά λίτρο σκευάσματος, εκ των οποίων το 63,4% είναι οργανική ουσία. Πιο συγκεκριμένα περιέχει:

Φυτορμόνες: Αυξίνες, Γιβερελλίνες, Κυτοκινίνες, που διεγείρουν κυτταρικές διαδικασίες ανάπτυξης.

Φυσικούς Βιοδιεγέρτες Ανάπτυξης: Μπεταΐνες (ισορροπημένο μείγμα γ-αμινοβουτυρικού οξέος, δ-αμινοβαλερικού οξέος και γλυσινομπεταΐνης).

Ουσίες υψηλής βιολογικής αξίας για τα φυτά: Αλγινικό οξύ, Μαννιτόλη, Λαμιναρίνη, Πεντοζάνες, Αμινοξέα, Βιταμίνες κ.ά.

Μακροστοιχεία & Ιχνοστοιχεία: Περιέχει περίπου 60 μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία, εκ των οποίων τα περισσότερα βρίσκονται σε χηλική μορφή (N, P, K, Fe, Zn, B, I, Br, Cu, Ni, Mo, Co, Si, Al, κ.ά.).

Με το **MAXICROP®** επιτυγχάνουμε:
- Αύξηση και επιτάχυνση της φυτρωτικότητας και της ριζοβολίας.
- Ισχυροποίηση του ριζικού συστήματος και του βλαστού.
- Επιτάχυνση της ανάπτυξης και πρωίμιση της παραγωγής.
- Αύξηση της καρπόδεσης.
- Βελτίωση της ποιότητας των καρπών.
- Μεγαλύτερη αντοχή των φυτών σε διάφορες μορφές αβιοτικής καταπόνησης (αβιοτικό στρες).
- Βελτίωση των βιολογικών και φυσικών ιδιοτήτων του εδάφους.
- Συνεργιστική αύξηση της αποτελεσματικότητας εντομοκτόνων και μυκητοκτόνων.

Χρήσεις/ Καλλιέργειες, δοσολογία, τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Αμπέλι:
α) Εμποτισμός εδαφικών υποστρωμάτων για ριζοβόληση μοσχευμάτων με δόση 1 λίτρο/ 100 κιλά νερό. β) 3-4 ψεκασμοί με δόση 0,5-1 λίτρο/ 100 κιλά νερό. Ο πρώτος ξεκινά με την εμφάνιση των πρώτων φύλλων και οι υπόλοιποι πριν και μετά την άνθηση.

Βαμβάκι:
3-4 ψεκασμοί κάθε 15 ημέρες, με δόση 0,5-1 λίτρα/ 100 κιλά νερό, μετά την έκπτυξη των πρώτων φύλλων.

Γκαζόν:
α) Για ψεκασμούς, με δόση 0,5-1 λίτρο/ 100 κιλά νερό.
β) Για ριζοπότισμα, με δόση 1-1,5 λίτρα/ στρέμμα. Πραγματοποιείται ένας ψεκασμός μετά την έναρξη της βλάστησης και τακτικοί ψεκασμοί κάθε 15-20 ημέρες καθ' όλη την περίοδο ανάπτυξης. Εφαρμόζεται και με το σύστημα άρδευσης.

Προϊόν (εγγυημένη σύνθεση)	**Περιγραφή**

MAXICROP®

BIO

► *Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα*

Βιοδιεγέρτης - Φυσικό προϊόν από φύκη θαλάσσης.

Εκχύλισμα θαλάσσιων φυκιών του είδους *Ascophyllum nodosum*: 8% β/ο

Δενδρώδεις Καλλιέργειες/ Αειθαλή (Εσπεριδοειδή - Ελιά):
Πρώτος ψεκασμός πριν την άνθηση και 3-4 ψεκασμοί κάθε 15 ημέρες μετά την άνθηση, με δόση 0,5-1 λίτρα/ 100 κιλά νερό.

Δενδρώδεις Καλλιέργειες/ Φυλλοβόλα (Μηλοειδή - Πυρηνόκαρπα):
3-4 ψεκασμοί κάθε 15 ημέρες μετά την άνθηση, με δόση 0,5-1 λίτρα/ 100 κιλά νερό.

Καλλωπιστικά - Ανθοκομικά φυτά:
α) Για ψεκασμούς με δόση 200-500 κ.εκ./ 100 κιλά νερό.
β) Για ριζοπότισμα, με δόση 1 κ.εκ./ φυτό ή 0,5-1 λίτρο/ 100 κιλά νερό. Από την άνοιξη και καθ' όλη την περίοδο ανάπτυξης, κάθε 10-15 ημέρες.

Καπνός:
Όμοια με τα λαχανικά που μεταφυτεύονται.

Κτηνοτροφικά - Χορτοδοτικά φυτά (Αραβόσιτος - Μηδική -Τριφύλλι, κ.ά.):
2-3 ψεκασμοί κάθε 15 ημέρες μετά την έναρξη της βλάστησης με δόση 0,5-1 λίτρα/ 100 κιλά νερό.

Λαχανικά - Κηπευτικά – Όσπρια:
α) Για εμβάπτιση σπόρων ή εμποτισμό εδαφικού υποστρώματος σπορείων με δόση 1 λίτρο/ 100 κιλά νερό.
β) Για διαφυλλικούς ψεκασμούς με δόση 0,5-1 λίτρα/ 100 κιλά νερό.
γ) Για ριζοπότισμα, με δόση 1 κ.εκ. ανά φυτό ή 5-10 λίτρα/ στρέμμα με 3-4 εφαρμογές κάθε 15 ημέρες μετά την έκπτυξη των πρώτων φύλλων. Για τις καλλιέργειες που μεταφυτεύονται, οι εφαρμογές ξεκινούν 15 ημέρες μετά τη μεταφύτευση, ενώ γίνεται και μια πριν απ' αυτή με μικρότερη δοσολογία.

MAXICROP® B

BIO

Βιοδιεγέρτης - Υγρό διάλυμα λιπάσματος από εκχύλισμα θαλάσσιων φυκιών, εμπλουτισμένο με Βόριο (Β).

Εκχύλισμα θαλάσσιων φυκιών του είδους *Ascophyllum nodosum*: 4% β/ο
Ολικό διαλυτό Βόριο (Β) (από sodium borate): 1,8% β/ο

Το **MAXICROP® B** είναι βιοδιεγέρτης - υγρό λίπασμα, από εκχύλισμα φυκιών για την πρόληψη και θεραπεία της τροφοπενίας βορίου. Κατάλληλο για όλες τις απαιτητικές σε βόριο καλλιέργειες.

Το **MAXICROP® B,** αποτελεί φυσική πηγή θρεπτικών στοιχείων για τα φυτά, αφού παράγεται από 100% εκχύλισμα θαλάσσιων φυκιών του είδους *Ascophyllum nodosum* και είναι εμπλουτισμένο με 1,8% β/ο (1,7% β/β) βόριο από άλας βορίου.

Είναι προϊόν βασικό για την ανάπτυξη των φυτών, διότι το άμεσα αφομοιώσιμο βόριο που περιέχει αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για την έκπτυξη της νέας βλάστησης, την ανθοφορία, το σχηματισμό και την ποιότητα των καρπών. Είναι πολύ σημαντικό τα φυτά να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη ποσότητα βορίου κατά την άνθηση και την καρποφορία, αφού αυτό βοηθάει στην ανάπτυξη του γυρεοσωλήνα αλλά και στη μετακίνηση, το μεταβολισμό και τη συγκέντρωση των σακχάρων. Τροφοπενία βορίου εμφανίζεται συνήθως σε πτωχά από οργανική ουσία αμμώδη εδάφη, σε πολύ όξινα ή ασβεστούχα εδάφη ενώ και οι απαιτήσεις των φυτών ποικίλουν σημαντικά. Συμπτώματα τροφοπενίας βορίου παρουσιάζονται κυρίως στα νέα, αναπτυσσόμενα φυτικά μέρη.

Χρήσεις/ Καλλιέργειες, δοσολογία, τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Αμπέλι:
2-3 διαφυλλικοί ψεκασμοί με 50 - 150 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό.
α) Με την εμφάνιση της βλάστησης, β) Πριν την άνθηση, γ) Στο δέσιμο του μούρου.

Βαμβάκι, Ηλίανθος:
2-3 διαφυλλικοί ψεκασμοί με 50-150 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό.
Από τα 4-6 φύλλα, κάθε 15-20 ημέρες.

Ελιά:
2-3 διαφυλλικοί ψεκασμοί με 50 - 150 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό.
α) 15-25 ημέρες πριν την άνθηση, β) Τέλος άνθησης (στο δέσιμο), γ) 15-20 ημέρες μετά.

Εσπεριδοειδή, Ακτινίδιο:
2-3 διαφυλλικοί ψεκασμοί με 50-150 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό.
α) 15-25 ημέρες πριν την άνθηση, β) Τέλος άνθησης (στο δέσιμο), γ) 15 20 ημέρες μετά.

Καλλωπιστικά - Ανθοκομικά Φυτά:
2-3 διαφυλλικοί ψεκασμοί με 50-150 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό.
2-3 ριζοποτίσματα, με 0,5–1 lt/ στρ.
Με την έναρξη της βλάστησης κάθε 15-20 ημέρες.

Κτηνοτροφικά - Χορτοδοτικά Φυτά (Τεύτλα, Μηδική, Τριφύλλι, κ.ά.):
2-3 διαφυλλικοί ψεκασμοί με 50 – 150 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό.
Από την έναρξη της βλάστησης κάθε 15-20 ημέρες.

Λαχανικά - Κηπευτικά, Όσπρια, Καπνός, Πατάτα:
2-3 διαφυλλικοί ψεκαζ0μοί με 50 - 200 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό.
2-3 ριζοποτίσματα με 0,5 - 1 lt/ στρέμμα.
Από τα 4-6 φύλλα κάθε 10-20 ημέρες. Τα ριζοποτίσματα να ξεκινούν 10-15 μέρες μετά τη βλάστηση ή τη μεταφύτευση.

Φυλλοβόλα (Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα):
2-3 διαφυλλικοί ψεκασμοί με 50-150 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό.
α) Άνοιγμα βλαστοφόρων οφθαλμών, β) Τέλος άνθησης καρπίδιο, γ) Νεαρά φρούτα, δ) Πτώση των φύλλων.

Προϊόν (εγγυημένη σύνθεση)	**Περιγραφή**

MAXICROP® Fe

BIO

Βιοδιεγέρτης - Υγρό διάλυμα λιπάσματος από εκχύλισμα θαλάσσιων φυκιών, εμπλουτισμένο με Σίδηρο (Fe).

Εκχύλισμα θαλάσσιων φυκιών του είδους *Ascophyllum nodosum*: 5% β/ο
Ολικός διαλυτός σίδηρος (Fe) από θειικό σίδηρο: 2,2% β/ο

Το **MAXICROP® Fe** είναι οργανοανόργανο, υγρό λίπασμα - βιοδιεγέρτης με βάση εκχύλισμα φυκιών, εμπλουτισμένο με σίδηρο (Fe) σε άμεσα αφομοιώσιμη μορφή, για την πρόληψη και θεραπεία της τροφοπενίας σιδήρου. Κατάλληλο για **διαφυλλικές εφαρμογές** και **ριζοπότισμα** με όλα τα συστήματα ψεκασμού ή άρδευσης, σε όλες τις καλλιέργειες.

Το **MAXICROP® Fe** αποτελεί φυσική πηγή θρεπτικών στοιχείων για τα φυτά, αφού παράγεται από 100% εκχύλισμα θαλασσίων φυκιών του είδους *Ascophyllum nodosum* και είναι εμπλουτισμένο με 2,0% β/β άμεσα αφομοιώσιμο σίδηρο (Fe), από άλας σιδήρου. Είναι προϊόν βασικό για την ανάπτυξη των φυτών διότι η άμεσα αφομοιώσιμη μορφή σιδήρου που περιέχει, αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για τη σύνθεση της χλωροφύλλης και τη διεξαγωγή των οξειδο-αναγωγικών αντιδράσεων του μεταβολισμού των φυτών. Έτσι, επιταχύνεται η ανάπτυξη των φυτών, λόγω της αυξημένης φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και βελτιώνεται η καρποφορία. Το κυριότερο σύμπτωμα τροφοπενίας σιδήρου είναι η έντονη χλώρωση που ξεκινάει από τα νεότερα φύλλα ενώ τα νεύρα παραμένουν πράσινα, η οποία στη συνέχεια επεκτείνεται στα παλαιότερα φύλλα.

Χρήσεις/ Καλλιέργειες, δοσολογία, τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Αμπέλι, Δένδρα, Λαχανικά, Κηπευτικά, Καλλωπιστικά, Χορτοδοτικά Φυτά:
Διαφυλλικοί ψεκασμοί: 3-4 εφαρμογές με δόση 0,5-1 lt/ 100 lt νερό, κατά την περίοδο ανάπτυξης.

Γκαζόν:
3-5 εφαρμογές με **ριζοπότισμα** κατά την περίοδο ανάπτυξης με δόση 1- 1,5 λίτρα/ 1.000 τ.μ.

Λαχανικά, Κηπευτικά, Καλλωπιστικά, Χορτοδοτικά Φυτά:
Ριζοπότισμα με δόση 1 ml/ φυτό ή 3-5 lt/ στρέμμα (500-1000 lt νερό/ στρέμμα). Εφαρμόζεται αρχικά στα σπορεία και ακολουθούν 3-4 εφαρμογές μετά τη μεταφύτευση για τις καλλιέργειες που μεταφυτεύονται κατά την περίοδο ανάπτυξης.

Παρατηρήσεις:
Οι προληπτικές εφαρμογές πρέπει να ξεκινούν με την έναρξη της βλάστησης ή πριν την ανθοφορία και ακολουθούν οι επόμενες μετά το τέλος της άνθησης, κάθε 15-20 ημέρες.
Οι θεραπευτικές εφαρμογές πρέπει να γίνονται αμέσως μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα (αρχή καλοκαιριού) με επαναλήψεις ανά 15-20 ημέρες. Για τις θεραπευτικές εφαρμογές πρέπει να ακολουθείται η μεγαλύτερη δοσολογία.

MAXICROP® N

Βιοδιεγέρτης - Υγρό διάλυμα λιπάσματος από εκχύλισμα θαλάσσιων φυκιών, εμπλουτισμένο με Άζωτο Ουρίας (N-NH_2).

Εκχύλισμα θαλάσσιων φυκιών του είδους *Ascophyllum nodosum:* 4,2% β/ο
Ολικό διαθέσιμο άζωτο: 17% β/β
Ουρικό άζωτο (N-NH_2): 14,5% β/β*
**Μέγιστη περιεκτικότητα σε διουρία: 0,3%.*

Το **MAXICROP® N** είναι οργανοανόργανο, υγρό, διαφυλλικό λίπασμα - φυσικός βιοδιεγέρτης με βάση εκχύλισμα θαλάσσιων φυκιών του είδους *Ascophyllum nodosum*, εμπλουτισμένο με άζωτο (17%) σε άμεσα αφομοιώσιμη μορφή (ουρικό άζωτο).

Κατάλληλο για **διαφυλλικές εφαρμογές.**

Το **MAXICROP® N** προλαμβάνει την έλλειψη αζώτου και καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες των φυτών σε άζωτο, κατά τις κρίσιμες και απαιτητικές περιόδους ανάπτυξής τους.

Μέσω του άμεσα αφομοιώσιμου ουρικού αζώτου που παρέχεται διαφυλλικά στα φυτά κατά την περίοδο των αυξημένων αναγκών των καλλιεργειών σε άζωτο, σε συνδυασμό με τους ευεργετικούς, βιοδιεγερτικούς παράγοντες αύξησης του εκχυλίσματος φυκιών, επιτυγχάνεται:

• Πρόληψη και μερική ή ολική κάλυψη της έλλειψης αζώτου, • Επιτάχυνση της ανάπτυξης, • Αύξηση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας, • Συνεργιστική αύξηση της αποτελεσματικότητας εντομοκτόνων και μυκητοκτόνων, • Αύξηση της ανθεκτικότητας των φυτών σε αβιοτικές καταπονήσεις (αβιοτικό στρες).

Χρήσεις/ Καλλιέργειες, δοσολογία, τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Αμπέλι:
Διαφυλλική εφαρμογή. Δόση: 200-300 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 κιλά νερό.
Εφαρμογές: 3-4 ψεκασμοί κάθε 15 ημέρες πριν και μετά την ανθοφορία. Μπορεί να συνδυαστεί και με την εφαρμογή ορμονών.

Βιομηχανικά φυτά (Πατάτα, Βαμβάκι, Καπνός, Τεύτλα, Σόγια, Ηλίανθος κ.ά.)**:**
Διαφυλλική εφαρμογή. Δόση: 200-300 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 κιλά νερό.
Εφαρμογές: 2-3 ψεκασμοί κάθε 15 ημέρες από τα πρώτα βλαστικά στάδια.

Δενδρώδεις Καλλιέργειες (Οπωροφόρα, Εσπεριδοειδή, Ελιά):
Διαφυλλική εφαρμογή. Δόση: 200-300 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 κιλά νερό.
Εφαρμογές: 2-3 ψεκασμοί κάθε 15 ημέρες μετά την καρπόδεση.

Καλλωπιστικά - Ανθοκομικά φυτά:
Διαφυλλική εφαρμογή. Δόση: 100-200 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 κιλά νερό.
Εφαρμογές: 3-4 ψεκασμοί κάθε 15 ημέρες από την άνοιξη, κατά την περίοδο ανάπτυξης.

Κτηνοτροφικά - Χορτοδοτικά φυτά, Σιτηρά, Γκαζόν:
Διαφυλλική εφαρμογή. Δόση: 500-700 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 κιλά νερό.
Εφαρμογές: 1 ψεκασμός νωρίς, στα πρώτα βλαστικά στάδια ανάπτυξης. Στο γκαζόν ακολουθούν άλλοι 2-3 ψεκασμοί με 200 – 300 κ.εκ./ 100 κιλά νερό καθ' όλη τη βλαστική περίοδο.

Λαχανικά - Κηπευτικά (Τομάτα, Αγγούρι, Κολοκύθι, Όσπρια, Φυλλώδη Λαχανικά, Βολβώδη Λαχανικά)**:**
Διαφυλλική εφαρμογή. Δόση: 200-300 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 κιλά νερό.
Εφαρμογές: 2-3 ψεκασμοί κάθε 15 ημέρες μετά την έντονη βλάστηση ως την άνθηση.

Βιοδιεγέρτες με βάση Χουμικά - Φουλβικά οξέα και Θείο

Προϊόν (εγγυημένη σύνθεση)	**Περιγραφή**

ORGANOSUL 20S

BIO

Βιοδιεγέρτης - Υγρό Λίπασμα, με βάση Χουμικά και Φουλβικά οξέα και Θείο (S).

Θείο (SO_3) ολικό: 52,00% β/β
Στοιχειακό θείο (S): 20,00% β/β
Θείο (SO_3) υδατοδιαλυτό: 2,0% β/β
Άζωτο ολικό (N): 0,45% β/β
Άζωτο οργανικό (N): 0,42% β/β
Φώσφορος (P_2O_5): 0,30% β/β
Κάλιο (K_2O): 4,10% β/β
Οργανική ουσία: 44,50% β/β
Χουμικά οξέα: 9,40% β/β
Φουλβικά οξέα: 29,00% β/β
Οργανικός άνθρακας (C): 25,80% β/β
Μαγνήσιο (Mg): 0,25% β/β
Ασβέστιο (CaO): 0,18% β/β
Ψευδάργυρος (Zn): 0,10% β/β

Το **ORGANOSUL 20S** είναι ένας βιοδιεγέρτης με υψηλή συγκέντρωση σε οργανική ουσία και πολύτιμες χουμικές ουσίες, εμπλουτισμένος με στοιχειακό θείο (S). Προϊόν σταδιακής απελευθέρωσης θείου, με προστατευτική δράση έναντι της υδατικής καταπόνησης των καλλιεργειών. Χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των βιολογικών και φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του εδάφους. Η υψηλή του περιεκτικότητα σε οργανική ύλη αυξάνει την ΙΑΚ (Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων) του εδάφους και βελτιώνει σημαντικά τη δομή του, αυξάνει την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, ενώ, παράλληλα, ενισχύει την άμυνα των φυτών έναντι αβιοτικών καταπονήσεων.

Εφαρμογή μέσω του συστήματος άρδευσης (Υδρολίπανση):

ΑΜΠΕΛΙ, ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, ΕΛΙΑ, ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ, ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ: 0,5-1 L/στρ. ανά εφαρμογή. Συνολικά 2-4 εφαρμογές, κατά την έναρξη της βλάστησης, προ-ανθικά και κατά το στάδιο του γεμίσματος των καρπών.

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ- ΛΑΧΑΝΙΚΑ: 0,5-1 L/στρ. ανά εφαρμογή. Συνολικά 2-4 εφαρμογές, από την έναρξη του κύκλου της καλλιέργειας.

ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ-ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ: 0,5-1 L/στρ. ανά εφαρμογή. Συνολικά 2-4 εφαρμογές, στην αρχή της καλλιέργειας και πριν την ανθοφορία.

ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: 0,5-1 L/στρ. ανά εφαρμογή. Συνολικά 2-4 εφαρμογές, κατά την έναρξη της βλάστησης, προ-ανθικά και κατά το στάδιο του γεμίσματος των καρπών.

Εφαρμογή με έγχυση:

ΑΜΠΕΛΙ, ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, ΕΛΙΑ, ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ, ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ: 5-10 mL/φυτό. 1-2 mL/L νερού.

ORGANOSUL NS

BIO

Βιοδιεγέρτης - Υγρό Λίπασμα, με βάση Χουμικά και Φουλβικά οξέα, Θείο (S) και ελεύθερα Αμινοξέα.

Ελεύθερα αμινοξέα: 16,00% β/β
Θείο (SO_3) ολικό: 40,40% β/β
Στοιχειακό θείο (S): 16,00% β/β
Άζωτο ολικό (N): 3,30% β/β
Άζωτο οργανικό (N): 3,30% β/β
Φώσφορος (P_2O_5): 0,25% β/β
Κάλιο (K_2O): 2,05% β/β
Οργανική ουσία: 52,50% β/β
Χουμικά οξέα: 4,80% β/β
Φουλβικά οξέα: 35,00% β/β
Οργανικός άνθρακας (C): 30,45% β/β
Μαγνήσιο (Mg): 0,25% β/β
Ασβέστιο (CaO): 0,15% β/β
Σίδηρος (Fe): 0,07% β/β
Ψευδάργυρος (Zn): 0,02% β/β
Βεταΐνη: 1,00% β/β

***Αμινόγραμμα**: Λυσίνη (Lys): 7,75% | Γλυκίνη (Gly): 4,75% | Γλουταμικό οξύ (Glu): 3% | Ασπαρτικό οξύ (Asp): 0,05%.*

***Μέθοδος παραγωγής:** Ζύμωση.*

Το **ORGANOSUL NS** είναι ένας βιοδιεγέρτης με υψηλή συγκέντρωση σε χουμικά και φουλβικά οξέα, εμπλουτισμένος με στοιχειακό θείο (S) και επιλεγμένα ελεύθερα αμινοξέα. Το **ORGANOSUL NS** παρουσιάζει εξαιρετικές ιδιότητες χηλικής συμπλοκοποίησης, δρα καταλυτικά στην απορρόφηση και την αφομοίωση του αζώτου, ενισχύει τη φυτική αύξηση και αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις αβιοτικές καταπονήσεις των φυτών.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: **Διαφυλλικά**: 250 cc/100 λίτρα νερό. Εφαρμόζεται πριν και μετά την άνθηση. **Υδρολίπανση**: 500 cc/στρ. Εφαρμόζεται πριν και μετά την άνθηση. Επανάληψη κάθε 2-5 εβδομάδες, έως τη συνολική δόση των 1,5 L/στρ.

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ: **Διαφυλλικά**: 250 cc/100 λίτρα νερό. Εφαρμόζεται πριν και μετά την άνθηση. **Υδρολίπανση**: 500 cc/στρ. Εφαρμόζεται μετά την άνθηση. Επανάληψη κάθε 2-5 εβδομάδες, έως τη συνολική δόση των 1,5 L/στρ.

ΕΛΙΑ: **Διαφυλλικά**: 300 cc/100 λίτρα νερό. Εφαρμόζεται πριν και μετά την άνθηση. **Υδρολίπανση**: 500 cc/στρ. Εφαρμόζεται πριν και μετά την άνθηση. Επανάληψη κάθε 2-5 εβδομάδες, έως τη συνολική δόση των 2 L/στρ.

ΑΜΠΕΛΙ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ: **Διαφυλλικά**: 300 cc/100 λίτρα νερό. Εφαρμόζεται πριν και μετά την άνθηση. **Υδρολίπανση**: 500 cc/στρ. Εφαρμόζεται πριν και μετά την άνθηση. Επανάληψη κάθε 2-5 εβδομάδες, έως τη συνολική δόση των 2 L/στρ.

ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: **Υδρολίπανση**: 250 cc/στρ. 3-4 εφαρμογές από την άνθηση έως την ωρίμανση του καρπού.

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ- ΛΑΧΑΝΙΚΑ: **Διαφυλλικά**: 250 cc/100 λίτρα νερό. 1η εφαρμογή μετά τη μεταφύτευση (7-10 ημέρες). 2η εφαρμογή μετά την άνθηση (15-20 ημέρες). 3η εφαρμογή μετά την πρώτη συγκομιδή (15-20 ημέρες). **Υδρολίπανση**: 250-500 cc/στρ. Εφαρμόζεται μετά τη μεταφύτευση και σε περιόδους αυξημένης αβιοτικής καταπόνησης.

Προϊόν (εγγυημένη σύνθεση)	**Περιγραφή**

TRIUMPHALIS

BIO

Βιοδιεγέρτης - Υγρό Λίπασμα με βάση Χουμικά και Φουλβικά οξέα, Θείο (S), ελεύθερα Αμινοξέα και Βεταΐνη της Γλυκίνης (Glycine betaine).

Ελεύθερα αμινοξέα: 12,00% β/β

Βεταΐνη της γλυκίνης (Glycine betaine): 3,50% β/β

Θείο (SO_3) ολικό: 31,00% β/β

Στοιχειακό θείο (S):10,00% β/β

Άζωτο ολικό (N): 3,50% β/β

Άζωτο οργανικό (N): 3,28% β/β

Φώσφορος (P_2O_5): 0,20% β/β

Κάλιο (K_2O): 8,00% β/β

Οργανική ουσία: 45,15% β/β

Χουμικά οξέα: 3,42% β/β

Φουλβικά οξέα: 25,80% β/β

Οργανικός άνθρακας (C): 28,00% β/β

Μαγνήσιο (Mg): 0,43% β/β

Ασβέστιο (CaO): 0,10% β/β

Σίδηρος (Fe): 0,09% β/β

Ψευδάργυρος (Zn): 0,03% β/β

***Αμινόγραμμα**: Λυσίνη (Lys) 5,25% | Γλυκίνη (Gly) 3% | Γλουταμικό οξύ (Glu) 3% | Τρυπτοφάνη (Trp) 0,45%.*

***Μέθοδος παραγωγής:** Ζύμωση.*

Το **TRIUMPHALIS** είναι ένας βιοδιεγέρτης με υψηλή συγκέντρωση σε χουμικά και φουλβικά οξέα σε συνδυασμό με στοιχειακό Θείο (S), ελεύθερα αμινοξέα και βεταΐνη της γλυκίνης (Glycine betaine). Με ισορροπημένη αναλογία καλίου - αζώτου. Προϊόν σχεδιασμένο για χρήση σε κάθε φαινολογικό στάδιο του φυτού, με σκοπό τη διέγερση της φυτικής αύξησης και ανάπτυξης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των φυτών σε αβιοτικές καταπονήσεις.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: **Διαφυλλικά**: 250-300 cc/100 λίτρα νερό. Εφαρμόζεται κατά την έναρξη της βλάστησης, στην καρπόδεση και κατά το στάδιο του γεμίσματος των καρπών. **Υδρολίπανση**: 500 cc/στρ. Εφαρμόζεται από την έναρξη της βλάστησης και κάθε 15 ημέρες. Συνολικά 4-5 εφαρμογές.

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ- ΛΑΧΑΝΙΚΑ: **Διαφυλλικά**: 250-300 cc/100 λίτρα νερό. 1η εφαρμογή μετά τη μεταφύτευση (7 ημέρες). Επανάληψη κάθε 10-15 ημέρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της καλλιέργειας. **Υδρολίπανση**: 500 cc/στρ. Εφαρμόζεται μετά τη μεταφύτευση και καθ' όλο τον κύκλο της καλλιέργειας. Συνολικά 2-7 εφαρμογές, σύμφωνα με τις ανάγκες της καλλιέργειας.

ΦΡΑΟΥΛΑ: **Υδρολίπανση**: 400-600 cc/στρ. Συνολικά 3 εφαρμογές σε όλο τον κύκλο της καλλιέργειας.

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ: **Διαφυλλικά**: 250-300 cc/100 λίτρα νερό. Εφαρμόζεται κατά την έναρξη της βλάστησης, στην καρπόδεση και κατά το στάδιο του γεμίσματος των καρπών. **Υδρολίπανση**: 500 cc/στρ. Εφαρμόζεται από την έναρξη της βλάστησης και κάθε 15 ημέρες. Συνολικά 4-5 εφαρμογές.

ΕΛΙΑ: **Διαφυλλικά**: 250-300 cc/100 λίτρα νερό. Εφαρμόζεται κατά την έναρξη της βλάστησης, στην καρπόδεση και κατά το στάδιο του γεμίσματος των καρπών. **Υδρολίπανση**: 500 cc/στρ. Εφαρμόζεται από την έναρξη της βλάστησης και κάθε 15 ημέρες. Συνολικά 4-5 εφαρμογές.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ: **Διαφυλλικά**: 100-200 cc/100 λίτρα νερό. Εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση και στα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. **Υδρολίπανση**: 400-600 cc/στρ. Συνολικά 3-4 εφαρμογές, μετά τη μεταφύτευση.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ: **Διαφυλλικά**: 250-300 cc/100 λίτρα νερό. Εφαρμόζεται κατά την έναρξη της βλάστησης, πριν την άνθηση, στην καρπόδεση και 3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή. **Υδρολίπανση**: 500 cc/στρ. Εφαρμόζεται από την έναρξη της βλάστησης και κάθε 15 ημέρες. Συνολικά 3 εφαρμογές.

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ: **Διαφυλλικά**: 200 cc/100 λίτρα νερό. Εφαρμόζεται κατά την έναρξη της βλάστησης, πριν την άνθηση, στην καρπόδεση και 3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή.

ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: **Υδρολίπανση**: 250 cc/στρ. 3-4 εφαρμογές από την άνθηση έως την ωρίμανση του καρπού.

Υδατοδιαλυτά, Κρυσταλλικά Λιπάσματα

Προϊόν (εγγυημένη σύνθεση)	**Περιγραφή**

Maxi Plant 20-20-20 + TE

Άζωτο (N) ολικό: 20%
Άζωτο Νιτρικό (NO_3): 5,6% β/β
Άζωτο Αμμωνιακό (NH_4): 3,9% β/β
Άζωτο Ουρικό (NH_2): 10,5% β/β
Φώσφορος (P_2O_5): 20% β/β
(πλήρως διαλυτός σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και το νερό)
Κάλιο (K_2O): 20% β/β *(πλήρως υδατοδιαλυτό)*
Βόριο (B): 0,02% β/β
Χαλκός (Cu)*: 0,01% β/β
Σίδηρος (Fe)*: 0,03% β/β
Μαγγάνιο (Mn)*: 0,02% β/β
Μολυβδαίνιο: 0,001% β/β
Ψευδάργυρος (Zn)*: 0,02% β/β
**Σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA*

Κρυσταλλικό, υδατοδιαλυτό λίπασμα NPK με θρεπτικά ιχνοστοιχεία σε χηλική μορφή.
Κατάλληλο για την αύξηση και βελτίωση της παραγωγής σε όλες τις καλλιέργειας καθώς και την πρόληψη και θεραπεία τροφοπενιών.
Κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες.
Διαφυλλική εφαρμογή: 1,5-2 kg/ 1.000 λίτρα νερό.
Ριζοπότισμα: 2-5 kg/ στρέμμα.

Maxi Plant 15-30-15 + TE

Άζωτο (N) ολικό: 15%
Άζωτο Νιτρικό (NO_3): 4,3% β/β
Άζωτο Αμμωνιακό (NH_4): 8,4% β/β
Άζωτο Ουρικό (NH_2): 2,3% β/β
Φώσφορος (P_2O_5): 30% β/β
(πλήρως διαλυτός σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και το νερό)
Κάλιο (K_2O): 15% β/β *(πλήρως υδατοδιαλυτό)*
Βόριο (B): 0,02% β/β
Χαλκός (Cu)*: 0,01% β/β
Σίδηρος (Fe)*: 0,03% β/β
Μαγγάνιο (Mn)*: 0,02% β/β
Μολυβδαίνιο: 0,001% β/β
Ψευδάργυρος (Zn)*: 0,02% β/β
**Σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA*

Κρυσταλλικό, υδατοδιαλυτό λίπασμα NPK με θρεπτικά ιχνοστοιχεία σε χηλική μορφή.
Κατάλληλο για την αύξηση και βελτίωση της παραγωγής σε όλες τις καλλιέργειας καθώς και την πρόληψη και θεραπεία τροφοπενιών.
Κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες.
Διαφυλλική εφαρμογή: 1,5-2 kg/ 1.000 λίτρα νερό.
Ριζοπότισμα: 2-5 kg/ στρέμμα.

Maxi Plant 30-10-10 + TE

Άζωτο (N) ολικό: 30%
Άζωτο Νιτρικό (NO_3): 2,8% β/β
Άζωτο Αμμωνιακό (NH_4): 4,3% β/β
Άζωτο Ουρικό (NH_2): 22,9% β/β
Φώσφορος (P_2O_5): 10% β/β
(πλήρως διαλυτός σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και το νερό)
Κάλιο (K_2O): 10% β/β *(πλήρως υδατοδιαλυτό)*
Βόριο (B): 0,02% β/β
Χαλκός (Cu)*: 0,01% β/β
Σίδηρος (Fe)*: 0,03% β/β
Μαγγάνιο (Mn)*: 0,02% β/β
Μολυβδαίνιο: 0,001% β/β
Ψευδάργυρος (Zn)*: 0,02% β/β
**Σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA*

Κρυσταλλικό, υδατοδιαλυτό λίπασμα NPK με θρεπτικά ιχνοστοιχεία σε χηλική μορφή.
Κατάλληλο για την αύξηση και βελτίωση της παραγωγής σε όλες τις καλλιέργειας καθώς και την πρόληψη και θεραπεία τροφοπενιών.
Κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες.
Διαφυλλική εφαρμογή: 1,5-2 kg/ 1.000 λίτρα νερό.
Ριζοπότισμα: 2-5 kg/ στρέμμα.

Maxi Plant 12-9-39 + TE

Άζωτο (N) ολικό: 12%
Άζωτο Νιτρικό (NO_3): 6,7% β/β
Άζωτο Ουρικό (NH_2): 5,3% β/β
Φώσφορος (P_2O_5): 9% β/β
(πλήρως διαλυτός σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και το νερό)
Κάλιο (K_2O): 39% β/β *(πλήρως υδατοδιαλυτό)*
Βόριο (B): 0,02% β/β
Χαλκός (Cu)*: 0,01% β/β
Σίδηρος (Fe)*: 0,03% β/β
Μαγγάνιο (Mn)*: 0,02% β/β
Μολυβδαίνιο: 0,001% β/β
Ψευδάργυρος (Zn)*: 0,02% β/β
**Σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA*

Κρυσταλλικό, υδατοδιαλυτό λίπασμα NPK με θρεπτικά ιχνοστοιχεία σε χηλική μορφή.
Κατάλληλο για την αύξηση και βελτίωση της παραγωγής σε όλες τις καλλιέργειας καθώς και την πρόληψη και θεραπεία τροφοπενιών.
Κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες.
Διαφυλλική εφαρμογή: 1,5-2 kg/ 1.000 λίτρα νερό.
Ριζοπότισμα: 2-5 kg/ στρέμμα.

Τμήμα Πωλήσεων - Τομεάρχες Γεωπόνοι

		Τηλ.	Email
Κώστας Βούλγαρης	Διεύθυνση Πωλήσεων	6937 249813	voulgaris@ellagret.gr
Συμεών Ιωαννίδης	Ανατολική Μακεδονία, Θράκη	6945 461057	sioannidis@ellagret.gr
Αντώνης Δημητριάδης	Κεντρική Μακεδονία	6945 461059	adimitriadis@ellagret.gr
Θανάσης Κουβελέτσος	Δυτική Μακεδονία	6945 461056	akouveletsos@ellagret.gr
Σίμος Δολμές	Θεσσαλία	6948 829047	dolmes@ellagret.gr
Κατερίνα Ζαχαρή	Ανατολική Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα	6944 261058	kzachari@ellagret.gr
Γιώργος Καράμπελας	Αττική, Νησιά Αιγαίου	6944 269922	george.karabelas@ellagret.gr
Παντελής Τσιγαρίδας	Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά	6949 986066	ptsigaridas@ellagret.gr
Θανάσης Θεοδωρόπουλος	Νοτιοδυτική Πελοπόννησος	6944 671633	atheodoropoulos@ellagret.gr
Νικόλαος Κυπριωτάκης	Κρήτη	6944 599988	nkipriotakis@ellagret.gr

www.ellagret.gr

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Κεντρικά Γραφεία - Εργοστάσιο

Θέση Ξηροπήγαδο, Μάνδρα Αττικής, Τ.Θ.58, Τ.Κ. 196 00
Τ: 210 5550431, 210 5559001-2 | F: 210 5556100
Email: ellagret@ellagret.gr

Αποθήκευση - Διανομή Βορείου Ελλάδος

GREEN AGRO AE
Οδός 14, Ο.Τ. 53Β, Γ' Φάση ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης - Σίνδος
Τ.Κ. 57 022, Τ.Θ. 1387
Τηλ.: 2310 784 841-2 | Fax: 2310 784 843