

# DELMUS

## EC (Deltamethrin 2,5%)

ENTOMOKΤΟΝΟ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υγρό και αμέσως εύφλεκτο. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διαείσθησης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει υπηρίνια ή ζάλη. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνια επιπτώσεις. UPL RRDE-A4AD-QSKC-TS39

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μακριά από θερμότητα/ σπινθήρες/ φλόγες/ θερμές επιφάνειες - Μην καπνίζετε. Αποφεύγετε να αναπνέετε εκκενώματα. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο. Μαζέψτε τη μολυσμένη ουσία. Να αποφεύγετε την ελευθέρωση στο περιβάλλον. - Οι εργάτες να μην εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια. - Οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή. **ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.** Μετά την εφαρμογή ή μέλωση πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλισμένη τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφαιρέσετε αμέσως ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά νερά. \* 5 μέτρων για όλες τις υπαίθριες καλλιέργειες εκτός από τις δενδροβόες και τα αμπέλια ή καθόλου αμέσως ζώνη προστασίας με τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%. \* 15 μέτρων για τις δενδροβόες καλλιέργειες με τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%. - Δεν απαιτείται αμέσως ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά νερά για τα αμπέλια με τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%. Για να προστατέψετε μη στοκευμένα αρθρόποδα να αφαιρέσετε μίαν αμέσως ζώνη προστασίας 5 μέτρων για τις υπαίθριες καλλιέργειες κ.α. καλλιέργειες με ύψος μικρότερο από 50 cm (ή καθόλου αμέσως ζώνη προστασίας με χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90% από την μη γεωργική γη. Δεν απαιτείται αμέσως ζώνη προστασίας από την μη γεωργική γη για τις δενδροβόες καλλιέργειες, το αμπέλι κ.α. καλλιέργειες με ύψος μεγαλύτερο από 50εκ. με τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%. **Επικίνδυνο για τις μέλωσης.** Για να προστατέψετε τις μέλωσης και άλλα έντομα επικινδυνότητα μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζυζανίων. Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζυζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλωσης συλλέγουν. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:** Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα αμέσως και απορρίψτε τα ασφαλώς. - Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. - Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. - Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. - Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. - ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΜΕΤΟ. Πληροφορίες για το γιατρό: Θεραπευτικά μέτρα: Επείγουσα χειρουργική συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία. Μετά από επαφή με τα μάτια, εντάλονται τοπικά αναεσθητικών σταγόνων π.χ. 1% amethocaine hydrochloride. Χορηγείται αναλγητικά αν χρειαστεί. Δεν υπάρχει αντίδοτο. **Αντιμετώπιση σπασμών:** Χορηγείται diazepam για ενήλικες 5-10 mg ενδοφλέβια. Χορηγείτε όσο χρειάζεται ώστε να προημεσία πλήρως ο παθόν. Για παιδιά 2,5 mg ενδοφλέβια. **Αντενδείξεις:** απώθηση ή παράγωγα αδρεναλίνης. ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας:  
14479/ 25.05.2014

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: deltamethrin 2,5% B/o (ομάδα πυρεθροειδών)  
Βοηθητικές ουσίες: 97,19% B/B

EC - Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο

Πυρεθροειδείς εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων. Το Deltamethrin δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσαπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

Κάτοχος της έγκρισης:  
Arya LifeScience Benelux Srl  
Rue de Renory 26/1, B-4102  
Ougree, Belgium

Υπεύθυνος για τη  
διάθεση στην αγορά:  
UPL Ελλάς Α.Ε.,  
Ριζαρείου 16 Χαλάνδρι,  
Τ.Κ.: 15233, Τηλ.: 210 5578777

Εργοστάσιο συσκευασίας - Διανομή:

**ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**



Θέση Στρατηγίδα 19600 Μάνδρα Αττικής  
• Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100  
• [www.ellagret.gr](http://www.ellagret.gr)

Αριθ. Παρτίδας/  
Ημερ. Παραγωγής:  
Βλέπε συσκευασία



Περιεχόμενο: **5L**



**Τόπος εραργίας:** Ψευκασός φυλλοτόμος. **Τρόπος παρασκευής ψευκασκού υφάσματος:** Γεμίστε το δοχείο του ψευκασκού μηχανήματος μέχρι το μισό με νερό και βάλετε τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευασμάτων και συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεισφέροντας την ανδυνάμει. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της σκευασίας:** Η απόσυρση ή η καταστροφή του σκευασματος να γίνεται σε υψικρινούς που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα υλικά σκευασίας ξεπλένονται από πλάκα ή γίνεται τριπή ξήλωση με κατάλληλο μηχανισμό (για νερό του ξεπλύνματος τα ριχνουμε στο ψευκαστό υφάσμα) και στην συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τριπή ή σάβανο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω κυκλοφορίας αναποσπείστε σε σημεία αλλοθής για απόκτηση ενέργειας. **Ειδικές συνθήκες γεωργικής φυτοπείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκευασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκοπεί:** Για τις δευδράβες καλλιέργειες, το αμπέλι και άλλες υποκαλλιέργειες με ύψος μεγαλύτερο από 50 cm απαιτείται χρήση ακροφυσών μειωμένης διασποράς 90°. **Στατιστικά διακρίσεις ανεπιδοτούχων:** \* Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιοριστεί ο πληθυσμός των εντόμων και να μειωθούν ο αριθμός των εραργιών σε απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. \* Εραργίες μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση πιθανή υπέρβαση όρων οικονομικής ζημίας. \* Η καταστροφή θα πρέπει να εραργηθεί σε προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί ο κομής και απομόρφωση κάλυψης της γλάνης επιφανείας με το ψευκαστό υφάσμα. \* Νο επιδοτούμενη η διακρίση εραργίας με το ψευκαστό υφάσμα. \* Η εραργία εραργείται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλα όργανα με διαφορετικό τρόπο δράσης. \* Νο διαγεγραμμένη συστηματική έλεγχος των πληθυσμών των εντόμων/ σπάντων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενογράφου πλάκας **εξάδω αίσθημα** χρησιμοποιείται ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανεπιδοτούχων. Εάν διαπιστωθούν περικυβήσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εραργίες που ακολουθούν θα πρέπει να γίνουν με σκευασμα διαφορετικής οδούς. Οποιοσδήποτε δεν είναι φυτοπείας σε προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εραργίας **Συνθήκες απόκτησης, χρονική στοχευσιότητα του σκευασματος:** Το σκευασμα παραμένει στοθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

**ΦΑΣΜΑ ΔΕΙΞΕΙΣ:** Πεδίο Εραργίας – Στόχοι – Δόσεις Σκευασματος – Τρόπος και χρόνος εραργίας / μεθοδιστία επιδοτούμε (σε ημερές) – Μέντορας αρμόδιος εραργιών από καλλιεργητική περίοδο. \* **ΕΣΤΕΡΙΑΔΕΙΩΝ** (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρίνια, Κρέι-φρούτ, Νερατζιά): Εραργείται ένας (1) ψευκαστός από καλλιεργητική περίοδο με την εμφάνιση των προβλεπών. Για **Αιφίλες** 30-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 100-140 ηλ.στρ. (30-50 κ.εκ./στρ.). Για **Λεμονιά, Μύα Μεσογείου** 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 100-140 ηλ.στρ. (50 κ.εκ./στρ.). \* **ΑΚΡΟΡΑΨΑ** (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καταστάσι): Εραργείται ένας (2) ψευκαστός από καλλιεργητική περίοδο. Για **Αιφίλες** 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 100-140 ηλ.στρ. (30-50 κ.εκ./στρ.). Για **Καρπώτικα καρυδιάς** 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 100-140 ηλ.στρ. (30-50 κ.εκ./στρ.). Για **Καρπώτικα καρυδιάς** 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 100-140 ηλ.στρ. (30-50 κ.εκ./στρ.). Για **Ευφείβια** 1 η γενιά 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 100-140 ηλ.στρ. (30-50 κ.εκ./στρ.). Για **Πυρηνόκαρπια** (Ροδανιά, Νεκταρίνια, Βερκοκιά, Δαμασκηνιά, Κερσάνα Ψευκαστά): Εραργείται ένας (1) ψευκαστός από καλλιεργητική περίοδο με την εμφάνιση των προβλεπών. Για **Φυλλοδέστες, Ανάγρια** 35 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 100-140 ηλ.στρ. (30-49 κ.εκ./στρ.). Για **Ρογυλάδα** 40-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 100-140 ηλ.στρ. (40-70 κ.εκ./στρ.). Για **Μύα Μεσογείου** 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 100-140 ηλ.στρ. (50-70 κ.εκ./στρ.). Για **Αιφίλες, Καρπώτικα Δαμασκηνιάς** 30-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 100-140 ηλ.στρ. (30-70 κ.εκ./στρ.). \* **ΑΜΠΕΛΗ\***: Εραργείται ένας (3) ψευκαστός από καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προβλεπών με μεθοδιστία 14 ημερών. Για **Ευφείβια** 1 η γενιά 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 100-140 ηλ.στρ. (30-50 κ.εκ./στρ.). Για **Καυκάδα** 50-70 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 100-140 ηλ.στρ. (50-70 κ.εκ./στρ.). Για **Τζιζυκιά** 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 100-140 ηλ.στρ. (50 κ.εκ./στρ.). \* **ΦΡΑΥΛΙΑ** (Υαθούρι – Βερκοκίσι): Εραργείται ένας (3) ψευκαστός από καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προβλεπών με μεθοδιστία 14 ημερών. Για **Αιφίλες** 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 100-140 ηλ.στρ. (25-50 κ.εκ./στρ.). \* **ΕΛΣ**: Εραργείται ένας (1) ψευκαστός από καλλιεργητική περίοδο. Για **Δάκο** 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 100-140 ηλ.στρ. (50-70 κ.εκ./στρ.), σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακριών στις παλιές. Για **Λεμονιά** 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 100-140 ηλ.στρ. (50-70 κ.εκ./στρ.). με την εμφάνιση των προβλεπών. Για **Βερκοκιά** 30-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 100-140 ηλ.στρ. (30-70 κ.εκ./στρ.). με την εμφάνιση των προβλεπών. Για **Πυρηνόκαρπια** 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 100-140 ηλ.στρ. (30-70 κ.εκ./στρ.). με την εμφάνιση των προβλεπών. Για **Πυρηνόκαρπια** 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 100-140 ηλ.στρ. (30-70 κ.εκ./στρ.). στην έναρξη της άδησης (ανάδοξη γενιά) και αμέσως μετά την καρποδίαση (καρποδία γενιά) μεταξύ αυτών και εκκόλλησης των υφών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακριών στις φερονόμενες παλιές. \* **ΚΡΕΜΥΔΑ, ΠΡΑΣΟ, ΣΚΟΡΔΟ**: Εραργείται ένας (3) ψευκαστός από καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προβλεπών με μεθοδιστία 14 ημερών. Για **Βήρινα, Καρπώτικα** 30-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 100-140 ηλ.στρ. \* **ΣΑΛΑΝΔΑΝΗ – Τούγια, Πιερία, Μελιτζάνα** (Υαθούρι): Εραργείται ένας (3) ψευκαστός από καλλιεργητική περίοδο με την εμφάνιση των προβλεπών με μεθοδιστία 14 ημερών. Για **Πράσινο σκακί, Σποντοπείρα, Δορυφόρο**, **Αιφίλες** 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 60-100 ηλ.στρ. (30-50 κ.εκ./στρ.). Για **Βρώμο** 30-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 60-100 ηλ.στρ. (18-30 κ.εκ./στρ.). Για **Καρπώτικα** 30-50 κ.εκ./στρ., με όγκο ψεκ. υφάσματος 60-100 ηλ.στρ.

**ΠΙΠΕΡΙΑ** (Βερκοκίσι): Εραργείται ένας (3) ψευκαστός από καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προβλεπών με μεθοδιστία 7 ημερών. Για **Πράσινο σκακί, Σποντοπείρα, Δορυφόρο**, **Αιφίλες** 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 60-140 ηλ.στρ. (30-70 κ.εκ./στρ.). Για **Βρώμο** 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 60-140 ηλ.στρ. (18-42 κ.εκ./στρ.). Για **Αλεπούδι** 70 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 60-140 ηλ.στρ. (60-70 κ.εκ./στρ.). \* **ΣΑΛΑΝΔΑΝΗ – Τούγια, Μελιτζάνα** (Βερκοκίσι): Εραργείται ένας (3) ψευκαστός από καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προβλεπών με μεθοδιστία 7 ημερών. Για **Πράσινο σκακί, Σποντοπείρα, Δορυφόρο**, **Αιφίλες** 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 60-100 ηλ.στρ. (30-50 κ.εκ./στρ.). Για **Βρώμο** 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 60-140 ηλ.στρ. (18-42 κ.εκ./στρ.). \* **ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΙΔΕΣ – Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθα, Πεπόνι, Καρπούδι** (Υαθούρι): Εραργείται ένας (3) ψευκαστός από καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προβλεπών με μεθοδιστία 7 ημερών. Για **Πράσινο σκακί, Σποντοπείρα, Αιφίλες** 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 60-100 ηλ.στρ. (30-50 κ.εκ./στρ.). Για **Καρπώτικα** 30-50 κ.εκ./στρ., με όγκο ψεκ. υφάσματος 60-100 ηλ.στρ. \* **Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθα, Πεπόνι, Καρπούδι** (Βερκοκίσι): Εραργείται ένας (3) ψευκαστός από καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προβλεπών με μεθοδιστία 7 ημερών. Για **Πράσινο σκακί, Σποντοπείρα, Αιφίλες** 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 60-140 ηλ.στρ. (30-70 κ.εκ./στρ.). \* **ΛΑΧΑΝΟ** (εκτός από Κινέζικο), **ΚΟΜΗΤΟΠΥΛΗ, ΜΠΡΟΚΟΛΙ**: Εραργείται ένας (2) ψευκαστός από καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προβλεπών με μεθοδιστία 14 ημερών. Για **Πιερία, Μαϊντανό, Πλάδα, Πράσινο σκακί, Σποντοπείρα, Αιφίλες, Καρπώτικα** 30-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 50-100 ηλ.στρ. (30-50 κ.εκ./στρ.). \* **ΜΑΡΟΥΛΙ** (Υαθούρι): Εραργείται ένας (3) ψευκαστός από καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προβλεπών με μεθοδιστία 7 ημερών. Για **Πράσινο σκακί, Σποντοπείρα, Αιφίλες** 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 50-100 ηλ.στρ. (25-50 κ.εκ./στρ.). Για **Καρπώτικα** 30-50 κ.εκ./στρ., με όγκο ψεκ. υφάσματος 50-100 ηλ.στρ. \* **ΜΑΙΝΤΑΝΟ, ΦΥΛΛΑ ΨΑΛΛΟΥ, ΡΟΚΑ**: Εραργείται ένας (2) ψευκαστός από καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προβλεπών με μεθοδιστία 14 ημερών. Για **Αιφίλες, Σποντοπείρα, Μαϊντανό, Άλτι** 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 70 ηλ.στρ. (35 κ.εκ./στρ.). Για **Καρπώτικα** 30-50 κ.εκ./στρ., με όγκο ψεκ. υφάσματος 70 ηλ.στρ. \* **ΨΥΧΑΝΘΗ** (Σοπία) – **Φασόλια, Κουκιά, Φασί, Ρεβίθια**: Εραργείται ένας (2) ψευκαστός από καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προβλεπών με μεθοδιστία 14 ημερών. Για **Πράσινο σκακί, Αιφίλες, Καρπώτικα** 30-50 κ.εκ./στρ., με όγκο ψεκ. υφάσματος 50-100 ηλ.στρ. \* **ΜΙΤΙΖΕΛΙΑ ΦΡΕΣΚΑ** (Αρακά): Εραργείται ένας (2) ψευκαστός από καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προβλεπών με μεθοδιστία 14 ημερών. Για **Αιφίλες Μιζιλιών, Στόνα** 25 κ.εκ./στρ., με όγκο ψεκ. υφάσματος 100-140 ηλ.στρ. Για **Αιφίλες Κουκιά, Κάψια Μιζιλιών, Βήρινα, Καρπώτικα** 30-50 κ.εκ./στρ., με όγκο ψεκ. υφάσματος 100-140 ηλ.στρ. \* **ΑΓΓΙΝΑΡΑ**: Εραργείται ένας (3) ψευκαστός από καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προβλεπών με μεθοδιστία 7 ημερών. Για **Καυκάδα** 50 κ.εκ./στρ., με όγκο ψεκ. υφάσματος 100-140 ηλ.στρ. Για **Πεντένια, Αιφίλες** 30-50 κ.εκ./στρ., με όγκο ψεκ. υφάσματος 100-140 ηλ.στρ. \* **ΠΑΤΑΤΑ**: Εραργείται ένας (3) ψευκαστός από καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προβλεπών με μεθοδιστία 14 ημερών. Για **Δορυφόρο** 50 κ.εκ./στρ., με όγκο ψεκ. υφάσματος 60 ηλ.στρ. Για **Σποντοπείρα** 30-50 κ.εκ./στρ., με όγκο ψεκ. υφάσματος 60 ηλ.στρ. \* **ΒΑΜΒΑΚ**: Εραργείται ένας (2) ψευκαστός από καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προβλεπών με μεθοδιστία 14 ημερών. Για **Ρόδινα σκακί, Πράσινο σκακί** 50-70 κ.εκ./στρ., με όγκο ψεκ. υφάσματος 30-50 ηλ.στρ. Για **Αλεπούδι, Τζιζυκιά** 50 κ.εκ./στρ., με όγκο ψεκ. υφάσματος 30-50 ηλ.στρ. Για **Σποντοπείρα, Αιφίλες, Καρπώτικα** 30-50 κ.εκ./στρ., με όγκο ψεκ. υφάσματος 30-50 ηλ.στρ. \* **ΚΑΠΝΟΣ**: Εραργείται ένας (3) ψευκαστός από καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προβλεπών με μεθοδιστία 7 ημερών. Για **Βήρινα, Καρπώτικα** 30-50 κ.εκ./στρ., με όγκο ψεκ. υφάσματος 50-100 ηλ.στρ. \* **ΧΑΡΑΧΟΤΕΤΥΛΙΑ, ΠΑΝΤΖΑΡΙ**: Εραργείται ένας (1) ψευκαστός από καλλιεργητική περίοδο με την εμφάνιση των προβλεπών. Για **Αιφίλες, Μύα Τούγια, Άλτι, Σποντοπείρα, Καρπώτικα** 30-50 κ.εκ./στρ., με όγκο ψεκ. υφάσματος 50-100 ηλ.στρ. Για **Καυκάδα** 50 κ.εκ./στρ., με όγκο ψεκ. υφάσματος 50-100 ηλ.στρ. \* **ΑΡΑΒΟΤΙΣΤ\***: Εραργείται ένας (3) ψευκαστός από καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προβλεπών με μεθοδιστία 14-21 ημερών. Για **Διαβροκία virginea** 50 κ.εκ./στρ., με όγκο ψεκ. υφάσματος 60 ηλ.στρ. με την εμφάνιση των προβλεπών με μεθοδιστία 7 ημερών. \* **ΣΤΗΡΑ ΣΤΗΡΑ**, **Κρέαρι, Βρώμι, Σικάλι**: Εραργείται ένας (1) ψευκαστός από καλλιεργητική περίοδο με την εμφάνιση των προβλεπών. Για **Αιφίλες, Καρπώτικα** 30-50 κ.εκ./στρ., με όγκο ψεκ. υφάσματος 40-60 ηλ.στρ. \* **ΜΗΛΙΝΗ**: Εραργείται ένας (2) ψευκαστός από καλλιεργητική περίοδο με την εμφάνιση των προβλεπών με μεθοδιστία 14 ημερών. Για **Αιφίλες Μιζιλιών, Σκοκιά Μιζιλιών, Φουτόνα** 25 κ.εκ./στρ., με όγκο ψεκ. υφάσματος 40 ηλ.στρ. \* **ΚΑΛΑΠΙΣΤΙΚΑ** (Υαθούρι – Βερκοκίσι): Εραργείται ένας (3) ψευκαστός από καλλιεργητική περίοδο με την εμφάνιση των προβλεπών με μεθοδιστία 7 ημερών. Για **Αιφίλες, Βήρινα** 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 50-100 ηλ.στρ. (25-50 κ.εκ./στρ.). Για **Φυλλοδέστες** 35 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 50-100 ηλ.στρ. (17-35 κ.εκ./στρ.). Για **Αλεπούδι** 70 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υφάσματος, με όγκο ψεκ. υφάσματος 70 ηλ.στρ. (30, 50 κ.εκ./στρ.). **Τελευταία επιβεβαιώνεται την συγκομιδή:** Βαμβάκι, Χαραχόπετα, Παντζάρι, Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρίνια, Κρέι-φρούτ, Νερατζιά, Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καταστάσι, Αρακάς, Πιερία, Κιόβια, Βρώμι, Σικάλι, 30 ημερών, Μήνιν: 14 ημερές, Αιφίλες, Άλτι, Πάτατα, Κερσάνα, Πράσινο, Σκοκιά, Λαχανό (εκτός από Κινέζικο), Κουκιά, Φασί, Ρεβίθια, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθα, Πεπόνι, Καρπούδι, Ρόκα, Αγγουράκι 3 ημερές, ΠΑΡΑΗΡΕΤΙΚΑ – ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο πακέτο δόση των 50 κ.εκ. σκευασματος (ή) πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψευκαστού υφάσματος (100 λίτρα/στρέμμα) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ.εκ. σκευασματος στο στρέμμα. \*\*

Δεν επιτρέπεται η συγκαλλιέργεια απειλημάτων στην οποία είναι υψική χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν. \*\*\* Η εραργία του **DELMUS 2.5 EC** στο καλαμίνι οδηγεί στη μείωση των επιπτώσεων των μυκητοκτόνων, ως αποτέλεσμα της επιλεκτικής αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia* spp. και *Sesamia* spp.